

# MBA大师跟学团专属

## 平均值、绝对值

董璞

### 平均值、绝对值

.....



要么最难，要么最简单

平均值不等式

绝对值不等式



结合应用题、几何、数据分析等

## 跟学团 平均值

.....

算术平均值

定义 计算

几何平均值

定义 计算

关系：均值定理  $\Rightarrow$  应用：求最值

## 跟学团 平均值 · 定义

.....

3

1

$$\frac{3+1}{2} = 2$$

3和1的算术平均值

面积不变  
3

1

面积不变  
 $\sqrt{3}$

$$\sqrt{3 \times 1} = \sqrt{3}$$

3和1的几何平均值

## 跟学团 平均值 · 定义

.....

**算术平均值** 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 $n$ 个实数, 这 $n$ 个数的算术平均值为:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{累加后除以个数}$$

**几何平均值** 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 $n$ 个正实数, 这 $n$ 个正实数的几何平均值为:

$$x_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n} \quad \text{累乘后开个数次方}$$

**【举例】** 求3, 8, 9这三个数的算术平均值和几何平均值

## 跟学团 平均值

.....

算术平均值

$$\text{定义 } \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

➤ 直接计算

➤ 改变元素个数计算

➤ 改变元素大小计算



关系: 均值定理

应用: 求最值

几何平均值

$$\text{定义 } x_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n}$$

注意几何平均值要求每一项均为正

**跟学团 平均值·计算**

.....

仅元素大小改变 个体改变量与算术平均值改变量

$$\text{算术平均值 } \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \quad \bar{x} \text{ 的改变量} = \frac{\text{个体改变量之和}}{\text{元素数量 } n}$$

**【举例】**若 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ 的算术平均值为 $\bar{x}$ , 求 $x_1, x_2 - 2, x_3 + 3, x_4 - 4, x_5 + 5$ 的算术平均值.

---

**跟学团 平均值·计算**

.....

**【模拟题】** $x_1, x_2 + 1, x_3 + 2, x_4 + 3, x_5 + 4$ 的算术平均值是 $\bar{x} + 2$  ( ) .

(1)  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ 的算术平均值是 $\bar{x}$ .

(2)  $x_1 + 1, x_2 + 2, x_3 + 3, x_4 + 4, x_5 + 5$ 的算术平均值是 $\bar{x} + 3$ .

---

## 跟学团 平均值·计算

.....

【真题2019.23】某校理学院五个系每年录取人数如下表：

院系	数学系	物理系	化学系	生物系	地理系
录取人数	60	120	90	60	30

今年与去年相比，物理系平均分没有变，则理学院录取平均分升高了。（ ）

(1) 数学系录取平均分升高了3分，生物系录取平均分降低了2分。

(2) 化学系录取平均分升高了1分，地理系录取平均分降低了4分。

## 跟学团 平均值·计算

.....

仅元素大小改变  $\bar{x}$  的改变量 =  $\frac{\text{个体改变量之和}}{\text{元素数量}n}$

元素个数改变 总和 = 平均值  $\bar{x} \times$  元素数量  $n$

【真题2006.01.04】如果  $x_1, x_2, x_3$  三个数的算术平均值为5，则  $x_1 + 2, x_2 - 3, x_3 + 6$  与8这四个数的算术平均值为（ ）。

A.  $3\frac{1}{4}$

B. 6

C. 7

D.  $9\frac{1}{5}$

E.  $7\frac{1}{2}$

## 跟学团 平均值·计算

.....

【模拟题】已知 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的几何平均值为3, 前 $n-1$ 个数的几何平均值为2, 则 $x_n$ 的值为 ( ) .

A.  $\frac{9}{2}$

B.  $(\frac{3}{2})^n$

C.  $2(\frac{3}{2})^{n-1}$

D.  $3(\frac{3}{2})^{n-1}$

E.  $(\frac{3}{2})^{n-1}$

## 跟学团

.....

$$\frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_1 x_2 \cdots x_{n-1}} = x_n = \frac{3^n}{2^{n-1}} = 3 \times \frac{3^{n-1}}{2^{n-1}} = 3(\frac{3}{2})^{n-1}$$

幂 的 处 理 方 法	{ 化为同指数	$a^n b^n = (ab)^n$
		$2^{n+1} \times 3^n = 2 \times 2^n \times 3^n = 2 \times (2 \times 3)^n = 2 \times 6^n$
	{ 化为同底数	$\frac{a^n}{b^n} = (\frac{a}{b})^n$
		$a^m \times a^n = a^{m+n}$
$2^5 \times 4^7 = 2^5 \times (2^2)^7 = 2^5 \times 2^{2 \times 7} = 2^{5+14} = 2^{19}$		
		$a^m \div a^n = a^{m-n}$
		$9^5 \div 3^3 = (3^2)^5 \div 3^3 = 3^{2 \times 5} \div 3^3 = 3^{10-3} = 3^7$

## 跟学团 平均值

.....

算术平均值

$$\text{定义 } \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

➤ 直接计算

➤ 改变元素个数计算

➤ 改变元素大小计算



关系：均值定理

应用：求最值

几何平均值

$$\text{定义 } x_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n}$$

注意几何平均值要求每一项均为正

## 跟学团 均值定理

.....

算术平均值  $\frac{a+b}{2} \geq$  几何平均值  $\sqrt{ab}$

$$\begin{aligned} \text{作差法比较大小 } \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} &= \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} \\ &= \frac{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 - 2\sqrt{ab}}{2} \\ &= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0 \end{aligned}$$

## 跟学团 均值定理

.....

**均值定理** 对于任意 $n$ 个正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 有:

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$$

当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时, 等号成立. ( $x_i > 0, i = 1, \dots, n$ )

几个正数的算术平均值总大于等于它们的几何平均值

两种形式:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n \cdot \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \quad \text{积定和最小}$$

$$x_1 x_2 \dots x_n \leq \left( \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^n \quad \text{和定积最大}$$

## 跟学团 均值定理 · 求和的最小值

.....

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad (a, b > 0) \quad x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n \cdot \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$$

- ①  $a, b$  可以代表任何正代数式.
- ② 使用范围:  $a, b > 0$
- ③ 当且仅当  $a = b$  时, 等号成立.  $a + a = 2a \geq 2\sqrt{a \cdot a} = 2a \quad (a, b > 0)$

均值不等式( $a, b > 0$ )

$a + b \geq 2\sqrt{ab}$	恒成立
$a + b > 2\sqrt{ab}$	$a \neq b$
$a + b = 2\sqrt{ab}$	$a = b$



### 跟学团 均值定理 · 求和的最小值

.....

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad (a, b > 0)$$

$$\begin{array}{ccc} \boxed{x^2 + 1} & + & \boxed{\frac{4}{x^2 + 1}} \geq 2\sqrt{\cancel{(x^2 + 1)} \cdot \cancel{\frac{4}{x^2 + 1}}} = 4 \\ \downarrow & & \downarrow \\ a & & b \end{array}$$

- ①  $a, b$  可以代表任何正代数式.
- ② 使用范围:  $a, b > 0$        $x^2 + 1 > 0$        $\frac{4}{x^2 + 1} > 0$
- ③ 当且仅当  $a = b$  时, 等号成立.       $x^2 + 1 = \frac{4}{x^2 + 1}$        $(x^2 + 1)^2 = 4$        $x^2 + 1 = 2$        $x = \pm 1$

$x^2 + 1 + \frac{4}{x^2 + 1} \geq 4$	恒成立
$x^2 + 1 + \frac{4}{x^2 + 1} > 4$	$x \neq \pm 1$
$x^2 + 1 + \frac{4}{x^2 + 1} = 4$	$x = \pm 1$

### 跟学团 均值定理 · 求和的最小值

.....

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad (a, b > 0)$$

$$\begin{array}{ccc} \boxed{x^2 + 1} & + & \boxed{\frac{4}{x^2 + 1}} \geq 2\sqrt{\cancel{(x^2 + 1)} \cdot \cancel{\frac{4}{x^2 + 1}}} = 4 \\ \downarrow & & \downarrow \\ a & & b \end{array}$$

- ①  $a, b$  可以代表任何正代数式.
- ② 使用范围:  $a, b > 0$        $x^2 + 1 > 0$        $\frac{4}{x^2 + 1} > 0$
- ③ 当且仅当  $a = b$  时, 等号成立.       $x^2 + 1 = \frac{4}{x^2 + 1}$        $(x^2 + 1)^2 = 4$        $x^2 + 1 = 2$        $x = \pm 1$

$x^2 + 1 + \frac{4}{x^2 + 1} \geq 4$ , 即它的最小值为4, 当  $x = \pm 1$  时取得最小值.

两个正代数式乘积为定值, 则它们的和有最小值 积定和最小  
当两代数式相等时可取得此最小值.

### 跟学团 均值定理 · 求和的最小值

.....

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad (a, b \text{ 可以代表任何正代数式})$$

一正 ①  $a, b$  均为正. 能用套用均值不等式

二定 ②  $ab$  为定值 能求最值

三相等 ③ 当且仅当  $a = b$  时, 和可取到最小值. 能取到最值

$$a + b + c \geq 3 \cdot \sqrt[3]{abc} \quad (a, b \text{ 可以代表任何正代数式})$$

一正 ①  $a, b, c$  均为正能用公式

二定 ②  $abc$  为定值 能求最值

三相等 ③ 当且仅当  $a = b = c$  时, 和可取到最小值.

### 跟学团 均值定理 · 求和的最小值 · 一正

.....

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad (a, b > 0)$$

$$\boxed{x} + \boxed{\frac{1}{x}} \geq 2 \sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2 \quad \text{不一定成立}$$

$\downarrow$   
 $a$

$\downarrow$   
 $b$

①  $a, b$  可以代表任何正代数式.

② 使用范围:  $a, b > 0$

注意天然为正的讨论范围

如: 非零完全平方、恒为正的二次函数、指数函数、平面几何、概率

③ 当且仅当  $a = b$  时, 等号成立.  $x = \frac{1}{x} \quad x^2 = 1 \quad x = 1$

偶数次方、偶次方根

奇数次方、奇次方根

**跟学团 均值定理 · 求和的最小值 · 一正**

.....

**【模拟题】** 面积为9的直角三角形两直角边之和最小值为 ( )

- A. 12      B.  $6\sqrt{2}$       C. 8      D.  $2\sqrt{6}$       E. 以上都不是
- 

**跟学团 均值定理 · 求和的最小值**

.....

**【真题2020.24条件 (1)】** 设 $a, b$ 是正实数, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 存在最小值.(1) 已知 $ab$ 的值

### 跟学团 均值定理 · 求和的最小值 · 三相等

.....

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad (a, b > 0)$$

$$\boxed{x^2 + 5} + \boxed{\frac{1}{x^2 + 5}} \geq 2 \sqrt{\cancel{(x^2 + 5)} \cdot \frac{1}{\cancel{x^2 + 5}}} = 2$$

$\downarrow$   
a

$\downarrow$   
b

① a, b 可以代表任何正代数式.

② 使用范围:  $a, b > 0$

$$x^2 + 5 > 0 \quad \frac{1}{x^2 + 5} > 0$$

③ 当且仅当  $a = b$  时, 等号成立

$$x^2 + 5 = \frac{1}{x^2 + 5}$$

$$(x^2 + 5)^2 = 1$$

$$x^2 + 5 = 1 \quad \text{不可能成立}$$

### 跟学团 均值定理 · 求和的最小值

.....

【模拟题】已知  $x, y \in \mathbb{R}$ , 且  $x + y = 4$ , 则  $3^x + 3^y$  的最小值是 ( ) .

A.  $\sqrt{2}$

B. 18

C. 9

D.  $2\sqrt{2}$

E.  $\sqrt{6}$

## 跟学团 联考求最值方法对比

.....

方法	二次函数	均值定理
描述	$f(x) = ax^2 + bx + c \ (a \neq 0)$ $x = -\frac{b}{2a}$ 时, 可取得最值 $\frac{4ac-b^2}{4a}$	$a + b \geq 2\sqrt{ab} \ (a, b > 0)$ $ab$ 为定值, $a = b$ 时可取得 $a + b$ 的最小值
比较	不限制变量的取值范围 只能处理完全符合二次函数形式的算式	参与运算的每项必须为正 算式形式多变

➤ (可化为) 二次函数  $ax^2 + bx + c$  形式的均优先使用二次函数求最值

➤ 不可化为二次函数形式的使用均值定理求最值

分式如  $x + \frac{1}{x}$   
高次如  $x^2(1-x)$

## 跟学团 均值定理 · 求和的最小值 · 凑配定值

.....

【标志词汇】 限制为正 + 求最值  $\Rightarrow$  均值定理

若它们的乘积为常数, 则直接使用均值定理求和的最小值  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$

➤ 互为倒数, 乘积天然为常数

➤ 题目给定乘积为常数

$$\boxed{x^2 + 1} + \boxed{\frac{4}{x^2 + 1}} \geq 2 \cdot \sqrt{(x^2 + 1) \cdot \frac{4}{x^2 + 1}} = 4 \quad \text{当 } x = \pm 1 \text{ 时取得最小值 } 4.$$

$$\boxed{\frac{y}{x} + \frac{x}{y}} \geq 2 \cdot \sqrt{\frac{y}{x} \cdot \frac{x}{y}} = 2 \quad (x, y > 0) \quad \text{当 } \frac{y}{x} = \frac{x}{y}, \ x = y \text{ 时取得最小值 } 2.$$

**跟学团 均值定理 · 求和的最小值 · 凑配定值**

°°°°°  
【标志词汇】 限制为正+求最值  $\Rightarrow$  均值定理 求和最小, 凑配定

若它们的乘积不是常数, 则凑配使参与运算的项乘积为常数.

【举例】求  $x + \frac{1}{2x^2}$  的最小值 ( $x > 0$ )

---

**跟学团 均值定理 · 求和的最小值 · 凑配定值**

°°°°°  
【标志词汇】 限制为正+求最值  $\Rightarrow$  均值定理

若它们的乘积不是常数, 则凑配使参与运算的项乘积为常数.

次数不同时, 将较低次项平均拆分, 拆得项数等于较高次数  
(拆分后注意参与运算的项数发生变化)

【举例】求  $x + \frac{1}{3x^3}$  的最小值 ( $x > 0$ )

---

## 跟学团 均值定理 · 求和的最小值 · 凑配定值

【标志词汇】 限制为正+求最值  $\Rightarrow$  均值定理

若它们的乘积不是常数，则凑配使参与运算的项乘积为常数.

次数不同时，将较低次项平均拆分，拆得项数等于较高次数  
(拆分后注意参与运算的项数发生变化)

【举例】求  $4x^2 + \frac{1}{x}$  的最小值 ( $x > 0$ )

---

## 跟学团 均值定理 · 求和的最小值 · 凑配定值

【标志词汇】 限制为正+求最值  $\Rightarrow$  均值定理

若它们的乘积不是常数，则凑配使参与运算的项乘积为常数.

形式不同时，将整式部分与分式部分分母凑成相同形式.

【举例】求  $x + \frac{1}{x-2}$  的最小值 ( $x > 2$ )

---

### 跟学团 均值定理 · 求和的最小值 · 凑配定值

.....

次数不同时，如  $x + \frac{1}{2x^2}$

将较低次项平均拆分，拆得项数等于较高次数

注意拆分后注意参与运算的项数发生变化

形式不同时，如  $x + \frac{1}{x-2}$

将整式部分与分式部分分母凑成相同形式

注意只对凑配后的带未知量部分使用均值定理求最值.

形式与次数均不同时，如  $x + \frac{1}{3(x-2)^3}$

先凑形式，再凑次数

### 跟学团 均值定理 · 求和的最小值 · 凑配定值

.....

【举例】求  $x + \frac{1}{3(x-2)^3}$  的最小值 ( $x > 2$ )

---



### 跟学团 均值定理 · 求和的最小值

.....

【真题2019.02】设函数  $f(x) = 2x + \frac{a}{x^2}$  ( $a > 0$ ) 在  $(0, +\infty)$  内的最小值为  $f(x_0) = 12$ ,

则  $x_0 = ( \quad )$ .

A.5

B.4

C.3

D.2

E.1

### 跟学团 均值定理 · 求和的最小值

.....

$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq n \cdot \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$  积定和最小

**一正** 所有参与运算的项均为正. 能用套用均值不等式

注意天然为正的讨论范围

如: 非零完全平方、恒为正的二次函数、指数函数、平面几何、概率

**二定** 所有参与运算的项乘积为一确定的值 能求最值

形式不同如  $x + \frac{1}{x-2}$  次数不同如  $x + \frac{1}{2x^2}$  形式与次数均不同如  $x + \frac{1}{3(x-2)^3}$

**三相等** 当且仅当所有参与运算的项均相等时, 它们的和可取到最小值.

能取到最值

### 跟学团 均值定理 · 求积的最大值

.....

均值不等式  $\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq n \cdot \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \quad a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad \text{积定和最小}$$

求和的最小值 凑积定

$$x_1 x_2 \cdots x_n \leq \left( \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \right)^n \quad ab \leq \left( \frac{a+b}{2} \right)^2 \quad \text{和定积最大}$$

求积的最大值 凑合定

注:  $a, b$  表示任意正代数式

### 跟学团 均值定理 · 求积的最大值

.....

$$ab \leq \left( \frac{a+b}{2} \right)^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{① } a, b \text{ 可以代表任何正代数式.} \\ \text{② 使用范围: } a, b > 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{c} x(1-x) \leq \left[ \frac{x+(1-x)}{2} \right]^2 = \frac{1}{4} \\ \Downarrow \quad \Downarrow \\ a \quad b \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{③ 当且仅当 } a = b \text{ 时, 等号成立.} \end{array} \right. \quad \begin{array}{c} x > 0 \quad 1-x > 0 \quad 0 < x < 1 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{③ 当且仅当 } a = b \text{ 时, 等号成立.} \end{array} \right. \quad \text{当且仅当 } x = 1-x, x = \frac{1}{2} \text{ 时 " = " 成立, 取得最大值.}$$

两个正代数式之和为定值, 则它们的乘积有最大值 和定积最大

当两代数式相等时可取得此最大值.

### 跟学团 均值定理

.....

$a + b \geq 2\sqrt{ab}$  【标志词汇】 限制为正+求和的最小值  $\Rightarrow$  凑“积定”后用均值定理

一正 ①  $a, b$  均为正代数式. 能用套用均值不等式

二定 ②  $ab$  为定值 能求最值

三相等 ③ 当且仅当  $a = b$  时, 和可取到最小值. 能取到最值

$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$  【标志词汇】 限制为正+求积的最大值  $\Rightarrow$  凑“和定”后用均值定理

一正 ①  $a, b$  均为正代数式. 能用套用均值不等式

二定 ②  $a + b$  为定值 能求最值

三相等 ③ 当且仅当  $a = b$  时, 可取到最值. 能取到最值

### 跟学团 平均值、绝对值

.....

【标志词汇】 限制为正+求积的最大值  $\Rightarrow$  凑“和定”后用均值定理

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \quad abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \quad (a, b, c \text{ 可以代表任何正代数式})$$

【举例】求  $x(1-x)$  的最大值 ( $0 < x < 1$ )

**跟学团 均值定理 · 求积的最大值 · 凑配定值**

.....

**【标志词汇】** 限制为正+求积的最大值  $\Rightarrow$  凑“和定”后用均值定理

若它们的和不是常数，则凑配使参与运算的项之和为常数.

**【举例】** 求  $x^2(1-2x)$  的最大值 ( $0 < x < \frac{1}{2}$ )**跟学团 均值定理 · 求积的最大值 · 凑配定值**

.....

**【标志词汇】** 限制为正+求积的最大值  $\Rightarrow$  凑“和定”后用均值定理

若它们的和不是常数，则凑配使参与运算的项之和为常数.

**【举例】** 求  $x^2(1-x)$  的最大值 ( $0 < x < 1$ )

**跟学团 均值定理 · 求积的最大值 · 凑配定值**

.....  
【标志词汇】 限制为正+求积的最大值  $\Rightarrow$  凑“和定”后用均值定理

先平均拆至同次数，再按需乘系数

注意：只对凑配后的带未知量部分使用均值定理求最值。

【举例】求  $x^2(1-x)$  的最大值 ( $0 < x < 1$ )

---

**跟学团 均值定理 · 求积的最大值**

.....

【真题2004.01.04】矩形周长为2，将它绕其一边旋转一周，所得圆柱体体积最大时的矩形面积是（ ）。

A.  $\frac{4\pi}{27}$

B.  $\frac{2}{3}$

C.  $\frac{2}{9}$

D.  $\frac{27}{4}$

E. 以上都不对

---

**跟学团 均值定理 · 求积的最大值**

.....

**【例题】** 已知正实数 $x, y$ 满足 $2x + y = 2$ , 则 $xy$ 的最大值等于 ( ).

A.  $\frac{5}{8}$

B.  $\frac{1}{2}$

C.  $\frac{3}{8}$

D.  $\frac{1}{4}$

E.  $\frac{1}{8}$

**跟学团 均值定理 · 求积的最大值**

.....

**【真题2015.12】** 设点 $A(0,2)$ 和 $B(1,0)$ , 在线段 $AB$ 上取一点 $M(x,y)$  ( $0 < x < 1$ ), 则以 $x, y$ 为两边长的矩形面积的最大值为 ( )

A.  $\frac{5}{8}$

B.  $\frac{1}{2}$

C.  $\frac{3}{8}$

D.  $\frac{1}{4}$

E.  $\frac{1}{8}$

### 跟学团 均值定理逆应用

.....

【模拟题】实数 $a, b$ 的算术平均值为3, 几何平均值也为3, 则 $a - 1$ 和 $b^2 + 9$  ( $a > 1, b > 0$ ) 的算术平均值和几何平均值分别为 ( ) .

A. 10和6

B. 9和6

C. 8和8

D. 3和6

E. 6和8

### 跟学团 均值定理

.....

一正：能用套用均值不等式

二定：可求最值

三相等：能取到最值

应用	和的最小值	积的最大值
两项时	$a + b \geq 2\sqrt{ab}$	$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$
	【常用不等式链】 $2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2 \geq 4ab$	
三项时	$a + b + c \geq 3 \cdot \sqrt[3]{abc}$	$abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$
互为倒数	$a + \frac{1}{a} \geq 2$	—
逆应用	如果几个正数的算术平均值和它们的几何平均值相等, 那么这几个正数相等.	

$$2(a^2 + b^2) = a^2 + b^2 + (a^2 + b^2) \geq a^2 + b^2 + 2ab = (a + b)^2 \geq (2\sqrt{ab})^2 = 4ab$$


**基础知识** **绝对值**

.....

- 绝对值的定义（代数、几何）
- 绝对值的性质
- 去掉绝对值
- 绝对值的几何意义
- 绝对值三角不等式

**基础知识** **绝对值的定义**

.....



$$|3| = 3 \quad |1.2| = 1.2 \quad |\sqrt{2}| = \sqrt{2} \quad \text{正数的绝对值是它本身}$$

$$|-3| = 3 \quad |-1.2| = 1.2 \quad |-\sqrt{2}| = \sqrt{2} \quad \text{负数的绝对值是它的相反数}$$

$$|0| = 0 \quad \text{零的绝对值是零}$$




**基础知识**

.....

**绝对值的性质**

任意实数 $a$ 的绝对值,  $|a| = \begin{cases} a > 0 & |a| = a \\ a = 0 & |a| = 0 \\ a < 0 & |a| = -a \end{cases}$  负号表示“相反”  
分情况讨论：先判断符号，再求绝对值.



(1)  $|a| \geq a$ , 即一个数的绝对值大于等于它本身.

**考点一 绝对值的性质**

.....

【例题1】（条件充分性判断）实数 $a, b$ 满足 $|a|(a+b) > a|a+b|$  ( ).


(1)  $a < 0$ .

(2)  $b > -a$ .

### 基础知识 绝对值的性质

.....

任意实数 $a$ 的绝对值,  $|a| = \begin{cases} a & (\text{当 } a > 0 \text{ 时}) \\ 0 & (\text{当 } a = 0 \text{ 时}) \\ -a & (\text{当 } a < 0 \text{ 时}) \end{cases}$




$$(2) \sqrt{a^2} = |a| \quad \sqrt{2^2} = \sqrt{4} = 2 = |2| \quad \sqrt{(-2)^2} = \sqrt{4} = 2 = |-2|$$

$$(3) |a|^2 = |a^2| = a^2 \quad |2|^2 = |2^2| = 2^2 = 4 \quad |-2|^2 = |(-2)^2| = (-2)^2 = 4$$

### 基础知识 绝对值的性质

.....

任意实数 $a$ 的绝对值,  $|a| = \begin{cases} a & (\text{当 } a > 0 \text{ 时}) \\ 0 & (\text{当 } a = 0 \text{ 时}) \\ -a & (\text{当 } a < 0 \text{ 时}) \end{cases}$



(4)  $|a| = |-a|$ : 对称性, 即互为相反数的两个数的绝对值相等.

(5) 若 $|a| = 3$ , 则 $a$ 的可能取值有两个, 为 $a = 3$ 或 $a = -3$ , 即 $a = \pm 3$

↑

可换为任意正实数

(6) 逆应用: 若已知 $|a| = a$ , 则一定有 $a \geq 0$

若已知 $|a| = -a$ , 则一定有 $a \leq 0$

### ① 绝对值的性质

.....

【例题2】已知 $\sqrt{x^3 + 2x^2} = -x\sqrt{2+x}$ , 则 $x$ 的取值范围是 ( ) .

- A.  $x < 0$       B.  $x \geq -2$       C.  $-2 \leq x \leq 0$       D.  $-2 < x < 0$       E. 以上均不正确

### 基础知识 绝对值的性质

.....

任意实数 $a$ 的绝对值,  $|a| = \begin{cases} a & (\text{当 } a > 0 \text{ 时}) \\ 0 & (\text{当 } a = 0 \text{ 时}) \\ -a & (\text{当 } a < 0 \text{ 时}) \end{cases}$

(7) 自比性:  $\frac{|a|}{a} = \frac{a}{|a|} = \begin{cases} 1 & (a > 0) \\ -1 & (a < 0) \end{cases}$  任一非零代数式与其绝对值的比值为+1或-1

$a > 0$	$ a  = a$	$\frac{ a }{a} = \frac{a}{ a } = 1$
$a < 0$	$ a  = -a$	$\frac{ a }{a} = \frac{a}{ a } = -1$

### ① 绝对值的性质

.....

【例题3】已知  $\frac{|a|}{a} + \frac{b}{|b|} + \frac{|c|}{c} = 1$ , 则  $\frac{|ab|}{ab} + \frac{bc}{|bc|} + \frac{|ac|}{ac} + \frac{abc}{|abc|} = ( \quad )$ .

A. 2

B. 1

C. 0


D. -1

E. -2

### 基础知识 绝对值的性质

.....

任意实数  $a$  的绝对值,  $|a| = \begin{cases} a & (\text{当 } a > 0 \text{ 时}) \\ 0 & (\text{当 } a = 0 \text{ 时}) \\ -a & (\text{当 } a < 0 \text{ 时}) \end{cases}$



条件等式数量少，形式复杂，未知量多，无法向待求式转化。

【标志词汇】 $|(\quad)| + \sqrt{(\quad)} + (\quad)^2 = 0$

每一个算式分别为零，进而得到关于未知字母的方程组，解方程。

(8) 非负性:  $|a| \geq 0$ .  $|a| \geq 0$ ,  $\sqrt{a} \geq 0$  ( $a \geq 0$ ),  $a^2 \geq 0$ .  $\sqrt{a^2} = |a|$

$$|a - 3| = 0$$

$$|x - 2| + |y - 3| = 0$$

$$|x - 1| + \sqrt{y + 2} + (z - 3)^2 = 0$$

$$\sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{y + 2} + (z - 3)^2 = 0$$

$$\sqrt{(x - 1)^2} = |x - 1|$$

**考点一 绝对值的性质**

.....

【例题4】已知 $|x - y + 1| + (2x - y)^2 = 0$ ，则 $2^x + y^3 = ( \quad )$ 。

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

E. 12

**考点一 绝对值的性质**

.....

【例题5】设 $x, y, z$ 满足 $|3x + y - z - 2| + (2x + y - z)^2 = \sqrt{x + y - 2002} + \sqrt{2002 - x - y}$ ，  
则 $(y - z)^x$ 的值为 $( \quad )$ 。

A. 0

B. 1

C. 16

D. 20

E. 24

### ③②① 绝对值的性质

.....

【例题6】已知实数 $a, b, x, y$ 满足 $y + |\sqrt{x} - \sqrt{2}| = 1 - a^2$ 和 $|x - 2| = y - 1 - b^2$ , 则 $3^{x+y} + 3^{a+b} = ( \quad )$ .

A. 25

B. 26

C. 27

D. 28

E. 29

### ③②① 绝对值的性质

.....

【例题7】设 $x, y, z$ 满足条件 $|x^2 + 4xy + 5y^2| + \sqrt{z + \frac{1}{2}} = -2y - 1$ , 则 $(4x - 10y)^z$ 等于 ( )

A. 1

B.  $\sqrt{2}$

C.  $\frac{\sqrt{2}}{6}$

D. 2

E.  $\frac{1}{2}$

### 基础知识 拓展·常见方程整理方法

.....

**普通方程：**将所有项全部移至等号左边，等号右边为零.

**无理方程：**将无理部分移至等号一边，有理部分移至另一边.

**多变量方程：**将变量分离，如将包含 $x$ 的移项至方程一边，包含 $y$ 的移项至另一边.

**含参方程：**将带参数的部分移至等号一边，其余部分移至另一边，如

$$kx - y + 8 - 6k = 0 \text{ 移项为 } k(x - 6) = y - 8, \text{ 此即参变分离.}$$

**通用整理：**向能提取出待求式方向整理.

$$x^2 - 4xy + 4y^2 + \sqrt{3}x + \sqrt{3}y - 6 = 0, \text{ 求 } x + y \text{ 最值.}$$

$$(x - 2y)^2 + \sqrt{3}(x + y) - 6 = 0 \quad x + y = \frac{6 - (x - 2y)^2}{\sqrt{3}} \leq \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

**多个方程：**全部相加.

### 基础知识 绝对值性质总结

.....

(1)  $|a| \geq a$

(2)  $\sqrt{a^2} = |a|$ .

(3)  $|a|^2 = |a^2| = a^2$ .

(4)  $|a| = |-a|$

(5) 若 $|a| = 3$ , 则 $a = \pm 3$ .

(6) 若已知 $|a| = a$ , 则一定有 $a \geq 0$

若已知 $|a| = -a$ , 则一定有 $a \leq 0$

(7) 自比性:  $\frac{|a|}{a} = \frac{a}{|a|} = \begin{cases} 1 & (a > 0) \\ -1 & (a < 0) \end{cases}$

(8) 非负性:  $|a| \geq 0$

任意实数 $a$ 的绝对值,  $|a| = \begin{cases} a & (\text{当 } a > 0 \text{ 时}) \\ 0 & (\text{当 } a = 0 \text{ 时}) \\ -a & (\text{当 } a < 0 \text{ 时}) \end{cases}$  代数

