

**BROUILLON - Sommer des puissances de  
différentes façons  
MANQUE DES DESSINS !**

Christophe BAL

---

## Mentions « légales »

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons “Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International”.



*Ce document va s'intéresser à différents moyens de trouver les formules de sommation de puissances successives en commençant par le cas très particulier des puissances de 2 pour passer ensuite au cas général. Certaines méthodes générales ont été découvertes par l'auteur, mais pour ce qui est du cas particulier des puissances de 2, ce sont soit des résultats classiques, soit des propositions trouvées sur le web.*

*Chaque section a été rédigée pour être lue indépendamment des autres quitte à répéter certains calculs ou raisonnements que l'on trouve ailleurs dans le document.*

### ***Abréviations utilisées pour les titres des sections***

- **ALG** : méthode ALG-ébrique

## Table des matières

Chapitre 1. Sommer les puissances de 2	5
1. [ALG] Jouons avec les écritures	5
2. [ALG] Sommes télescopiques	8
3. AFFAIRE À SUIVRE...	10



## Sommer les puissances de 2

### 1. [ALG] Jouons avec les écritures

**1.1. La preuve.** Les calculs suivants sont très simples à suivre mais malheureusement peu éclairants d'un point de vue conceptuel. Le cas où  $n = 0$  étant évident, on suppose par la suite que  $n \in \mathbb{N}^*$ .

$$\begin{aligned}
 S_n &\stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n 2^k \iff S_n = 1 + \sum_{k=1}^n 2^k && \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} k = i + 1 \iff i = k - 1 \\
 &\iff S_n = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} 2^{i+1} \\
 &\iff S_n = 1 + 2 \sum_{i=0}^{n-1} 2^i && \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} \text{Faisons apparaître la somme « réduite » à gauche.} \\
 &\iff \sum_{k=0}^{n-1} 2^k + 2^n = 1 + 2 \sum_{i=0}^{n-1} 2^i \\
 &\iff S_{n-1} + 2^n = 1 + 2S_{n-1} \\
 &\iff 2^n - 1 = S_{n-1} \\
 &\iff S_{n-1} = 2^n - 1
 \end{aligned}$$

Donc  $S_0 = 1$  et  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $S_{n-1} = 2^n - 1$ . Ceci peut se réécrire :  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $S_n = 2^{n+1} - 1$ .

**1.2. Commentaires.** La méthode précédente se généralise sans souci aux puissances de  $q$  comme nous le verrons dans la section ?? page ??. Par contre elle n'éclaire en rien sur la signification de la formule trouvée mais a l'avantage d'être prouvable via un ordinateur.

**1.3. D'autres applications.** La réécriture de sommes peut permettre de trouver des sommes du type  $\sum_{k=0}^n k^p$ . Montrons par exemple comment trouver une formule explicite de la somme<sup>1</sup> suivante  $G_n \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n k$  où nous laissons de nouveau de côté le cas trivial où  $n = 0$ . L'idée est de réécrire  $C_n \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n k^2$  et non  $G_n$  car nous allons voir que la réécriture va éliminer les carrés<sup>2</sup>.

$$\begin{aligned}
 C_n &\stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n k^2 \iff C_n = 0 + \sum_{k=1}^n k^2 && \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} k = i + 1 \iff i = k - 1 \\
 &\iff C_n = \sum_{i=0}^{n-1} (i+1)^2
 \end{aligned}$$

1. La lettre  $G$  faire référence à Gauss à qui l'on attribue une méthode très astucieuse pour calculer cette somme en la réordonnant.

2. Ce principe d'élimination se repère vite si l'on raisonne directement en réécrivant la somme cherchée  $G_n$ .

$$\begin{aligned}
C_n &\stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n k^2 \iff C_n = \sum_{i=0}^{n-1} (i^2 + 2i + 1) \\
&\iff C_n = \sum_{i=0}^{n-1} i^2 + 2 \sum_{i=0}^{n-1} i + \sum_{i=0}^{n-1} 1 \\
&\iff C_n = C_{n-1} + 2G_{n-1} + n \\
&\iff C_{n-1} + n^2 = C_{n-1} + 2G_{n-1} + n \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{Apparition de la somme « réduite » à gauche.} \\
&\iff n^2 = 2G_{n-1} + n \\
&\iff n^2 - n = 2G_{n-1} \\
&\iff G_{n-1} = \frac{n(n-1)}{2}
\end{aligned}$$

Donc  $G_0 = 0$  et  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $G_{n-1} = \frac{n(n-1)}{2}$ . Ceci se réécrit :  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ .

On peut continuer de façon analogue pour obtenir une formule explicite de  $C_n$  via la somme des cubes d'entiers successifs, puis ensuite on en aura une pour la somme des cubes elle-même mais les calculs deviennent vite pénibles<sup>3</sup>... Voici la partie importante pour découvrir que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$\begin{aligned}
D_n &\stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n k^3 \iff D_n = \sum_{i=0}^{n-1} (i+1)^3 \\
&\iff D_n = \sum_{i=0}^{n-1} (i^3 + 3i^2 + 3i + 1) \\
&\iff D_n = D_{n-1} + 3C_{n-1} + 3G_{n-1} + n \\
&\iff n^3 = 3C_{n-1} + 3G_{n-1} + n \\
&\iff 3C_{n-1} = n^3 - 3 \cdot \frac{n(n-1)}{2} - n \\
&\iff 6C_{n-1} = 2n^3 - 3n(n-1) - 2n \\
&\iff 6C_{n-1} = n(2n^2 - 3n + 1) \\
&\iff 6C_{n-1} = n(n-1)(2n-1) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} 1 \text{ est une racine évidente de } 2X^2 - 3X + 1.
\end{aligned}$$

Finissons en montrant que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left( \sum_{k=0}^n k \right)^2$ . Que c'est joli<sup>4</sup>! Notez que les calculs se compliquent vite et rendent la preuve très inélégante.

$$\begin{aligned}
E_n &\stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n k^4 \iff E_n = \sum_{i=0}^{n-1} (i^4 + 4i^3 + 6i^2 + 4i + 1) \\
&\iff n^4 = 4D_{n-1} + 6C_{n-1} + 4G_{n-1} + n \\
&\iff 4D_{n-1} = n^4 - n(n-1)(2n-1) - 2n(n-1) - n \\
&\iff 4D_{n-1} = n(n^3 - (n-1)(2n-1) - 2(n-1) - 1) \\
&\iff 4D_{n-1} = n(n-1)(n^2 + n + 1 - (2n-1) - 2) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} n^3 - 1 = (n-1)(n^2 + n + 1)
\end{aligned}$$

3. En fait il existe une formulation générale faisant intervenir les nombres de Bernoulli qui ont de jolies propriétés.

4. Il existe une jolie preuve visuelle de ce résultat mais nous n'en parlerons pas dans ce document.

$$\begin{aligned}
E_n &\stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n k^4 \iff 4D_{n-1} = n(n-1)(n^2-n) \\
&\iff 4D_{n-1} = n^2(n-1)^2
\end{aligned}$$

## 2. [ALG] Sommes télescopiques

**2.1. La preuve.** Pour trouver une formule explicite de  $S_n \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n 2^k$ , on peut noter que  $2^k = 2 \cdot 2^{k-1} = 2^{k-1} + 2^{k-1}$  donne  $2^{k-1} = 2^k - 2^{k-1}$  d'où l'on déduit que  $\forall k \in \mathbb{N}$ ,  $2^k = 2^{k+1} - 2^k$ . Ceci nous conduit aux calculs suivants.

$$\begin{aligned}
 S_n &\stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n 2^k \iff S_n = \sum_{k=0}^n (2^{k+1} - 2^k) \\
 &\iff S_n = \sum_{k=0}^n 2^{k+1} - \sum_{k=0}^n 2^k \\
 &\iff S_n = \sum_{i=1}^{n+1} 2^i - \sum_{k=0}^n 2^k \\
 &\iff S_n = \sum_{i=1}^n 2^i + 2^{n+1} - 2^0 - \sum_{k=1}^n 2^k \\
 &\iff S_n = 2^{n+1} - 1
 \end{aligned}$$

$i = k + 1 \iff k = i - 1$   
*On fait apparaître des sommes identiques.*

**2.2. Commentaires.** Les simplifications du type  $\sum_{k=0}^n (2^{k+1} - 2^k) = 2^{n+1} - 2^0$ , ou plus généralement du type  $\sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_0$  ou  $\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$ , sont un grand classique : on parle de « sommes télescopiques »<sup>5</sup>. Cette astuce se généralise sans souci aux puissances de  $q$  comme nous le verrons dans la section ?? page ??. Bien qu'élégants du point de vue algébrique, les calculs ci-dessus ne donnent aucune information sur la signification de la formule trouvée.

**2.3. D'autres applications.** Une application rigolote est l'obtention d'une formule explicite de la somme  $I_n \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ . Une fois noté que  $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$  le calcul est très aisé<sup>6</sup>.

$$\begin{aligned}
 I_n &\stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \\
 &= \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} \\
 &= \frac{n}{n+1}
 \end{aligned}$$

*Usage de sommes télescopiques.*

On peut aussi utiliser des sommes télescopiques pour expliciter  $\sum_{k=0}^n k^p$ . Montrons par exemple comment trouver une formule explicite de la somme<sup>7</sup> suivante  $G_n \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n k$ . L'idée astucieuse consiste à noter que  $(k+1)^2 - k^2 = 2k + 1$  puis à procéder comme suit.

5. Cette technique permet par exemple de ramener l'étude d'une suite à celle d'une série. Or il se trouve que l'on dispose d'outils très pratiques pour étudier les séries.

6. Cet exemple est conçu comme un cas typique d'usage de sommes télescopiques.

7. La lettre  $G$  faire référence à Gauss à qui l'on attribue une méthode très astucieuse pour calculer cette somme en la réordonnant.



$$\begin{aligned}
2G_n &= \sum_{k=0}^n 2k \\
&= \sum_{k=0}^n ((k+1)^2 - k^2 - 1) \\
&= \sum_{k=0}^n ((k+1)^2 - k^2) - \sum_{k=0}^n 1 \quad \left. \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} \right\} \text{Usage de sommes télescopiques.} \\
&= (n+1)^2 - 0^2 - (n+1) \\
&= (n+1)((n+1) - 1) \\
&= n(n+1)
\end{aligned}$$

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ . La preuve précédente est relativement élégante : vous pourrez comparer avec celle proposée dans la section 1 page 5. Continuons pour obtenir une formule explicite de  $C_n \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k=0}^n k^2$  via  $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$  et la formule précédente.

$$\begin{aligned}
3C_n &= \sum_{k=0}^n 3k^2 \\
&= \sum_{k=0}^n ((k+1)^3 - k^3 - 3k - 1) \\
&= \sum_{k=0}^n ((k+1)^3 - k^3) - 3 \sum_{k=0}^n k - \sum_{k=0}^n 1 \quad \left. \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} \right\} \text{Usage de sommes télescopiques.} \\
&= (n+1)^3 - 0^3 - 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - (n+1) \\
&= \frac{1}{2} [2(n+1)^3 - 3n(n+1) - 2(n+1)] \\
&= \frac{(n+1)}{2} \cdot (2(n+1)^2 - 3n - 2) \\
&= \frac{(n+1)}{2} \cdot (2(n^2 + 2n + 1) - 3n - 2) \\
&= \frac{(n+1)(2n^2 + n)}{2} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}
\end{aligned}$$

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

Finissons en montrant que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left( \sum_{k=0}^n k \right)^2$ . Un très joli résultat<sup>8</sup> ! Nous allons utiliser de  $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$ . Notez que les calculs se compliquent vite et rendent la preuve de moins en moins élégante<sup>9</sup>.

$$4 \sum_{k=0}^n k^3 = \sum_{k=0}^n ((k+1)^4 - k^4 - 6k^2 - 4k - 1)$$

8. Une excellente preuve visuelle de ce résultat existe mais ceci est une autre histoire...

9. Un bon cadre d'étude pour des puissances plus élevées est celui utilisant les nombres de Bernoulli qui ont de jolies propriétés.

$$\begin{aligned}
4 \sum_{k=0}^n k^4 &= \sum_{k=0}^n ((k+1)^4 - k^4) - 6 \sum_{k=0}^n k^2 - 4 \sum_{k=0}^n k - \sum_{k=0}^n 1 \\
&= (n+1)^4 - 0^4 - 6 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - (n+1) \\
&= (n+1) ((n+1)^3 - n(2n+1) - 2n - 1) \\
&= (n+1) ((n+1)^3 - 2n^2 - 3n - 1) \\
&= (n+1) ((n+1)^3 - (n+1)(2n+1)) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} (-1) \text{ est une racine évidente de } 2X^2 + 3X + 1. \\
&= (n+1)^2 ((n+1)^2 - 2n - 1) \\
&= n^2(n+1)^2
\end{aligned}$$

---

### 3. AFFAIRE À SUIVRE...

---