

NEWTON, BERNOULLI, LEIBNIZ & FIBONACCI

CHRISTOPHE BAL

*Document, avec son source L^AT_EX, disponible sur la page
<https://github.com/bc-writings/bc-public-docs/tree/main/drafts>.*

Mentions « légales »

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons “Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International”.



TABLE DES MATIÈRES

1. Des identités bien connues	2
2. Dites-les avec des arbres	2
3. La formule du binôme de Newton implique...	2

1. DES IDENTITÉS BIEN CONNUES

Les formules suivantes, qui sont de grands classiques pour les trois premières,¹ partagent une ressemblance évidente. Nous allons donner deux démonstrations de ces identités via deux méthodes rendant moins mystérieuses ces similarités portant sur des objets a priori bien différents. Ci-après, δ_{jk} désigne le symbole de Kronecker valant 1 si $j = k$, et 0 sinon, tandis que X est la variable aléatoire comptant le nombre de succès d'un schéma de Bernoulli de paramètre $(n; p)$, et enfin $(F_k)_{k \in \mathbb{N}}$ correspond à la suite de Fibonacci.

- **Formule du binôme de Newton** : $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.
- **Formule de dérivation de Leibniz** : $(fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$.
- **Loi binomiale** : $P(X = j) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \delta_{jk}$.
- **Expression de F_{2n} en fonction de F_k précédents** : $F_{2n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} F_k$.

2. DITES-LES AVEC DES ARBRES !

XXXX

3. LA FORMULE DU BINÔME DE NEWTON IMPLIQUE...

XXXX

1. La 4^e identité est un classique des classes préparatoires.