

# BROUILLON - CARRÉS PARFAITS ET PRODUITS D'ENTRIERS CONSÉCUTIFS – UNE MÉTHODE EFFICACE

CHRISTOPHE BAL

*Document, avec son source L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, disponible sur la page  
<https://github.com/bc-writing/drafts>.*

---

## Mentions « légales »

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons « Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International ».



---

## TABLE DES MATIÈRES

1.	Ce qui nous intéresse	2
2.	Notations utilisées	2
3.	Les carrés parfaits	2
3.1.	Structure	2
3.2.	Distance entre deux carrés parfaits	2
4.	Prenons du recul	4
4.1.	Les <b>sf</b> -tableaux	4
4.2.	Construire des <b>sf</b> -tableaux	4
5.	Structure des <b>sf</b> -tableaux	5
5.1.	A propos des <b>sf</b> -tableaux partiels	5
5.2.	A propos des <b>sf</b> -tableaux non partiels	5
6.	Premières applications	6
6.1.	Le cas de 2 facteurs	6
6.2.	Le cas de 3 facteurs	6
6.3.	Le cas de 4 facteurs	7
6.4.	Le cas de 5 facteurs	8
7.	Et après ?	9
7.1.	La méthode via le cas de 6 facteurs	9
7.2.	Le cas de 7 facteurs	10
8.	Sources utilisées	10
9.	AFFAIRE À SUIVRE...	11

## 1. CE QUI NOUS INTÉRESSE

Dans l'article « Note on Products of Consecutive Integers »<sup>1</sup>, Paul Erdős démontre que pour tout couple  $(n, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ , le produit de  $(k+1)$  entiers consécutifs  $n(n+1) \cdots (n+k)$  n'est jamais le carré d'un entier. Plus précisément, l'argument général de Paul Erdős est valable pour  $k+1 \geq 100$ , soit à partir de 100 facteurs.

Il est facile de trouver sur le web des preuves à la main de  $n(n+1) \cdots (n+k) \notin {}^2_*\mathbb{N}$  pour  $k \in \llbracket 1; 7 \rrbracket$ . Bien que certaines de ces preuves soient très sympathiques, leur lecture ne fait pas ressortir de schéma commun de raisonnement. Dans ce document, nous allons tenter de limiter au maximum l'emploi de fourberies déductives en présentant une méthode très élémentaire<sup>2</sup>, efficace, et semi-automatisable, pour démontrer, avec peu d'efforts cognitifs, les premiers cas d'impossibilité.

## 2. NOTATIONS UTILISÉES

Dans la suite, nous emploierons les notations suivantes.

- $\forall (n, k) \in (\mathbb{N}^*)^2$ ,  $\pi_n^k = \prod_{i=0}^{k-1} (n+i)$ .

Par exemple,  $\pi_n^1 = n$ ,  $\pi_n^2 = n(n+1)$  et  $\pi_{n+2}^4 = (n+2)(n+3)(n+4)(n+5)$ .

- ${}^2\mathbb{N} = \{n^2, n \in \mathbb{N}\}$  est l'ensemble des carrés parfaits. On note aussi  ${}^2_*\mathbb{N} = {}^2\mathbb{N} \cap \mathbb{N}^*$ .  
 $\mathbb{N}_{sf}$  est l'ensemble des naturels non nuls sans facteur carré<sup>3</sup>.
- $\mathbb{P}$  désigne l'ensemble des nombres premiers.  
 $\forall (p; n) \in \mathbb{P} \times \mathbb{N}^*$ ,  $v_p(n) \in \mathbb{N}$  est la valuation  $p$ -adique de  $n$ , c'est-à-dire  $p^{v_p(n)} \mid n$  et  $p^{v_p(n)+1} \nmid n$ , autrement dit  $p^{v_p(n)}$  divise  $n$ , contrairement à  $p^{v_p(n)+1}$ .
- $\mathbb{N}_{sc}^r$  désigne l'ensemble des suites finies strictement croissantes de  $r$  entiers naturels.  
 $\mathbb{P}_{sc}^r$  désigne l'ensemble des suites finies strictement croissantes de  $r$  nombres premiers.
- $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2$ ,  $n \wedge m$  désigne le PGCD de  $n$  et  $m$ .
- $2\mathbb{N}$  désigne l'ensemble des nombres naturels pairs.  
 $2\mathbb{N} + 1$  est l'ensemble des nombres naturels impairs.

## 3. LES CARRÉS PARFAITS

### 3.1. Structure.

**Fait 3.1.**  $\forall n \in {}^2_*\mathbb{N}$ ,  $\forall p \in \mathbb{P}$ , nous avons  $v_p(n) \in 2\mathbb{N}$ .

*Démonstration.* Immédiat à valider. □

**Fait 3.2.**  $\forall n \in {}^2_*\mathbb{N}$ , s'il existe  $m \in {}^2_*\mathbb{N}$  tel que  $n = fm$  alors  $f \in {}^2_*\mathbb{N}$ .

*Démonstration.*  $\forall p \in \mathbb{P}$ ,  $v_p(fm) \in 2\mathbb{N}$ ,  $v_p(m) \in 2\mathbb{N}$  et  $v_p(fm) = v_p(f) + v_p(m)$  donnent  $v_p(f) \in 2\mathbb{N}$ . □

### 3.2. Distance entre deux carrés parfaits.

**Fait 3.3.** Soit  $(N, M) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$  tel que  $N > M$ .

(1)  $N^2 - M^2 \geq 2N - 1$ .

1. J. London Math. Soc. 14 (1939).

2. Cette méthode s'appuie sur une représentation trouvée dans un message archivé : voir la section 8.

3. En anglais, on dit « square free ».

(2) Notons  $nb_{sol}$  le nombre de solutions  $(N, M) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$  de  $N^2 - M^2 = \delta$ .

Pour  $\delta \in \llbracket 1; 100 \rrbracket$ , nous avons :

- (a)  $nb_{sol} = 0$  si  $\delta \in \{1, 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98\}$ .
- (b)  $nb_{sol} = 1$  si  $\delta \in \{3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 31, 36, 37, 41, 43, 44, 47, 49, 52, 53, 59, 61, 67, 68, 71, 73, 76, 79, 83, 89, 92, 97, 100\}$ .
- (c)  $nb_{sol} = 2$  si  $\delta \in \{15, 21, 24, 27, 32, 33, 35, 39, 40, 51, 55, 56, 57, 60, 64, 65, 69, 77, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 95\}$ .
- (d)  $nb_{sol} = 3$  si  $\delta \in \{45, 48, 63, 72, 75, 80, 99\}$ .
- (e)  $nb_{sol} = 4$  si  $\delta = 96$ .

*Démonstration.*

- (1) Comme  $N - 1 \geq M$ , nous obtenons :  $N^2 - M^2 \geq N^2 - (N - 1)^2 = 2N - 1$ .
- (2) Le point précédent permet d'utiliser le programme Python suivant afin d'obtenir rapidement les longues listes de nombres indiquées.

```
from collections import defaultdict
from math import sqrt, floor

def sol(diff):
    solfound = []

    for i in range(1, (diff + 1) // 2 + 1):
        tested = i**2 - diff

        if tested < 0:
            continue

        tested = floor(sqrt(i**2 - diff))

        if tested == 0:
            continue

        if tested**2 == i**2 - diff:
            solfound.append((i, tested))

    return solfound

all_nbsol = defaultdict(list)

for d in range(1, 101):
    all_nbsol[len(sol(d))].append(d)

print(all_nbsol)
```

□

## 4. PRENONS DU REcul

4.1. Les **sf**-tableaux.

L'idée de départ est simple : d'après le fait 3.2, il semble opportun de se concentrer sur les diviseurs sans facteur carré des  $k$  facteurs  $(n+i)$  de  $\pi_n^k = n(n+1) \cdots (n+k-1)$ .

**Définition 4.1.** *Considérons  $(n, k) \in (\mathbb{N}^*)^2$ ,  $(a_i)_{0 \leq i \leq k} \subset \mathbb{N}_{sf}$  et  $(s_i)_{0 \leq i \leq k} \subset {}^2\mathbb{N}$  tels que  $\forall i \in \llbracket 0; k \rrbracket$ ,  $n+i = a_i s_i$ . Cette situation est résumée par le tableau suivant que nous nommerons « **sf**-tableau »<sup>4</sup>.*

$n + \bullet$	0	1	2	...	k
	$a_0$	$a_1$	$a_2$	...	$a_k$

**Exemple 4.1.** *Supposons avoir le **sf**-tableau suivant où  $n \in \mathbb{N}^*$ .*

$n + \bullet$	0	1	2	3
	2	5	6	1

*Ceci résume la situation suivante.*

- $\exists A \in \mathbb{N}^*$  tel que  $n = 2A^2$ .
- $\exists B \in \mathbb{N}^*$  tel que  $n + 1 = 5B^2$ .
- $\exists C \in \mathbb{N}^*$  tel que  $n + 2 = 6C^2$ .
- $\exists D \in \mathbb{N}^*$  tel que  $n + 3 = D^2$ .

**Définition 4.2.** *Soient  $r \in \mathbb{N}^*$ ,  $(n_i)_{1 \leq i \leq r} \in \mathbb{N}_{sc}^r$ ,  $(a_i)_{1 \leq i \leq r} \subset \mathbb{N}_{sf}$  et  $(s_i)_{1 \leq i \leq r} \subset {}^2\mathbb{N}$  tels que  $\forall i \in \llbracket 1; r \rrbracket$ ,  $n_i = a_i s_i$ . Cette situation est résumée par le tableau suivant que nous nommerons « **sf**-tableau généralisé ».*

$\bullet$	$n_1$	$n_2$	$n_3$	...	$n_r$
	$a_1$	$a_2$	$a_3$	...	$a_r$

4.2. Construire des **sf**-tableaux.

Pour fabriquer des **sf**-tableaux, nous allons « multiplier » des **sf**-tableaux dits partiels.

**Définition 4.3.** *Soient  $(n, k, r) \in (\mathbb{N}^*)^3$ ,  $(p_j)_{1 \leq j \leq r} \in \mathbb{P}_{sc}^r$ ,  $(\epsilon_{i,j})_{0 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq r} \subseteq \{0, 1\}$  et aussi  $(f_i)_{0 \leq i \leq k} \subset \mathbb{N}^*$  vérifiant les conditions suivantes.*

- $\forall i \in \llbracket 0; k \rrbracket$ ,  $n + i = f_i \cdot \prod_{j=1}^r p_j^{v_{p_j}(n+i)}$ . Noter que  $\forall i \in \llbracket 0; k \rrbracket$ ,  $\forall j \in \llbracket 1; r \rrbracket$ ,  $f_i \wedge p_j = 1$ .
- $\forall i \in \llbracket 0; k \rrbracket$ ,  $\forall j \in \llbracket 1; r \rrbracket$ ,  $v_{p_j}(n+i) \equiv \epsilon_{i,j} \text{ modulo } 2$ .

*Cette situation est résumée par le tableau suivant qui sera nommé « **sf**-tableau partiel », voire « **sf**-tableau partiel d'ordre  $(p_j)_{1 \leq j \leq r}$  »<sup>5</sup>.*

$n + \bullet$	0	1	2	...	k
$(p_j)_{1 \leq j \leq r}$	$\prod_{j=1}^r p_j^{\epsilon_{0,j}}$	$\prod_{j=1}^r p_j^{\epsilon_{1,j}}$	$\prod_{j=1}^r p_j^{\epsilon_{2,j}}$	...	$\prod_{j=1}^r p_j^{\epsilon_{k,j}}$

**Exemple 4.2.** *Supposons avoir le **sf**-tableau partiel suivant où  $n \in \mathbb{N}^*$ .*

$n + \bullet$	0	1	2	3
$(2, 3)$	2	6	1	3

4. « sf » est pour « square free ».

5. Noter que  $\forall i \in \llbracket 0; k \rrbracket$ ,  $\forall j \in \llbracket 1; r \rrbracket$ ,  $p_j^{\epsilon_{i,j}} \in \{1, p_j\}$ .

Ceci résume la situation suivante.

- $\exists(a, \alpha, A) \in \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^*$  tel que  $A \wedge 6 = 1$  et  $n = 2^{2a+1}3^{2\alpha}A$ .
- $\exists(b, \beta, B) \in \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^*$  tel que  $B \wedge 6 = 1$  et  $n + 1 = 2^{2b+1}3^{2\beta+1}B$ .
- $\exists(c, \gamma, C) \in \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^*$  tel que  $C \wedge 6 = 1$  et  $n + 2 = 2^{2c}3^{2\gamma}C$ .
- $\exists(d, \delta, D) \in \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^*$  tel que  $D \wedge 6 = 1$  et  $n + 3 = 2^{2d}3^{2\delta+1}D$ .

**Exemple 4.3.** La multiplication de deux *sf*-tableaux partiels est « naturelle » lorsqu'elle porte sur des suites  $(p_j)_{1 \leq j \leq r} \in \mathbb{P}_{sc}^r$  et  $(q_j)_{1 \leq j \leq s} \in \mathbb{P}_{sc}^s$  d'intersection vide, c'est-à-dire sans nombre premier commun.

Considérons les deux *sf*-tableaux partiels suivants où l'on note 2 et 3 au lieu de (2) et (3).

$n + \bullet$	0	1	2	3
2	1	2	1	2

$n + \bullet$	0	1	2	3
3	3	1	1	3

La multiplication de ces *sf*-tableaux partiels est le *sf*-tableau suivant, partiel a priori, mais si l'on sait que 2 et 3 sont les seuls diviseurs premiers de  $\pi_n^4$ , alors le *sf*-tableau est non partiel.

$n + \bullet$	0	1	2	3
(2, 3)	3	2	1	6

Ceci résume la situation suivante qui est équivalente à ce que donne la conjonction des deux premiers *sf*-tableaux partiels (les abus de notations sont évidents).

- $A \wedge 6 = 1$  et  $n = 2^{2a}3^{2\alpha+1}A$ .
- $B \wedge 6 = 1$  et  $n + 1 = 2^{2b+1}3^{2\beta}B$ .
- $C \wedge 6 = 1$  et  $n + 2 = 2^{2c}3^{2\gamma}C$ .
- $D \wedge 6 = 1$  et  $n + 3 = 2^{2d+1}3^{2\delta+1}D$ .

## 5. STRUCTURE DES SF-TABLEAUX

### 5.1. A propos des *sf*-tableaux partiels.

**Fait 5.1.** Dans la deuxième ligne d'un *sf*-tableau partiel d'ordre  $p$ , les positions des valeurs  $p$  sont congrues modulo  $p$ .

*Démonstration.* Penser aux multiples de  $p$ . □

**Fait 5.2.**  $\forall(n, k, p) \in (\mathbb{N}^*)^2 \times \mathbb{P}$ , si  $\pi_n^k \in {}^2\mathbb{N}$ , alors dans le *sf*-tableau partiel d'ordre  $p$  associé à  $\pi_n^k$ , le nombre de valeurs  $p$  est forcément pair.

*Démonstration.* Évident, mais très pratique, comme nous le verrons dans la suite. □

### 5.2. A propos des *sf*-tableaux non partiels.

**Fait 5.3.** Dans les tableaux ci-dessous, où  $k \geq 2$ , les puces  $\bullet$  indiquent des valeurs quelconques.

(1) Si nous avons un *sf*-tableau du type suivant, alors  $\pi_n^{k-1} \in {}^2_*\mathbb{N}$ .

$n + \bullet$	0	1	...	$k-1$	$k$
	$\bullet$	$\bullet$	...	$\bullet$	1

(2) Si nous avons un *sf*-tableau du type suivant, alors  $\pi_{n+1}^{k-1} \in {}^2_*\mathbb{N}$ .

$n + \bullet$	0	1	...	$k-1$	$k$
	1	$\bullet$	...	$\bullet$	$\bullet$

*Démonstration.* Immédiat via le fait 3.2, car nous avons soit  $n + k \in {}^2_*\mathbb{N}$ , soit  $n \in {}^2_*\mathbb{N}$ . □

**Fait 5.4.** Soit le *sf*-tableau généralisé ci-après où  $r \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ ,  $(n_i)_{1 \leq i \leq r} \in \mathbb{N}_{sc}^r$  et  $d \in \mathbb{N}_{sf}$ .

•	$n_1$	...	$n_r$
	$d$	...	$d$

Ce *sf*-tableau est impossible si l'une des deux conditions suivantes est validée.

- (1)  $\frac{n_r - n_1}{d} \notin \mathbb{N}$ .
- (2)  $\frac{n_r - n_1}{d} \in \{1, 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98\}$ .

*Démonstration.*  $n_1 = dA^2$  et  $n_r = dB^2$  nous donnent  $d(B^2 - A^2) = n_r - n_1$ . On conclut directement pour le premier cas, et via le fait 3.3 dans le second.  $\square$

## 6. PREMIÈRES APPLICATIONS

### 6.1. Le cas de 2 facteurs.

Supposons que  $\pi_n^2 = n(n+1) \in {}^2_*\mathbb{N}$ . Nous avons alors les *sf*-tableaux partiels suivants pour  $p \in \mathbb{P}$  divisant  $\pi_n^2$ , car les valeurs  $p$  de la deuxième ligne doivent apparaître un nombre pair de fois tout en étant espacées par  $(p-1)$  valeurs 1 (voir les faits 5.1 et 5.2).

$n + \bullet$	0	1
$p$	1	1

La multiplication de tous les *sf*-tableaux partiels précédents donne le *sf*-tableau, non partiel, ci-après, mais ceci contredit le fait 5.4.

$n + \bullet$	0	1
	1	1

### 6.2. Le cas de 3 facteurs.

Supposons que  $\pi_n^3 = n(n+1)(n+2) \in {}^3_*\mathbb{N}$ . Nous avons alors les *sf*-tableaux partiels suivants pour  $p \in \mathbb{P}_{\geq 3}$  divisant  $\pi_n^3$ , d'après les faits 5.1 et 5.2.

$n + \bullet$	0	1	2
$p$	1	1	1

Pour  $p = 2$ , via les faits 5.1 et 5.2, seulement deux *sf*-tableaux partiels d'ordre 2 sont possibles. Nous utilisons un abus de notation évident pour indiquer ces deux possibilités.

$n + \bullet$	0	1	2
2	1	1	1
	2	1	2

La multiplication de tous les *sf*-tableaux partiels précédents donne juste les deux *sf*-tableaux, non partiels, suivants, mais ceci est impossible d'après le fait 5.4.

$n + \bullet$	0	1	2
	1	1	1
	2	1	2

### 6.3. Le cas de 4 facteurs.

Supposons que  $\pi_n^4 = n(n+1)(n+2)(n+3) \in {}^2_*\mathbb{N}$ . Nous avons alors les **sf**-tableaux partiels suivants pour  $p \in \mathbb{P}_{\geq 4}$  divisant  $\pi_n^4$ .

$n + \bullet$	0	1	2	3
$p$	1	1	1	1

Pour  $p = 2$ , nous avons les trois **sf**-tableaux partiels d'ordre 2 donnés ci-après.

$n + \bullet$	0	1	2	3
2	1	1	1	1
	2	1	2	1
	1	2	1	2

Pour  $p = 3$ , nous obtenons les deux **sf**-tableaux partiels d'ordre 3 donnés ci-après.

$n + \bullet$	0	1	2	3
3	1	1	1	1
	3	1	1	3

La multiplication des **sf**-tableaux partiels précédents donne les **sf**-tableaux<sup>6</sup>, suivants.

$n + \bullet$	0	1	2	3
	1	1	1	1
	2	1	2	1
	1	2	1	2

$n + \bullet$	0	1	2	3
	3	1	1	3
	6	1	2	3
	3	2	1	6

Le fait 5.4 rejette quatre **sf**-tableaux : voir les cellules surlignées ci-dessous.

$n + \bullet$	0	1	2	3
	1	1	1	1
	2	1	2	1
	1	2	1	2

$n + \bullet$	0	1	2	3
	3	1	1	3
	6	1	2	3
	3	2	1	6

Ceci nous amène à étudier les deux **sf**-tableaux généralisés suivants.

$\bullet$	$n$	$n+1$	$n+2$	$n+3$
	6	1	2	3
	3	2	1	6

En posant  $x = n + \frac{3}{2} = \frac{n+(n+3)}{2}$ , nous obtenons les **sf**-tableaux généralisés suivants.

$\bullet$	$x - \frac{3}{2}$	$x - \frac{1}{2}$	$x + \frac{1}{2}$	$x + \frac{3}{2}$
	6	1	2	3
	3	2	1	6

En multipliant les colonnes 1 et 4, et aussi la 2 et la 3, nous arrivons, dans chaque cas, au même **sf**-tableau généralisé ci-dessous après avoir noté que  $6 \times 3 = 2 \times 3^2$ .

$\bullet$	$x^2 - \frac{9}{4}$	$x^2 - \frac{1}{4}$
	2	2

6. Tableaux non partiels forcément.

Comme  $x^2 - \frac{1}{4} - (x^2 - \frac{9}{4}) = 2$ , le fait 5.4 nous montre que le **sf**-tableau généralisé précédent est impossible. Joli! Non?

Noter que la fin du raisonnement n'a fait appel à aucune hypothèse sur  $\pi_n^4$ . Ceci nous donne donc le fait suivant.

**Fait 6.1.** *Aucun **sf**-tableau ne peut contenir l'un des deux **sf**-tableaux suivants.*

$m + \bullet$	0	1	2	3
	6	1	2	3
	3	2	1	6

#### 6.4. Le cas de 5 facteurs.

Supposons que  $\pi_n^5 = n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4) \in {}^2_*\mathbb{N}$ . Nous avons alors les **sf**-tableaux partiels suivants pour  $p \in \mathbb{P}_{\geq 5}$  divisant  $\pi_n^5$ .

$n + \bullet$	0	1	2	3	4
$p$	1	1	1	1	1

Pour  $p = 2$ , nous avons les **sf**-tableaux partiels d'ordre 2 donnés ci-après.

$n + \bullet$	0	1	2	3	4
2	1	1	1	1	1
	2	1	2	1	1
	2	1	1	1	2
	1	2	1	2	1
	1	1	2	1	2

Pour  $p = 3$ , nous obtenons les **sf**-tableaux partiels d'ordre 3 donnés ci-après.

$n + \bullet$	0	1	2	3	4
3	1	1	1	1	1
	3	1	1	3	1
	1	3	1	1	3

La multiplication de tous les **sf**-tableaux partiels précédents donne les 15 cas suivants.

$n + \bullet$	0	1	2	3	4
	1	1	1	1	1
	2	1	2	1	1
	2	1	1	1	2
	1	2	1	2	1
	1	1	2	1	2

$n + \bullet$	0	1	2	3	4
	3	1	1	3	1
	6	1	2	3	1
	6	1	1	3	2
	3	2	1	6	1
	3	1	2	3	2

$n + \bullet$	0	1	2	3	4
	1	3	1	1	3
	2	3	2	1	3
	2	3	1	1	6
	1	6	1	2	3
	1	3	2	1	6

Comme  $\pi_n^4 = n(n+1)(n+2)(n+3) \notin {}^2_*\mathbb{N}$  et  $\pi_{n+1}^4 = (n+1)(n+2)(n+3)(n+4) \notin {}^2_*\mathbb{N}$  d'après la section 6.3, les tableaux commençant, ou finissant, par une valeur 1 sont à ignorer d'après le fait 5.3. Cela laisse les **sf**-tableaux ci-après, mais ces derniers sont rejetés par le fait 5.4.



$n + \bullet$	0	1	2	3	4
2		1	1	1	2
6		1	1	3	2
3		1	2	3	2
2		3	2	1	3
2		3	1	1	6

## 7. ET APRÈS ?

### 7.1. La méthode via le cas de 6 facteurs.

La méthode présentée ci-dessus permet de faire appel à des programmes informatiques pour limiter les traitements à la main, et à la sueur des neurones, de **sf**-tableaux problématiques comme nous avons dû le faire dans la section 6.3. Expliquons cette tactique semi-automatique en traitant le cas de 6 facteurs.

- (1) On raisonne par l'absurde en supposant que  $\pi_n^6 \in {}^2_*\mathbb{N}$ .
- (2) Comme  $\forall p \in \mathbb{P}_{\geq 6}$ ,  $p$  divise au maximum un seul des facteurs  $(n+i)$  de  $\pi_n^6$ , nous avons juste besoin de considérer l'ensemble  $\mathcal{P} = \{2, 3, 5\}$  des diviseurs premiers stricts de 6.
- (3) Pour chaque élément  $p$  de  $\mathcal{P}$ , on construit la liste  $\mathcal{V}_p$  des **sf**-tableaux partiels relatifs à  $p$  et  $\pi_n^6 \in {}^2_*\mathbb{N}$  en s'appuyant sur la section 5.1.
- (4) Via les listes  $\mathcal{V}_p$ , on calcule toutes les multiplications de tous les **sf**-tableaux partiels relatifs à des nombres  $p$  différents, et pour chacune d'elles, on ne la garde que si elle ne vérifie aucune des conditions suivantes, celles du dernier cas devant être indiquées à la main au programme qui va donc évoluer au gré des démonstrations faites par un humain (démonstrations que l'on espère le plus rare possible).
  - (a) Le tableau commence, ou se termine, par la valeur 1. Dans ce cas, on sait par récurrence que le tableau produit n'est pas possible (voir le fait 5.3).
  - (b) Le tableau est rejeté par le fait 5.4.
  - (c) Le tableau « produit » contient un sous-tableau que nous savons impossible suite à un raisonnement humain fait *localement*, c'est-à-dire que seul les facteurs indiqués dans le sous-tableau, et le sous-tableau lui-même sont utilisés pour raisonner. C'est le cas des **sf**-tableaux du fait 6.1.

Dans le dépôt en ligne associé à ce document sont placés les fichiers **find-pb-sftab.py** et **common.py** qui nous donnent juste à analyser les deux **sf**-tableaux problématiques suivants pour lesquels nous allons justifier que les valeurs 1 posent problème<sup>7</sup>.

$n + \bullet$	0	1	2	3	4	5
30		1	2	3	1	5
5		1	3	2	1	30

Ces deux cas sont rapides à gérer car le fait 3.3 donne que 1 et 4 sont les seuls carrés distants de 3, donc  $(n+1, n+4) = (1, 4)$ , mais ceci contredit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Nous savons donc que  $\pi_n^6 \in {}^2_*\mathbb{N}$  sans effort. Notons au passage un nouveau cas problématique « local » pour nos futures recherches (le fait suivant généralise la technique que nous venons d'utiliser).

7. Toutes les règles 4-a, 4-b et 4-c sont utilisées pour n'arriver qu'aux deux **sf**-tableaux à analyser à la main.

**Fait 7.1.** Soit le *sf*-tableau généralisé ci-après où  $r \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ ,  $(n_i)_{1 \leq i \leq r} \in \mathbb{N}_{sc}^r$  et  $d \in \mathbb{N}_{sf}$ .

•	$n_1$	$\dots$	$n_r$
	$d$	$\dots$	$d$

Ce *sf*-tableau est impossible si  $n_1 \geq d + 1$  et  $\frac{n_r - n_1}{d} \in \{3, 8\}$ .

*Démonstration.* Ceci vient des équivalences logiques suivantes en posant  $n_1 = dA^2$  et  $n_r = dB^2$  avec  $(A, B) \in \mathbb{N}^2$ .

$$\frac{n_r - n_1}{d} \in \{3, 8\}$$

□

$$\iff B^2 - A^2 \in \{3, 8\}$$

$$\iff (A, B) \in \{(1, 2), (1, 3)\} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} \iff B^2 - A^2 \in \{3, 8\} \\ \iff (A, B) \in \{(1, 2), (1, 3)\} \end{matrix}} \right\} \text{ Voir le fait 3.3.}$$

$$\iff (n_1, n_r) \in \{(d, 4d), (d, 9d)\}$$

**Remarque 7.1.** On peut gérer les cas problématiques du cas 6 via des manipulations algébriques similaires à celles qui avaient donné le fait 6.1. En effet,  $x = n + \frac{5}{2}$  nous donne ce qui suit avec un abus de notation évident.

$x + \bullet$	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{2}$
	30	1	2	3	1	5
	5	1	3	2	1	30

La multiplication des colonnes 1 et 6, ainsi que celle de 3 et 4, nous amènent au même *sf*-tableau généralisé suivant après avoir noté que  $5 \times 30 = 6 \times 5^2$ .

•	$x^2 - \frac{25}{4}$	$x^2 - \frac{1}{4}$
	6	6

Comme  $x^2 - \frac{1}{4} - (x^2 - \frac{25}{4}) = 6$ , le fait 5.4 nous permet de conclure.

## 7.2. Le cas de 7 facteurs.

XXXXX

Via le fichier `auto-pb-sftab.py`, nous allons explorer plus de cas à moindre coût cognitif dans la suite.

$\pi_n^7 \notin {}^2\mathbb{N}$  est obtenu ?????

## 8. SOURCES UTILISÉES

Ce document n'aurait pas vu le jour sans la source suivante.

- (1) Une discussion archivée consultée le 28 janvier 2024 :

<https://web.archive.org/web/20171110144534/http://mathforum.org/library/drmath/view/65589.html>.

Cette discussion utilise ce que nous avons nommé les *sf*-tableaux, mais le côté semi-mécanisable de leur utilisation n'est pas souligné.

---

## 9. AFFAIRE À SUIVRE...

---