

Statistik

CH.3 - Maßzahlen

SS 2021 | | Prof. Dr. Buchwitz, Sommer, Henke

Wir geben Impulse

Ziel der folgenden Maßzahlen ist die Reduktion der Daten auf Kennzahlen, die einen Großteil der *wesentlichen* Informationen der zugrundeliegenden statistischen Variablen enthalten.

- **Lagemaße:** Beschreiben das Zentrum / die Mitte einer Beobachtungsreihe
- **Streuungsmaße:** Beschreiben die Abweichung vom Zentrum einer Häufigkeitsverteilung.
- **Konzentrationsmaße:** beschreiben, wie sich die Summe der Merkmalswerte der Beobachtungsreihe auf die Untersuchungseinheiten verteilt.

1 Lagemaße

2 Streuungsmaße


3 Konzentrationsmaße

Die folgenden Daten bilden das Gewicht (in kg) von zufällig ausgewählten Kugeln aus der Produktion einer Fabrik für Bowlingkugeln ab.

- Handelt es sich bei den vorliegenden Daten um eine Stichprobe oder um eine Grundgesamtheit?
- Welches Skalenniveau weisen die gezeigten Daten auf?
- Wie könnte man die Daten beschreiben?

	i = 1	i = 2	i = 3	i = 4	i = 5	i = 6	i = 7	i = 8
red	1.7471	3.3673	1.3287	6.1906	3.6590	1.3591	3.9749	4.4766
blue	9.7409	11.9352	7.0403	10.2196	11.4776	5.6971	9.2134	5.0044

Gewicht von 8 roten und 8 blauen Kugeln



Lagemaß	Symbol	Berechnung
Modus	\bar{x}_{Modus}	$h_{Modus} \geq h_j$
Median	\bar{x}_{Median}	$x_{\frac{n+1}{2}}$ oder $\frac{1}{2}(x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1})$
Quantil	Q_α	Wert der Verteilungsfunktion
Arithmetisches Mittel	\bar{x}	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
Geometrisches Mittel	\bar{x}_{geo}	$\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$
Harmonisches Mittel	\bar{x}_{harm}	$\frac{n}{\sum_{i=1}^n 1/x_i}$

Achtung: Nicht jede Maßzahl ist für jede Art der *Skalierung* und damit nicht für jede Variable (sinnvoll) bestimmbar.

Definition: Modus

Der **Modus** oder **Modalwert** ist die häufigste Ausprägung einer Verteilung.

- Der Modus *kann* für beliebig skalierte Variablen bestimmt werden.
- Bei klassierten Daten wird die am häufigsten auftretende Klasse als Modalklasse bezeichnet.
- Der Modus hat keine eigene **R-Funktion**, kann aber mittels absoluten oder relativen Häufigkeiten bestimmt werden.

Definition: Median

Sind $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ die der Größe nach geordneten Beobachtungswerte eines metrisch skalierten Merkmals X , ergibt sich der **Median** \bar{x}_{Median} als

$$\bar{x}_{Median} = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}} & \text{falls } n \text{ ungerade} \\ \frac{1}{2}(x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}) & \text{falls } n \text{ gerade} \end{cases}$$

- Der Median wird auch als Zentralwert bezeichnet.
- Der Median teilt die Daten in zwei gleich Große Hälften.
- Kann für metrische- und ordinalskalierte Merkmale verwendet werden.
- Ist *robust* gegenüber Ausreißern.
- **R-Funktion:** `median()`

Definition: Quantil

Das α -Quantil eines Merkmals ist der Wert, unterhalb dessen ein vorgegebener Anteil α aller Beobachtungswerte der Verteilung liegt. Dieser Wert ergibt sich aus der (empirischen) Verteilungsfunktion $S()$.

$$S(Q_\alpha) = \alpha$$

- Quantile sind Verallgemeinerungen des Medians, dieser ist $Q_{0.5}$.
- Einige Gruppen von Quantilen haben spezielle Namen
 - Quartile: $Q_{0.25}$, $Q_{0.5}$, $Q_{0.75}$
 - Percentile: $Q_{0.01}$, $Q_{0.02}$, $Q_{0.03}$, $Q_{0.04}$, . . .
- **R-Funktion:** `quantile()`

Definition: Arithmetisches Mittel

Sind x_1, \dots, x_n die Beobachtungswerte eines metrisch skalierten Merkmals X , so errechnet sich das **arithmetische Mittel** durch


$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- Das arithmetische Mittel ist nur für metrisch skalierte Daten definiert!
- Ist eine Maßzahl die empfindlich gegenüber Ausreißern ist.
- Das gewichtete arithmetische Mittel erlaubt die Bestimmung des arithmetischen Mittels für klassierte Daten.
- **R-Funktion:** `mean()`

Beispiel: Median und arithmetisches Mittel für die roten Kugeln

	i = 1	i = 2	i = 3	i = 4	i = 5	i = 6	i = 7	i = 8
red	1.7471	3.3673	1.3287	6.1906	3.6590	1.3591	3.9749	4.4766
blue	9.7409	11.9352	7.0403	10.2196	11.4776	5.6971	9.2134	5.0044

Gewicht von 8 roten und 8 blauen Kugeln



Beispiel: Median und arithmetisches Mittel für die roten Kugeln

```
# Ausgabe der Daten
```

```
red
```

```
## [1] 1.747092 3.367287 1.328743 6.190562 3.659016 1.359063 3.974858 4.476649
```

```
# Arithmetisches Mittel
```

```
mean(red)
```

```
## [1] 3.262909
```

```
## Median
```

```
median(red)
```

```
## [1] 3.513151
```

```
# Zusammenfassung wesentlicher Lagemaße
```

```
summary(red)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      1.329   1.650   3.513   3.263   4.100   6.191
```

- Es gibt zahlreiche spezialisierte Mittelwerte, wie das **geometrische Mittel** \bar{x}_{geo} und das **harmonische Mittel** \bar{x}_{harm} . Welcher Mittelwert genutzt werden muss, hängt von den zugrundeliegenden Daten ab.
- Ziel der Mittelwertbildung ist, die durchschnittliche *Gesamtwirkung* von n meist unterschiedlichen Werten mit einem einzigen Wert zu beschreiben.

Geometrisches Mittel: $\bar{x}_{geo} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}$

Harmonisches Mittel: $\bar{x}_{harm} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$

- **Anwendung:** Geometrische Mittelwerte eignen sich für Wachstumsraten, harmonische Mittelwerte für Geschwindigkeiten.

Beispiel: Geometrisches Mittel

```
# Das Wertpapier-Beispiel (Bitcoin) aus der Einführung liefert die folgenden  
# Wertveränderungen (returns) für ersten 3 Jahre des Assets.  
ret <- c(.12, .07, .01)
```

```
# Geometrisches Mittel  
mean_gm <- prod(1 + ret)^(1/length(ret))  
mean_gm
```

```
## [1] 1.065715
```




```
# Probe  
(100 * prod(1 + ret)) # Wert nach 3 Perioden bei 100 Euro Startwert
```

```
## [1] 121.0384
```




```
(100 * mean_gm^3) # Wert nach 3 Perioden berechnet mit x_{geom}
```

```
## [1] 121.0384
```

- Wo liegen \bar{x} , \bar{x}_{Median} und \bar{x}_{Modus} bei den nachfolgend gezeigten Häufigkeitsverteilungen?



- Wo liegen \bar{x} , \bar{x}_{Median} und \bar{x}_{Modus} bei den nachfolgend gezeigten Häufigkeitsverteilungen?




- Linksschiefe Häufigkeitsverteilung: $\bar{x} < \bar{x}_{Median} < \bar{x}_{Modus}$
- Symmetrische Häufigkeitsverteilung: $\bar{x} = \bar{x}_{Median} = \bar{x}_{Modus}$
- Rechtsschiefe Häufigkeitsverteilung: $\bar{x} > \bar{x}_{Median} > \bar{x}_{Modus}$

1 Lagemaße

2 Streuungsmaße

3 Konzentrationsmaße

Häufigkeitsverteilungen



Lagemaß	Symbol	Berechnung
Spannweite	R	$x_{max} - x_{min}$
Interquartilsabstand	IQR	$Q_{0.75} - Q_{0.25}$
(empirische) Varianz	s^2	$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
Standardabweichung	s	$\sqrt{s^2}$
Variationskoeffizient	V	s/\bar{x}

Achtung: Nicht jede Maßzahl ist für jede Art der *Skalierung* und damit nicht für jede Variable (sinnvoll) bestimmbar.

Definition: Spannweite

Die Breite eines Streubereichs nennt man Spannweite R . Sie ergibt sich aus dem Maximum und Minimum der Daten.

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

- Nachteil: Nur zwei *extreme* Werte gehen in die Berechnung ein, der Großteil der Daten bleibt ungenutzt.
- Die Spannweite hat keine eigene **R-Funktion**, kann aber einfach mittels `max()` und `min()` berechnet werden.

Definition: Interquartilsabstand

Der **Quartilsabstand** gibt die Größe des Bereiches zwischen dem oberen und dem unteren Quartil einer Verteilung an, in dem die mittleren 50% der Beobachtungen fallen.

$$IQR = Q_{0.75} - Q_{0.25}$$

- Zwischen dem oberen und dem unteren Quartil liegen 50% der Beobachtungen.
- Kann auch sinnvoll für ordinalskalierte Merkmale bestimmt werden.
- Ist *robust* in dem Sinne, dass die *IQR* weitgehend unempfindlich gegenüber Ausreißern ist.
- **R-Funktion:** `IQR()`

Definition: Varianz

Der **Varianz** ist die mittlere quadrierte Abweichung vom arithmetischen Mittel

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{oder} \quad s^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

- Es gilt immer $s^2 \geq 0$
- Wird unterschiedlich für die Stichprobe und für die Grundgesamtheit (Population) berechnet.
- Grundidee: Einbezug aller Abweichungen vom Mittelwert
- Beobachtungen die weit von \bar{x} entfernt liegen werden überproportional stark gewichtet.
- **R-Funktion:** `var()`

Definition: Standardabweichung

Die **Standardabweichung** ist die Wurzel aus der Varianz.

$$s = \sqrt{s^2}$$

- Weißt die gleiche Maßeinheit wie die Daten auf
- Ist i.d.R. einfacher zu interpretieren als die Varianz.
- **R-Funktion:** `sd()`

Berechnung der Varianz der roten Kugeln aus dem Eingangsbeispiel.

i	x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	1.7471	-1.5158	2.2977
2	3.3673	0.1044	0.0109
3	1.3287	-1.9342	3.7410
4	6.1906	2.9277	8.5712
5	3.6590	0.3961	0.1569
6	1.3591	-1.9038	3.6246
7	3.9749	0.7119	0.5069
8	4.4766	1.2137	1.4732

$$n = 8 \quad \bar{x} = 3.2629 \quad \sum(x_i - \bar{x}) = 0 \quad \sum(x_i - \bar{x})^2 = 20.3823 \quad s^2 = 2.9118$$

Berechnung der Varianz der blauen Kugeln aus dem Eingangsbeispiel.

i	x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	9.7409	0.9499	0.9022
2	11.9352	3.1442	9.8858
3	7.0403	-1.7508	3.0653
4	10.2196	1.4285	2.0406
5	11.4776	2.6866	7.2176
6	5.6971	-3.0939	9.5725
7	9.2134	0.4223	0.1783
8	5.0044	-3.7866	14.3386

$$n = 8 \quad \bar{x} = 8.7911 \quad \sum (x_i - \bar{x}) = 0 \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 47.201 \quad s^2 = 6.743$$

Definition: Variationskoeffizient

Der **Variationskoeffizient** ist der Quotient aus Standardabweichung und arithmetischem Mittel.

$$V = \frac{s}{\bar{x}}$$

- Ist dimensionslos und vergleichbar
- Der Variationskoeffizient hat keine eigene **R-Funktion**, kann aber einfach mittels `sd()` und `mean()` berechnet werden.

Beispiel: Streuungsmaße

```
# Ausgabe der Daten
```

```
blue
```

```
## [1]  9.740948 11.935249  7.040281 10.219562 11.477642  5.697140  9.213390
```

```
## [8]  5.004441
```

```
# Spannweite
```

```
max(blue) - min(blue)
```

```
## [1] 6.930808
```

```
## Varianz
```

```
var(blue)
```

```
## [1] 6.742995
```

```
# Interquartilsabstand
```

```
IQR(blue)
```

```
## [1] 3.829586
```

```
# Variationskoeffizient
```

```
sd(blue) / mean(blue)
```

1 Lagemaße

2 Streuungsmaße

3 Konzentrationsmaße

Definition: Konzentration

Man spricht von Konzentration oder Ungleichheit, falls zu einem bestimmten Zeitpunkt ein relativ kleiner Anteil der Merkmalsträger einen hohen Anteil an der Summe der Merkmalswerte besitzt.

- Konzentration bzw. Ungleichheitsdiskussionen findet man häufig im Kontext von Einkommen oder Vermögen.
- Beispiele: In Deutschland besitzen 10% der Bevölkerung des Vermögens.

Definition: Lorenzkurve

Der Polygonzug durch die Punkte $P_0 = (0, 0)$ und $P_j = (k_j, l_j)$ mit $j = 1, \dots, q$ heißt **Lorenzkurve**.

$$k_j = \sum_{i=1}^j \frac{H_j}{n} = \sum_{i=1}^j h_j \quad l_j = \frac{\sum_{i=1}^j a_i H_i}{\sum_{i=1}^q a_i H_i}$$

- Die Lorenzkurve verläuft durch die Punkte $(0, 0)$ und $(1, 1)$
- Die Lorenzkurve verläuft immer **unterhalb** der Winkelhalbierenden.
- Die Lorenzkurve ist winkelhalbierend, wenn alle Merkmalsausprägungen gleich häufig vorkommen. Dann liegt keine Konzentration vor. Je weiter die Lorenzkurve sich von der Winkelhalbierenden entfernt, desto größer ist die Ungleichheit.
- **R-Funktion:** `Lc()` aus dem Zusatzpaket `ineq`

Wir betrachten vereinfachend die Einkommensverteilungen der folgenden drei sehr kleinen Länder.

```
A <- c(1000, 3000, 4000, 4000, 8000)
B <- c(2000, 2000, 4000, 8000)
C <- c(1000, 2000, 5000, 8000)
```


j	a_j	k_j	l_j
0		0	0
1	1000	0.2	0.05
2	3000	0.4	0.2
3	4000	0.8	0.6
4	8000	1	1

Definition: Gini Koeffizient

Das Doppelte der Fläche zwischen der Lorenzkurve und der Winkelhalbierenden heißt **Gini-Koeffizient** G und wird als Konzentrationsmaß einer Häufigkeitsverteilung verwendet.

$$G = \sum_{i=1}^n (k_i + k_{i-1})(l_i - l_{i-1}) - 1$$

- Um den Gini-Koeffizienten zu berechnen sind alle Stützpunkte der Lorenzkurve erforderlich. Es gilt $0 \leq G \leq \frac{n-1}{n} < 1$.
- Wenn die Lorenzkurve winkelhalbierend ist, gilt $G = 0$. In diesem Fall gibt es keine Einkommensunterschiede.
- Werden *alle* Ausgangswerte x_i mit einem Faktor a multipliziert, sodass $y_i = a \cdot x_i$, dann gilt $G_y = G_x$.
- **R-Funktion:** `Gini()` aus dem Zusatzpaket `ineq`



- Welche Lage- und Streuungsparameter eignen sich für ordinalskalierte Merkmale? Welche sind für nominalskalierte Merkmale geeignet?
- Welche Streuungsmaße berücksichtigen nur einzelne Beobachtungswerte der Häufigkeitsverteilung?
- Wie macht sich eine vollkommene Gleichheit in der Einkommensverteilung eines Landes in der Lorenzkurve bemerkbar? Wie groß ist dann der GINI-Koeffizient?

- Welche Lage- und Streuungsparameter eignen sich für ordinalskalierte Merkmale? Welche sind für nominalskalierte Merkmale geeignet?
 - **Ordinal:** Median, Quantile, Modus, Quartilsabstände.
 - **Nominal:** Modus.
- Welche Streuungsmaße berücksichtigen nur einzelne Beobachtungswerte der Häufigkeitsverteilung?
 - **Einzelne Beobachtungswerte:** Spannweite
 - **Alle Beobachtungswerte:** alle weiteren die vorgestellt wurden.
- Wie macht sich eine vollkommene Gleichheit in der Einkommensverteilung eines Landes in der Lorenzkurve bemerkbar? Wie groß ist dann der GINI-Koeffizient?
 - Winkelhalbierende, $G = 0$