Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

# Statistik

CH.5 - Kombinatorik

2026 || Prof. Dr. Buchwitz, Sommer, Henke

Wir geben Impulse

# Kombinatorik

Die Kombinatorik ist das Teilgebiet der Mathematik, das sich mit dem Zählen von **Zusammenstellungen** von Elementen aus einer vorgegebenen endlichen Menge beschäftigt.

- In diesem Kapitel werden wir folgende Fragen beantworten, um sie dann im nächsten Kapitel als Hilfsmittel zur **Berechnung von Wahrscheinlichkeiten** einzusetzen:
  - Wie viele Möglichkeiten gibt es $n$ Elemente anzuordnen?
  - Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus $n$ Elementen $k$ auszuwählen?

# Fakultäten

**Definition: Fakultät**

$n!$ bezeichnet das Produkt der ersten $n$ natürlichen Zahlen. Es gilt $0! = 1$.

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$$

- Fakultäten wachsen mit steigendem $n$ sehr schnell stark an.
- Beispiel: $3! = 6$ und $6! = 720$
- **R-Funktion:** `factorial()`

# Fakultäten


Wachstum der Fakultäten
362880
300000
200000
100000
40320
1000
2
4
6
8
Fakultät

# Binomialkoeffizient

## Definition: Binomialkoeffizient

Der Binomialkoeffizient ist für $n > 0$, $k \geq 0$ und $n \geq k$ definiert als

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n+1-k)}{k!}$$

- Der Binomialkoeffizient gibt an, auf wie viele verschiedene Arten man $k$ Elemente aus einer begrenzten Menge von $n$ Elementen auswählen kann.
- Der Binomialkoeffizient ist symmetrisch, es gilt $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- **R-Funktion:** `choose()`

# Binomialkoeffizient

**Formel:**

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

**Rechenregeln:**

a) $\binom{n}{1} = n \quad \text{für} \quad n \geq 0$

b) $\binom{n}{n} = 1$

c) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \text{für} \quad k \leq n$

d) $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

e) $\binom{n}{0} = 1 \quad \text{für} \quad n \geq 0$

f) $\binom{n}{k} = 0 \quad \text{für} \quad k > n$

**Aufgabe:** a) $\binom{8}{3}$ b) $\binom{10}{5}$ c) $\binom{12}{8}$

# Permutationen

**Definition: Permutation**

Jede Zusammenstellung aus einer Menge mit $n$ Elementen, die dadurch entsteht, dass man die gegebenen Elemente in **beliebiger** Reihenfolge aufreiht, heißt eine *Permutation* dieser Elemente.

- Sind alle $n$ Elemente verschieden, so ergibt sich die Anzahl der Permutationen $P_n = n!$
- Lassen sich die $n$ Elemente in $k$ Klassen einteilen, wird die Anzahl der Permutationen wie folgt berechnet $P_n^{n_1,n_2,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1!n_2!\ \ldots\ n_k!}$
- **R-Funktion:** `permutations()` aus dem Zusatzpaket `gtools`

# Permutationen

**Beispiel 1:** Wie viele Möglichkeiten gibt es, drei verschiedenfarbige Kugeln anzuordnen?

**Beispiel 2:** Wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei gelbe und eine rote Kugel anzuordnen?

# Permutationen

**Beispiel 1:** Wie viele Möglichkeiten gibt es, drei verschiedenfarbige Kugeln anzuordnen?

```
library(gtools)
balls <- c("red", "blue", "green")
p <- permutations(v=balls, n=3, r=3,
                  set=F, repeats = F)
p
```

```
##      [,1]    [,2]    [,3]
## [1,] "red"   "blue"  "green"
## [2,] "red"   "green" "blue"
## [3,] "blue"  "red"   "green"
## [4,] "blue"  "green" "red"
## [5,] "green" "red"   "blue"
## [6,] "green" "blue"  "red"
```

**Beispiel 2:** Wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei gelbe und eine rote Kugel anzuordnen?

```
library(gtools)
balls <- c("red", "yellow", "yellow")
p <- permutations(v=balls, n=3, r=3,
                  set=F, repeats = F)
unique(p)
```

```
##      [,1]     [,2]     [,3]
## [1,] "red"    "yellow" "yellow"
## [2,] "yellow" "red"    "yellow"
## [3,] "yellow" "yellow" "red"
```

# Kombinationen

## Definition: Kombination

Jede Zusammenstellung aus $k$ Elementen einer Menge mit $n$ Elementen mit $k < n$ heißt Kombination k-ter Ordnung aus den $n$ Elementen.

**Kombinationen können wie folgt unterschieden werden:**

- **Reihenfolge:** Gelten zwei Kombinationen mit genau denselben $k$ Elementen, aber in verschiedener Reihenfolge als verschiedenen, so spricht man von *Variationen* (Kombinationen mit Berücksichtigung der Reihenfolge).
- **Wiederholung:** Dürfen die $k$ Elemente nur einmal vorkommen (keine Mehrfachauswahl des gleichen Elements), so spricht man von *Kombinationen ohne Wiederholung* (ohne Zurücklegen).
- **R-Funktion:** `combinations()` aus dem Zusatzpaket `gtools` und `expand.grid()`

# Kombinationen

**Vier Möglichkeiten:** Wählen von 2 aus 3 verschiedenartigen Kugeln mit/ohne Wiederholung und mit/ohne Berücksichtigung der Reihenfolge.

# Kombinationen

```r
balls <- c("red", "blue", "green")

# Mit Wiederholung
## und mit Reihenfolge
mwmr <- expand.grid(balls,balls)
nrow(mwmr)
```

```
## [1] 9
```

```r
balls <- c("red", "blue", "green")

# Ohne Wiederholung
## und mit Reihenfolge
owmr <- mwmr[mwmr$Var1 != mwmr$Var2, ]
nrow(owmr)
```

```
## [1] 6
```

```r
## und ohne Reihenfolge
mwor <- combinations(v=balls, n=3, r=2,
                     repeats = T)
nrow(mwor)
```

```
## [1] 6
```

```r
## und ohne Reihenfolge
owor <- combinations(v=balls, n=3, r=2,
                     repeats = F)
nrow(owor)
```

```
## [1] 3
```

# Zusammenfassung

| | Permutationen | Kombinationen | |
|---|---|---|---|
| | Reihenfolge berücksichtigt | | ohne Reihenfolge |
| ohne Wiederholung | $P_n = n!$ | $V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ | $C_n^k = \binom{n}{k}$ |
| mit Wiederholung | $P_n^{n_1,n_2,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1!n_2!\ \ldots\ n_k!}$ | $V_{w,n}^k = n^k$ | $C_{w,n}^k = \binom{n+k-1}{k}$ |

# Verständnisfragen

- Wieso wird bei Permutationen hinsichtlich der Reihenfolge unterschieden?
- Wann wird eine Kombination Variation genannt?
- Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Lotto?