10^8

$n = 204$

$N = 500$

$\delta \in \{5.0, 6.0, 7.0, 8.0\}$

$\delta\delta = 7.0 n = 204 \delta = 6.0$

$n = 50$

1.4 ± 0.6
4.5 ± 3.1
30.1 ± 10.7
42.5 ± 7.3

$n = 50$

$(t) t g(t) = (t)/(t-1)$

$$g(t) = \frac{(t)}{(t-1)} = \begin{cases} 3.05 t = 1 \\ 1.68 t = 2 \\ 1.69 t = 3 \\ 1.43 t = 4 \\ \\ 1.02 t = 13 \end{cases}$$

$3\times$

$= 46.246.9$

$g(t)\varepsilon\tau$

$$(\tau,\varepsilon) = (\tau) \cdot \prod_{t=\tau}^{T-1} \left[1 + \big(g(t) - 1\big)(1-\varepsilon)\right]$$

$T = 14_0 = (T) = 46.9$

$$\Delta I(\tau,\varepsilon) = N \cdot [_0 - (\tau,\varepsilon)]$$

$N = 500$

$N = 500$

$\boldsymbol{\varepsilon = 0.3} \quad \boldsymbol{\varepsilon = 0.5} \quad \boldsymbol{\varepsilon = 0.7} \quad \boldsymbol{\varepsilon = 0.9}$

$_0 = 46.9$

$\varepsilon = 0.5$

$\times N = 500$

	Δ
$\delta = 5.0$	0.0
$\delta = 6.0$	$+0.2$
$\delta = 7.0$	$+1.2$
$\delta = 8.0$	-0.1

$\delta = 7.0$

$$= C \cdot p \cdot \Delta I(\tau, \varepsilon) \cdot \frac{N}{N} \cdot c$$

$$= \frac{-}{} \times 100$$

$C = 200 p = 0.04 N/N = 3000/500 = 6 c = \$500$

$$C = 200 \varepsilon = 0.5$$

$\varepsilon = 0.5$		
$\varepsilon = 0.7$		
$\varepsilon = 0.5$	$-$	-3
$\varepsilon = 0.5$		
$\varepsilon = 0.7$		

$\varepsilon \approx 0.08$
$\varepsilon \varepsilon = 0$

$C_q p_d p_w M V$

$$() = -C_q = -\$375$$
$$() = -p_d \cdot C_q - p_w \cdot M = -0.30 \times \$375 - 0.05 \times \$5{,}000 = -\$362$$

$() > ()$

$$() = -C_q + V = -\$375 + \$1{,}500 = +\$1{,}125$$
$$() = -p_d \cdot C_q - p_w \cdot M - (1 - p_d) \cdot V = -\$1{,}262$$

$\approx$

$$() = -C_q + C + V = -\$375 + \$500 + \$1{,}500 = +\$1{,}625$$

$$\times\times$$

$P \alpha k$

$$P(\alpha, k) = 1 - (1 - \alpha)^k$$

$k = 3$

$$k = 3 \varepsilon = 0.5$$

$$\boldsymbol{P} \quad \Delta I$$

$$\sim$$
$$\sim$$
$$\sim$$

$>$
