

q -Metric	Data	Stat	Formula (Eq. #)
max-min normalized L_1 (Eq. 55)	$\mathcal{N}(0, 1)$	mean	$\frac{p}{\sqrt{\pi}\mu_{\max}^{(1)}(m)} \quad (98)$ <p>where $\mu_{\max}^{(1)}(m) = \frac{\log(\log(2))}{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{m}\right)} - \Phi^{-1}\left(\frac{1}{m}\right)$</p>
		variance	$\frac{12p(\pi-2)\log(m)}{\pi\left(\pi^2+24\left[\mu_{\max}^{(1)}(m)\right]^2\log(m)\right)} \quad (99)$ <p>where $\mu_{\max}^{(1)}(m) = \frac{\log(\log(2))}{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{m}\right)} - \Phi^{-1}\left(\frac{1}{m}\right)$</p>
	$\mathcal{U}(0, 1)$	mean	$\frac{(m+1)p}{3(m-1)} \quad (100)$
		variance	$\frac{(m+2)(m+1)^2p}{18(m^3-m+2)} \quad (100)$
	$\mathcal{N}(0, 1)$	mean	$\frac{\sqrt{2p-1}}{2\mu_{\max}^{(1)}(m)} \quad (102)$ <p>where $\mu_{\max}^{(1)}(m) = \frac{\log(\log(2))}{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{m}\right)} - \Phi^{-1}\left(\frac{1}{m}\right)$</p>
		variance	$\frac{6\log(m)}{\pi^2+24\left[\mu_{\max}^{(1)}(m)\right]^2\log(m)} \quad (103)$ <p>where $\mu_{\max}^{(1)}(m) = \frac{\log(\log(2))}{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{m}\right)} - \Phi^{-1}\left(\frac{1}{m}\right)$</p>
max-min normalized L_2 (Eq. 55)	$\mathcal{U}(0, 1)$	mean	$\sqrt{\frac{p}{6} - \frac{7}{120} \left(\frac{m+1}{m-1}\right)} \quad (104)$
		variance	$\frac{7(m+2)(m+1)^2}{120(m^3-m+2)} \quad (105)$