## Домашнее задание 6

Дедлайн: 2024-11-01, 21:00.

1. Распределение вектора (X,Y) задано таблицей

	Y = 1	Y = 2	Y = 3
X = 0	0.2	0.2	0.1
X = 1	0.5	0	0

- а) Найдите энтропии  $\mathbb{H}(X)$ ,  $\mathbb{H}(Y)$ ,  $\mathbb{H}(X,Y)$ .
- б) Найдите  $\mathbb{H}(Y \mid X)$ .
- в) Какое максимальное значение может принимать условная энтропия  $\mathbb{H}(Y\mid X)$ , если X принимает два значения, а Y три?
- 2. Для дискретных величин X и Y докажите или опровергните утверждения:
  - a)  $\mathbb{H}(X) + \mathbb{H}(Y \mid X) = \mathbb{H}(X, Y);$
  - б)  $\mathbb{H}(X,Y) \geq \mathbb{H}(X)$ ;
  - B)  $\mathbb{H}(X^2) = \mathbb{H}(X);$
- 3. Время до прихода автобуса на остановку неотрицательная случайная величина X с функцией плотности. Андрей верит, что функция плотности X имеет вид

$$a(x) = egin{cases} lpha \exp(-lpha x), \ \mathrm{ec}$$
ли  $x \geq 0$   $0, \ \mathrm{uhave}. \end{cases}$ 

Борис верит, что функция плотности X имеет вид

$$b(x) = \begin{cases} \beta \exp(-\beta x), \text{ если } x \ge 0 \\ 0, \text{ иначе.} \end{cases}$$

Вова верит, что у X есть какая-то функция плотности c(x), а математическое ожидание такое, как думает Андрей.

- а) Найдите математическое ожидание с точки зрения Андрея и Вовы,  $\mathbb{E}_a(X)$ .
- б) Найдите энтропию  $\mathbb{H}(a)$ .
- в) Найдите кросс-энтропию  $\mathrm{CE}(b||a)$ . При каком lpha она минимальна?
- r) Найдите кросс-энтропию  $\mathrm{CE}(c||a).$
- д) Чему равно максимальное значение энтропии  $\mathbb{H}(c)$  и при какой функции плотности c(x) достигается максимум?