

# Заметки к семинарам по методам оптимальных решений

<https://github.com/bdemeshev/optimal-solution-pro>

зеркало: <https://gitlab.com/bdemeshev/optimal-solution-pro>

11 июня 2024 г.



皮卡丘

# Содержание

|   |                                 |    |
|---|---------------------------------|----|
| 1 | Картинки на плоскости           | 3  |
| 2 | Оптимизация на плоскости        | 4  |
| 3 | Симплекс-метод                  | 4  |
| 4 | Двойственность                  | 10 |
| 5 | Транспортная задача             | 12 |
| 6 | Сети                            | 14 |
| 7 | Неравенство Коши — Буняковского | 19 |
| 8 | Решения                         | 20 |
|   | Хэштэги                         | 30 |
|   | Источники мудрости              | 30 |

При везении подсказку, ответ или решение можно найти, кликнув по номеру задачи.  
Подробная книжка Фергюсона, [Fer]. Слайды к оксфордскому курсу, [Law].  
Обсуждение интуиции за двойственными задачами, [lit].  
Слайды по алгоритмам Кляйнберга и Тардос, [KT].

## 1. Картинки на плоскости

Линейная оболочка (linear span):

$$\text{Span}(v_1, v_2, v_3) = \{x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 \mid x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \in \mathbb{R}, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

Конус (cone):

$$\text{Cone}(v_1, v_2, v_3) = \{x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$$

Выпуклая линейная оболочка (convex linear hull):

$$\text{Hull}(v_1, v_2, v_3) = \text{Convex}(v_1, v_2, v_3) = \left\{x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, \sum x_i = 1\right\}$$

**1.1** Рассмотрим точки на плоскости,  $A = (0, 0)$ ,  $B = (5, 3)$  и  $C = (5, -3)$ .

- а) Нарисуйте точки  $0.5B + 0.5C$ ,  $0.9A + 0.1B$ ,  $3B - 2C$ .
- б) Нарисуйте точки  $\frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C$ ,  $0.1A + 0.45B + 0.45C$ ,  $0.9A + 0.05B + 0.05C$ .

**1.2** Рассмотрим точки на плоскости,  $A = (1, 2)$ ,  $B = (3, 4)$  и  $C = (5, 1)$ .

- а) Нарисуйте  $\text{Convex}(A, B)$ ,  $\text{Convex}(A, B, C)$ .
- б) Нарисуйте  $\text{Cone}(A)$ ,  $\text{Cone}(A, B)$ ,  $\text{Cone}(A, B, C)$ .
- в) Нарисуйте  $\text{Span}(A)$ ,  $\text{Span}(A, B)$ .
- г) Нарисуйте  $A + \text{Span}(B)$ ,  $\text{Cone}(A) + \text{Cone}(B)$ .
- д) Нарисуйте  $\text{Convex}(A, B) + \text{Cone}(C)$ ,  $\text{Convex}(A) + \text{Cone}(B, C)$ ,  $\text{Convex}(A, C) + \text{Cone}(B, C)$ .

**1.3** Рассмотрим точки на плоскости  $A = (1, 2)$ ,  $B = (5, 2)$ ,  $C = (1, 4)$ ,  $D = (5, 4)$ .

- а) Запишите  $E = (1, 3)$  как выпуклую линейную комбинацию точек  $A$ ,  $B$ ,  $C$  и  $D$ .
- б) Запишите  $F = (3, 3)$  как выпуклую линейную комбинацию точек  $A$ ,  $B$ ,  $C$  и  $D$  всеми возможными способами.
- в) Можно ли записать  $G = (6, 3)$  как выпуклую линейную комбинацию точек  $A$ ,  $B$ ,  $C$  и  $D$ ?
- г) Сколькими способами можно записать  $H = (4, 3)$  как выпуклую линейную комбинацию  $A$ ,  $B$ ,  $C$  и  $D$ ?
- д) Сколькими способами можно записать  $I = (4, 3)$  как выпуклую линейную комбинацию  $A$ ,  $B$  и  $D$ ?
- е) Сколькими способами можно записать  $J = (4, 2)$  как выпуклую линейную комбинацию  $A$ ,  $B$ ,  $C$  и  $D$ ?
- ж) Сколькими способами можно записать  $K = (4, 2)$  как выпуклую линейную комбинацию  $A$ ,  $C$  и  $D$ ?

**1.4** а) Нарисуйте семейство прямых  $ax_1 + 5x_2 = 10$  на плоскости  $(x_1, x_2)$ .  
б) Нарисуйте семейство прямых  $2x_1 + x_2 = d$  на плоскости  $(x_1, x_2)$ .

## 2. Оптимизация на плоскости

- допустимое множество, feasible set, 可行集, kěxíng jí;
- допустимая область, feasible region, 可行域, kěxíng yù;
- линейное программирование, linear programming, 线性规划, xiànxíng guīhuà;
- целевая функция, objective function, 目标函数, mùbiāo hánshù;

### 2.1

#### 2.1. Оптимизация на плоскости с параметром

2.2 Решите задачу линейного программирования при всех значениях  $c$ :

$$\begin{cases} cx_1 + x_2 \rightarrow \max \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

2.3 Решите задачу линейного программирования при всех значениях  $a$ :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \rightarrow \max \\ 2x_1 + ax_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

## 3. Симплекс-метод

Решение  $x$  системы  $Ax = b$  называется *допустимым*, если все  $x_i \geq 0$ .

Решение  $x$  системы  $Ax = b$  называется *базисным*, если столбцы  $\text{col}_i A$  при  $x_i \neq 0$  линейно независимы.

- базисное допустимое решение, basic feasible solution, 基本可行解, jīběn kěxíng jiě;

## Терминология

3.1 Рассмотрим систему уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 - x_2 + x_4 = 9 \end{cases}$$

Есть несколько векторов,  $x_a = (0, 0, 0, 0)$ ,  $x_b = (0, 0, 8, 9)$ ,  $x_c = (1, 0, 6, 8)$ ,  $x_d = (1, -9, 33, -1)$ ,  $x_e = (0, -9, 35, 0)$ .

- Какие векторы являются решениями системы?
- Какие векторы являются базисными решениями системы?

в) Какие векторы являются допустимыми решениями при условии, что все  $x_i \geq 0$ ?

### 3.2 Рассмотрим систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 10 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 11 \end{cases}$$

Есть несколько векторов,  $x_a = (1, 2, 3, 4)$ ,  $x_b = (0, 0, 10, 11)$ ,  $x_c = (1, 0, 9, 9)$ ,  $x_d = (6, -1, 7, 0)$ ,  $x_e = (0, 11, -23, 0)$ .

- а) Какие векторы являются решениями системы?
- б) Какие векторы являются базисными решениями системы?
- в) Какие векторы являются допустимыми решениями при условии, что все  $x_i \geq 0$ ?

### 3.3 Рассмотрим систему ограничений в канонической форме:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 - 6x_2 + x_4 = 15 \\ -x_1 + 2x_2 + x_5 = 11 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Найдите хотя бы одно базисное допустимое решение системы.
- б) Найдите все базисные допустимые решения системы.

### 3.4 Рассмотрим систему ограничений в канонической форме:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 - x_3 = 8 \\ x_1 - 6x_2 + x_4 = 15 \\ -x_1 + 2x_2 + x_5 = 11 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Найдите хотя бы одно базисное допустимое решение системы.
- б) Найдите все базисные допустимые решения системы.

## Приятная стартовая точка

### 3.5 Рассмотрим задачу линейного программирования:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \rightarrow \max \\ x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Приведите задачу к канонической форме.
- б) Выпишите стартовую симплекс-таблицу.
- в) Укажите допустимое базисное решение для стартовой симплекс-таблицы.
- г) Найдите хотя бы одно решение задачи симплекс-методом.

3.6 Рассмотрим задачу линейного программирования:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \max \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Приведите задачу к канонической форме.
- б) Выпишите стартовую симплекс-таблицу.
- в) Укажите допустимое базисное решение для стартовой симплекс-таблицы.
- г) Найдите хотя бы одно решение задачи симплекс-методом.

3.7 Рассмотрим задачу линейного программирования:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 \rightarrow \min \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Приведите задачу к канонической форме.
- б) Выпишите стартовую симплекс-таблицу.
- в) Укажите допустимое базисное решение для стартовой симплекс-таблицы.
- г) Найдите хотя бы одно решение задачи симплекс-методом.

3.8 Рассмотрим задачу линейного программирования:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \max \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 10 \\ x_1 - x_2 + x_3 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Приведите задачу к канонической форме.
- б) Выпишите стартовую симплекс-таблицу.
- в) Укажите допустимое базисное решение для стартовой симплекс-таблицы.
- г) Найдите хотя бы одно решение задачи симплекс-методом.

3.9 Рассмотрим задачу линейного программирования:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \min \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_1 + x_2 - x_3 \leq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Приведите задачу к канонической форме.
- б) Выпишите стартовую симплекс-таблицу.
- в) Укажите допустимое базисное решение для стартовой симплекс-таблицы.

г) Найдите хотя бы одно решение задачи симплекс-методом.

|      | $x_1$    | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$     |
|------|----------|-------|-------|-------|---------|
| 3.10 | $x_1$    | 1     | 0     | 1     | 5       |
|      | $x_2$    | 0     | 1     | 2     | 6       |
|      | $\min z$ | 0     | 0     | 3     | $-3$    |
|      |          |       |       |       | $8 - z$ |

а) Найдите хотя бы одно допустимое решение.

б) Найдите все допустимые решения.

в) Найдите все базисные допустимые решения.

г) Запишите все допустимые решения в виде выпуклой линейной оболочки.

д) Найдите оптимальное решение.

## Особые случаи

### Пустое допустимое множество

3.11 Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \rightarrow \max \\ x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

а) Решите задачу графически.

б) Решите задачу симплекс-методом.

### Неограниченная задача

3.12 Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \rightarrow \max \\ x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1 \geq x_2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

а) Решите задачу графически.

б) Решите задачу симплекс-методом.

### Неединственное решение

3.13 Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \rightarrow \max \\ x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 \geq x_2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Решите задачу графически.
- б) Приведите задачу к каноническому виду.
- в) Найдите хотя бы одно решение задачи симплекс-методом.
- г) Выпишите все решения задачи симплекс-методом.
- д) Выпишите все базисные допустимые решения задачи.
- е) Запишите ответ в виде выпуклой линейной оболочки.

**3.14** Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \rightarrow \min \\ x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1 \geq x_2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Решите задачу графически.
- б) Приведите задачу к каноническому виду.
- в) Найдите хотя бы одно оптимальное решение задачи симплекс-методом.
- г) Выпишите все решения задачи симплекс-методом в параметрическом виде.
- д) Выпишите все базисные оптимальные решения задачи.
- е) Запишите оптимальные решения в виде суммы выпуклой линейной оболочки и конуса.

**3.15** Рассмотрим симплекс-табличку

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$      |
|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| $x_1$    | 1     | 0     | -1    | 3     | 5        |
| $x_2$    | 0     | 1     | -2    | 7     | 6        |
| $\min z$ | 0     | 0     | 0     | -3    | $12 - z$ |

- а) Найдите хотя бы одно оптимальное решение.
- б) Выпишите все решения в параметрическом виде.
- в) Выпишите все базисные оптимальные решения задачи.
- г) Выпишите все решения, используя выпуклую линейную оболочку и конус.

**3.16** Рассмотрим симплекс-табличку

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$      |
|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| $x_1$    | 1     | 0     | -1    | 3     | 5        |
| $x_2$    | 0     | 1     | 3     | 7     | 6        |
| $\max z$ | 0     | 0     | 0     | -3    | $16 + z$ |

- а) Найдите хотя бы одно оптимальное решение.
- б) Выпишите все решения в параметрическом виде.
- в) Выпишите все базисные оптимальные решения задачи.



г) Выпишите все решения, используя выпуклую линейную оболочку и конус.

**3.17** Рассмотрим симплекс-таблицку

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$      |
|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| $x_1$    | 1     | 0     | -1    | -2    | 5        |
| $x_2$    | 0     | 1     | 3     | -1    | 6        |
| $\min z$ | 0     | 0     | 0     | 0     | $20 - z$ |

- а) Найдите хотя бы одно оптимальное решение.
- б) Выпишите все решения в параметрическом виде.
- в) Выпишите все базисные оптимальные решения задачи.
- г) Выпишите все решения, используя выпуклую линейную оболочку и конус.

**3.18** Рассмотрим симплекс-таблицку

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$     |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $x_1$    | 1     | 0     | 2     | -3    | 2       |
| $x_2$    | 0     | 1     | 1     | 0     | 6       |
| $\min z$ | 0     | 0     | 0     | -2    | $5 - z$ |

- а) Найдите хотя бы одно допустимое решение.
- б) Найдите все допустимые решения.
- в) Найдите базисные допустимые решения.
- г) Найдите хотя бы одно оптимальное решение.
- д) Найдите все оптимальные решения.
- е) Найдите базисные оптимальные решения.

**3.19** Рассмотрим задачу

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 \rightarrow \max \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Найдите хотя бы одно допустимое решение.
- б) Найдите все допустимые решения.
- в) Найдите базисные допустимые решения.
- г) Найдите хотя бы одно оптимальное решение.
- д) Найдите все оптимальные решения.
- е) Найдите базисные оптимальные решения.

## Поиск стартовой точки

**3.20** Рассмотрим задачу линейного программирования:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_3 \rightarrow \max \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 30 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

- а) Приведите задачу к канонической форме.
- б) Выпишите стартовую симплекс-таблицу с искусственными переменными.
- в) Найдите хотя бы одно решение задачи симплекс-методом.

## 4. Двойственность

- двойственная задача, dual problem, 对偶问题, duì'ǒu wèntí;
- двойственность, duality, 对偶, duì'ǒu;
- условия дополняющей нежёсткости, complementary slackness condition, 互补松弛条件, hùbǔ sōngchí tiáojiàn;

Двойственные задачи в стандартной форме:

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| $z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \rightarrow \min$ | $\leftrightarrow$ | $u = b_1y_1 + b_2y_2 \rightarrow \max$ |
| $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \geq b_1$    | $\leftrightarrow$ | $y_1 \geq 0$                           |
| $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \geq b_2$    | $\leftrightarrow$ | $y_2 \geq 0$                           |
| $x_1 \geq 0$                                    | $\leftrightarrow$ | $a_{11}y_1 + a_{21}y_2 \leq c_1$       |
| $x_2 \geq 0$                                    | $\leftrightarrow$ | $a_{12}y_1 + a_{22}y_2 \leq c_2$       |
| $x_3 \geq 0$                                    | $\leftrightarrow$ | $a_{13}y_1 + a_{23}y_2 \leq c_3$       |

Двойственность между равенствами и переменными с произвольными значениями:

|   |                   |                               |
|---|-------------------|-------------------------------|
| $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$ | $\leftrightarrow$ | $y_1 \in \mathbb{R}$          |
| $x_2 \in \mathbb{R}$                      | $\leftrightarrow$ | $a_{12}y_1 + a_{22}y_2 = c_2$ |

Двойственные задачи в стандартной форме с векторами:

|                              |                   |                              |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| $z = c^T x \rightarrow \min$ | $\leftrightarrow$ | $u = b^T y \rightarrow \max$ |
| $Ax \geq b$                  | $\leftrightarrow$ | $y \geq 0$                   |
| $x \geq 0$                   | $\leftrightarrow$ | $A^T y \leq c$               |

Двойственность в оптимальной точке:

$$\begin{aligned} y_j^* \neq 0 &\Rightarrow a_{j1}x_1^* + a_{j2}x_2^* + a_{j3}x_3^* = b_j \\ a_{1i}y_1^* + a_{2i}y_2^* \neq c_i &\Rightarrow x_i^* = 0 \end{aligned}$$

**4.1** Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 \rightarrow \min \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 6 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 \geq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

- а) Выпишите двойственную задачу.
- б) Решите двойственную задачу.
- в) Найдите решение исходной задачи.

**4.2** Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 \rightarrow \max \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 6 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

- а) Выпишите двойственную задачу.
- б) Решите двойственную задачу.
- в) Найдите решение исходной задачи.

**4.3** Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 \rightarrow \min \\ x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 6 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 10 \\ x_1 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

- а) Выпишите двойственную задачу.
- б) Решите двойственную задачу.
- в) Найдите решение исходной задачи.

**4.4** Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 \rightarrow \min \\ x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 \geq 6 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 10 \\ x_1 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

- а) Выпишите двойственную задачу.

- б) Решите двойственную задачу.  
в) Найдите решение исходной задачи.

#### 4.5 Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 \rightarrow \min \\ x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 6 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 6x_4 = 10 \\ x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

- а) Выпишите двойственную задачу.  
б) Найдите допустимое множество двойственной задачи.  
в) Найдите допустимое множество исходной задачи.

## 5. Транспортная задача

- базисное допустимое решение, basic feasible solution, 基本可行解, jīběn kěxíng jiě;
- метод минимального элемента, least-cost rule, 最小元素法, zuìxiǎo yuánsù fǎ;
- метод северо-западного угла, northwest corner rule, 西北角法, xīběi jiǎo fǎ;
- транспортная задача, transportation problem, 运输问题, yùنشū wèntí;

Если в сбалансированной транспортной задаче  $m$  продавцов и  $n$  покупателей, то количество базисных переменных равно  $m+n-1$ . Базисные переменные должны соответствовать линейно независимым столбцам матрицы ограничений.

Метод потенциалов, Hitchhock method,



#### 5.1 Рассмотрим сбалансированную транспортную задачу

$$\begin{cases} \sum_{ij} c_{ij}x_{ij} \rightarrow \min \\ \sum_j x_{ij} = a_i \text{ для любого } i \\ \sum_i x_{ij} = b_j \text{ для любого } j \\ \text{все } x_{ij} \geq 0. \end{cases}$$

- а) Может ли измениться оптимальная точка, если каждый элемент матрицы  $C$  увеличить в 2 раза?

- б) Может ли измениться оптимальная точка, если один столбец матрицы  $C$  увеличить в 2 раза?
- в) Может ли измениться оптимальная точка, если одну строку матрицы  $C$  увеличить в 2 раза?
- г) Может ли измениться оптимальная точка, если к каждому элементу матрицы  $C$  прибавить 1?
- д) Может ли измениться оптимальная точка, если в одном столбце матрицы  $C$  к каждому элементу прибавить 1?
- е) Может ли измениться оптимальная точка, если в одной строке матрицы  $C$  к каждому элементу прибавить 1?

## 5.2 Рассмотрим сбалансированную транспортную задачу

$$\begin{cases} 8x_{11} + 5x_{12} + 4x_{13} + 6x_{21} + 7x_{22} + 3x_{23} \rightarrow \min \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} = 10 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 20 \\ x_{11} + x_{21} = 7 \\ x_{12} + x_{22} = 11 \\ x_{13} + x_{23} = 12 \\ \text{все } x_{ij} \geq 0. \end{cases}$$

- а) Запишите задачу в виде симплекс-таблицы.
- б) Какая линейная зависимость существует между уравнениями?
- в) Сколько должно быть базисных и сколько свободных переменных?
- г) Запишите задачу в виде транспортной таблицы.
- д) Найдите базисное допустимое решение методом северо-западного угла.
- е) Найдите базисное допустимое решение методом минимального элемента.
- ж) Запишите двойственную задачу.
- з) Запишите условия дополняющей нежёсткости.
- и) Найдите хотя бы одно оптимальное решение.

## 5.3 Рассмотрим сбалансированную транспортную задачу

$$\begin{cases} 10x_{11} + 8x_{12} + 9x_{13} + 5x_{21} + 2x_{22} + 3x_{23} + \\ + 6x_{31} + 7x_{32} + 4x_{33} + 7x_{41} + 6x_{42} + 8x_{43} \rightarrow \min \\ \sum_i x_{i1} = 25, \sum_i x_{i2} = 25, \sum_i x_{i3} = 50, \\ \sum_j x_{1j} = 15, \sum_j x_{2j} = 20, \sum_j x_{3j} = 30, \sum_j x_{4j} = 35, \\ \text{все } x_{ij} \geq 0. \end{cases}$$

- а) Запишите задачу в виде транспортной таблицы.
- б) Запишите двойственную задачу.
- в) Найдите базисное допустимое решение методом северо-западного угла.
- г) Найдите базисное допустимое решение методом минимального элемента.
- д) Найдите хотя бы одно оптимальное решение.

**5.4** Рассмотрим сбалансированную транспортную задачу, в которой 3 производителя и 7 потребителей.

- а) Сколько всего переменных в этой задаче?
- б) Сколько базисных и сколько свободных переменных в этой задаче?
- в) Сколько переменных в двойственной задаче?
- г) Сколько уравнений в условиях дополняющей нежёсткости?

**5.5** В каждой транспортной таблице выписано базисное допустимое решение. Определите, какие переменные должны быть базисными, какие должны быть свободными, а какие могут быть базисными или свободными.

а)

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  |          |          |          |
|  | 5        | $x_{12}$ | $x_{13}$ |
|  | $x_{21}$ | 7        | 8        |
|  | $x_{31}$ | $x_{32}$ | 3        |

б)

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  |          |          |          |
|  | 5        | $x_{12}$ | $x_{13}$ |
|  | 3        | $x_{22}$ | 8        |
|  | $x_{31}$ | $x_{32}$ | 3        |

в)

|  |   |          |          |
|--|---|----------|----------|
|  |   |          |          |
|  | 5 | $x_{12}$ | $x_{13}$ |
|  | 3 | $x_{22}$ | $x_{23}$ |
|  | 9 | $x_{32}$ | 3        |


г)

|  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |          |          |          |          |          |
|  | 5        | $x_{12}$ | 4        | $x_{34}$ | 7        |
|  | 2        | $x_{22}$ | $x_{23}$ | 3        | $x_{25}$ |
|  | $x_{31}$ | $x_{32}$ | 2        | $x_{34}$ | $x_{35}$ |
|  | $x_{41}$ | 7        | $x_{43}$ | $x_{44}$ | $x_{45}$ |


**5.6**

## 6. Сети

Алгоритм Дейкстры, Dijkstra algorithm,




**6.1** На ребрах графа указано время в пути.



- С помощью алгоритма Дейкстры найдите самые быстрые маршруты из вершины  $A$  во все остальные вершины.
- Выпишите матрицу весов для куска графа из вершин  $A, B, C$  и  $D$ .

**6.2** С помощью алгоритма Дейкстры найдите кратчайшее расстояние из точки старта  $s$  до каждой точки лабиринта.



### 6.3 Матрица весов взвешенного графа равна

$$M = \begin{pmatrix} \infty & 4 & \infty & 2 \\ 2 & \infty & 1 & \infty \\ 3 & 4 & \infty & 1 \\ 5 & 6 & \infty & \infty \end{pmatrix}.$$

Нарисуйте граф.

### 6.4 Матрица смежности графа равна

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

а) Нарисуйте граф.


б) Найдите матрицу  $A = M^2$ . Какой смысл у элемента  $a_{44}$ ? Какой смысл у элемента  $a_{31}$ ?

в) Найдите матрицу  $B = M^3$ . Какой смысл у элемента  $b_{31}$ ? Какой смысл у элемента  $b_{32}$ ?

## Задача о максимальном потоке и о минимальном разрезе


- пропускная способность, capacity, 大流量? ;
- поток, flow, 流 ;
- источник, source, 源 ;
- сток, sink, 汇 ;
- разрез, cut, 割 ;
- бутылочное горлышко, bottleneck, 瓶颈 ;
- минимальный разрез, minimal cut, 最小割 ;
- увеличивающая цепь, augmenting path, 增广路径 ;
- остаточная пропускная способность, residual capacity, 残留容量 ;

Хорошие слайды можно найти у Кляйнберга и Тардос, [KT].  
алгоритм Форда — Фалкерсона, Ford — Fulkerson algorithm, ? ;






**6.5** На ребрах графа указаны текущий поток  $f$  и пропускная способность  $c$ . Например, надпись  $1/3$  над ребром означает, что по ребру течёт поток величины 1, а пропускная способность ребра равна 3.




- Найдите пропускную способность разреза  $c(S, T)$  для  $S = \{s, b, c\}$ ,  $T = \{e, g, t, d\}$ .
- Найдите пропускную способность разреза  $c(S, T)$  для  $S = \{s, g, e\}$ ,  $T = \{b, c, t, d\}$ .
- Найдите величину потока  $v(f)$ .
- Найдите исходящий поток  $f^{\text{out}}(S)$  и входящий поток  $f^{\text{in}}(S)$  для множества  $S = \{s, b, g, e\}$ .
- Найдите остаточную пропускную способность  $\text{bnesk}(s - b - e - t, f)$ .
- Найдите остаточную пропускную способность  $\text{bnesk}(s - c - g - d - e - t, f)$ .

**6.6** Надпись  $f/c$  на ребре означает текущий поток  $f$  и пропускную способность  $c$ .




- С помощью алгоритма Форда — Фалкерсона найдите максимальный поток.
- Укажите минимальный разрез.
- Запишите задачу максимизации потока как задачу линейного программирования.

**6.7** На ребрах графа с помощью  $f/c$  указаны текущий поток  $f$  и пропускная способность  $c$ .




- С помощью алгоритма Форда — Фалкерсона найдите максимальный поток.
- Укажите минимальный разрез.
- Запишите задачу максимизации потока как задачу линейного программирования.

**6.8** Надпись  $f/c$  на ребре означает текущий поток  $f$  и пропускную способность  $c$ .



- Найдите пропускную способность разреза  $c(S, T)$  для  $S = \{s, b, c\}$  и  $T = \{e, g, t\}$ .
- Найдите пропускную способность разреза  $c(S, T)$  для  $S = \{s, g, e\}$  и  $T = \{b, c, t\}$ .
- Найдите величину потока  $v(f)$ .
- Найдите исходящий поток  $f^{\text{out}}(S)$  и входящий поток  $f^{\text{in}}(S)$  для множества  $S = \{s, c, g\}$ .
- Найдите остаточную пропускную способность  $\text{bnesk}(s - b - e - t, f)$ .
- Найдите остаточную пропускную способность  $\text{bnesk}(s - c - g - b - e - t, f)$ .


**6.9** Рассмотрим следующий граф:



- Найдите степень каждой вершины,  $\deg(v)$ .
- Найдите центральность каждой вершины по близости,  $\text{closeness}(v)$ .

в) Найдите центральность каждой вершины по числу кратчайших путей,  $\text{betweenness}(v)$ .

**6.10** Рассмотрим следующий граф:



а) Найдите степень каждой вершины,  $\deg(v)$ .

б) Найдите центральность каждой вершины по близости,  $\text{closeness}(v)$ .

в) Найдите центральность каждой вершины по числу кратчайших путей,  $\text{betweenness}(v)$ .

## 7. Неравенство Коши — Буняковского

- AM/GM inequality,

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)/n \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}.$$

- Неравенство Коши — Буняковского, Cauchy — Schwarz inequality,

**7.1** Найдите условные экстремумы:

а)  $xyz \rightarrow \max$  при условии  $x + y + z = 600, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ .

б)  $xy \rightarrow \max$  при условии  $2x + y = 600, x \geq 0, y \geq 0$ .

в)  $xy \rightarrow \max$  при условии  $2x + y = 400, x \geq 0, y \geq 0$ .

г)  $x^2 y \rightarrow \max$  при условии  $x + y = 300, x \geq 0, y \geq 0$ .

д)  $x^3 y^5 \rightarrow \max$  при условии  $6x + 7y = 200, x \geq 0, y \geq 0$ .

е)  $a + b + c \rightarrow \min$  при условии  $abc = 100, a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$ .

ж)  $ab + bc + ac \rightarrow \min$  при условии  $abc = 100, a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$ .

з)  $2a + 3b + 4c \rightarrow \min$  при условии  $abc = 100, a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$ .

и)  $2ab + 3bc + 4ac \rightarrow \min$  при условии  $abc = 100, a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$ .

к)  $a + b + c \rightarrow \min$  при условии  $a^2 b^3 c^4 = 100, a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$ .

л)  $7a + 3b + 4c \rightarrow \min$  при условии  $a^2 b^3 c^4 = 100, a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$ .

**7.2**

**7.3**

**7.4**

**7.5**

**7.6**

## 8. Решения

1.1.

1.2.

1.3.

а)  $E = 0.5A + 0B + 0.5C + 0D$

б) Например,  $F = 0A + 0.5B + 0.5C + 0D = 0.5A + 0B + 0C + 0.5D = 0.25A + 0.25B + 0.25C + 0.25D$ .  
Для нахождения всех способов надо решить систему:

$$\alpha A + \beta B + \gamma C + \delta D = E \alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 1 & 5 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Все способы,  $F = \alpha A + (0.5 - \alpha)B + (0.5 - \alpha)C + \alpha D$ , где  $\alpha \in [0; 0.5]$ .

в) Нельзя, так как  $G \notin \text{Convex}(A, B, C, D)$ .

г) Есть  $\infty$  способов.

д) Есть 1 способ. Решаем систему уравнений  $I = t_1A + t_2B + (1 - t_1 - t_2)D$ . Получаем, что  $I = 0.25A + 0.25B + 0.5D$ .

е) Есть 1 способ,  $J = 0.25A + 0.75B$ .

ж) 0

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

| вектор                  | решение | базисное решение | допустимое решение |
|-------------------------|---------|------------------|--------------------|
| $x_a = (0, 0, 0, 0)$    | нет     | нет              | нет                |
| $x_b = (0, 0, 8, 9)$    | да      | да               | да                 |
| $x_c = (1, 0, 6, 8)$    | да      | нет              | да                 |
| $x_d = (1, -9, 33, -1)$ | да      | нет              | нет                |
| $x_e = (0, -9, 35, 0)$  | да      | да               | нет                |

| вектор                      | решение | базисное решение | допустимое решение |
|-----------------------------|---------|------------------|--------------------|
| $x_a = (1, 2, 3, 4)$        | нет     | нет              | нет                |
| 3.2. $x_b = (0, 0, 10, 11)$ | да      | да               | да                 |
| $x_c = (1, 0, 9, 9)$        | да      | нет              | да                 |
| $x_d = (6, -1, 7, 0)$       | да      | нет              | нет                |
| $x_e = (0, 11, -23, 0)$     | да      | да               | нет                |

### 3.3.

а)  $x = (0, 0, 8, 15, 11)$

б)

### 3.4.

а) Решение  $x = (0, 0, -8, 15, 11)$  является базисным и не является допустимым. Подойдёт, например,  $x = (4, 0, 0, 11, 15)$ .

б)

### 3.5.

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $x_3$ | 1     | 3     | 1     | 0     | 9   |
| $x_4$ | 2*    | 1     | 0     | 1     | 8   |

,  $x = (0, 0, 9, 8), z = 0$ .

| max $z$ | 1     | 1     | 0     | 0     | $z$ |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|
|         | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$ |

|       |   |      |   |      |   |
|-------|---|------|---|------|---|
| $x_3$ | 0 | 5/2* | 1 | -1/2 | 5 |
| $x_1$ | 1 | 1/2  | 0 | 1/2  | 4 |

,  $x = (4, 0, 5, 0), z = 4$ .

| max $z$ | 0     | 1/2   | 0     | -1/2  | $z - 4$ |
|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
|         | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$     |

|       |   |   |      |      |   |
|-------|---|---|------|------|---|
| $x_2$ | 0 | 1 | 2/5  | -1/5 | 2 |
| $x_1$ | 1 | 0 | -1/5 | 3/5  | 3 |

,  $x = (3, 2, 0, 0), z = 5$ .

|         |   |   |      |      |         |
|---------|---|---|------|------|---------|
| max $z$ | 0 | 0 | -1/5 | -2/5 | $z - 5$ |
|---------|---|---|------|------|---------|

### 3.6.

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $b$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $x_4$ | 1     | 1     | 2     | 1     | 0     | 10  |
| $x_5$ | 2     | 1     | 1     | 0     | 1     | 5   |

,  $x = (0, 0, 0, 10, 5), z = 0$ .

|         |   |   |   |   |   |     |
|---------|---|---|---|---|---|-----|
| max $z$ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | $z$ |
|---------|---|---|---|---|---|-----|

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $b$      |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|
| $x_4$    | -3    | -1    | 0     | 1     | -2    | 0        |  |
| $x_3$    | 2     | 1     | 1     | 0     | 1     | 5        |  |
| $\max z$ | -5    | -1    | 0     | 0     | -3    | $z - 15$ |  |

$x = (0, 0, 5, 10, 0), z = 15.$

3.7.

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$  |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| $x_3$    | 1     | 1     | 1     | 0     | 10   |  |
| $x_4$    | 2     | 1     | 0     | 1     | 5    |  |
| $\min z$ | -2    | 3     | 0     | 0     | $-z$ |  |

$x = (0, 0, 10, 5), z = 0.$

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$       |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|--|
| $x_3$    | -1    | 0     | 1     | -1    | 5         |  |
| $x_2$    | 2     | 1     | 0     | 1     | 5         |  |
| $\min z$ | -8    | 0     | 0     | -3    | $-z - 15$ |  |

$x = (0, 5, 5, 0), z = -15.$

3.8.

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $b$ |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| $x_4$    | 2     | 1*    | 3     | 1     | 0     | 10  |  |
| $x_5$    | 1     | -1    | 1     | 0     | 1     | 6   |  |
| $\max z$ | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | $z$ |  |

$x = (0, 0, 0, 10, 6), z = 0.$

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $b$      |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|
| $x_2$    | 2     | 1     | 3     | 1     | 0     | 10       |  |
| $x_5$    | 3     | 0     | 4     | 1     | 1     | 16       |  |
| $\max z$ | -1    | 0     | -2    | -1    | 0     | $z - 10$ |  |

$x = (0, 10, 0, 0, 16), z = 10.$

3.9.

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $b$  |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| $x_4$    | 3     | 2     | 1     | 1     | 0     | 10   |  |
| $x_5$    | 1     | 1*    | -1    | 0     | 1     | 5    |  |
| $\min z$ | -1    | 2     | -3    | 0     | 0     | $-z$ |  |

$x = (0, 0, 0, 10, 5), z = 0.$

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $b$       |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--|
| $x_4$    | 1     | 0     | 3     | 1     | -2    | 0         |  |
| $x_2$    | 1     | 1     | -1    | 0     | 1     | 5         |  |
| $\min z$ | -3    | 0     | -1    | 0     | -2    | $-z - 10$ |  |

$x = (0, 5, 0, 0, 0), z = -10.$

3.10.

a)  $x = (3, 4, 0, 0).$

б) Найдите все допустимые решения.

в)

$$x_1 = 3 - x_3 - 5x_4 \geq 0, x_2 = 4 - 2x_3 - 6x_4 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

г)  $A = (3, 4, 0, 0)$ ,  $B = (0, 2/5, 0, 3/5)$ ,  $C = (0, 0, 1/2, 1/2)$ ,  $D = (1, 0, 2, 0)$ .

д)  $\text{Convex}(A, B, C, D)$ , где  $A = (3, 4, 0, 0)$ ,  $B = (0, 2/5, 0, 3/5)$ ,  $C = (0, 0, 1/2, 1/2)$ ,  $D = (1, 0, 2, 0)$ .

е)  $D = (1, 0, 2, 0)$ ,  $z = 2$ .

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$     |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $x_1$    | 1     | -1    | 0     | 2     | 1       |
| $x_3$    | 0     | 0.5   | 1     | 3     | 2       |
| $\min z$ | 0     | -1.5  | 0     | -12   | $2 - z$ |

3.11.

3.12.

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y_1$ | $b$     |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $x_1$    | 1     | 0     | -1/2  | -1/2  | 1/2   | 1/2     |
| $x_2$    | 0     | 1     | -1/2  | 1/2   | 1/2   | 1/2     |
| $\max z$ | 0     | 0     | 1     | 0     | -1    | $z - 1$ |
| $\min u$ | 0     | 0     | 0     | 0     | -1    | $-u$    |

, неограниченная задача

3.13.

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$     |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $x_1$    | 1     | 0     | 1/2   | -1/2  | 1/2     |
| $x_2$    | 0     | 1     | 1/2   | 1/2*  | 1/2     |
| $\max z$ | 0     | 0     | -1    | 0     | $z - 1$ |

,  $x = (1/2, 1/2, 0, 0)$ ,  $z = 1$ .

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $b$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $x_1$ | 1     | 1     | 1     | 0     | 1   |
| $x_4$ | 0     | 2*    | 1     | 1     | 1   |

,  $x = (1, 0, 0, 0)$ ,  $z = 1$ .

$$\max z \quad 0 \quad 0 \quad -1 \quad 0 \quad z - 1$$

Оптимум:  $[A, B] = \text{Convex}(A, B)$ ,  $A = (1/2, 1/2)$ ,  $B = (1, 0)$ .

3.14.

3.15.  $z = 15$

а) Например,  $A = (5, 6, 0, 0)$ .

б)

$$\begin{cases} x_3 \geq 0 \\ x_1 = 5 + x_3 \\ x_2 = 6 + 2x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

в)  $A = (5, 6, 0, 0)$

г)  $x \in A + \text{Cone}(u)$ , где  $A = (5, 6, 0, 0)$ ,  $u = (1, 2, 1, 0)$ .

**3.16.**  $z = -16$

а) Например,  $A = (5, 6, 0, 0)$ .

б)

$$\begin{cases} x_3 \in [0; 2] \\ x_1 = 5 + x_3 \\ x_2 = 6 - x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

в)  $A = (5, 6, 0, 0)$ ,  $B = (7, 0, 2, 0)$ .

г)  $x \in \text{Convex}(A, B)$ , где  $A = (5, 6, 0, 0)$ ,  $B = (7, 0, 2, 0)$ .

**3.17.**  $z = 20$

а) Например,  $A = (5, 6, 0, 0)$ .

б)

$$\begin{cases} (x_3, x_4) \in S \\ S = \{(x_3, x_4) \mid x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, 6 - 3x_3 + x_4 \geq 0\} \\ x_1 = 5 + x_3 + 2x_4 \\ x_2 = 6 - 3x_3 + x_4 \end{cases}$$

в)  $A = (5, 6, 0, 0)$ ,  $B = (7, 0, 2, 0)$ .

г)  $x \in \text{Convex}(A, B) + \text{Cone}(u, v)$ , где  $A = (5, 6, 0, 0)$ ,  $B = (7, 0, 2, 0)$ ,  $u = (2, 1, 0, 1)$ ,  $v = (7, 0, 1, 3)$ .

**3.18.**

а) Например,  $A = (2, 6, 0, 0)$ .

б)  $\text{Convex}(A, B, C) + \text{Cone}(u)$ , где  $A = (2, 6, 0, 0)$ ,  $B = (0, 5, 1, 0)$ ,  $C = (0, 0, 6, 10/3)$ ,  $u = (3, 0, 0, 1)$ .

в)  $A = (2, 6, 0, 0)$ ,  $B = (0, 5, 1, 0)$ ,  $C = (0, 0, 6, 10/3)$

г) Например,  $A = (2, 6, 0, 0)$ .

д)  $\text{Convex}(A, B)$ , где  $A = (2, 6, 0, 0)$ ,  $B = (0, 5, 1, 0)$

е)  $A = (2, 6, 0, 0)$ ,  $B = (0, 5, 1, 0)$

**3.19.**

а) Например,  $A = (0, 0, 0)$ .

б)  $\text{Convex}(A, B, C, D)$ , где  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (10, 0, 0)$ ,  $C = (0, 10, 0)$ ,  $D = (0, 0, 10)$ .



в)  $A = (0, 0, 0), B = (10, 0, 0), C = (0, 10, 0), D = (0, 0, 10)$ .

г) Например,  $B = (10, 0, 0)$ .

д)  $\text{Convex}(B, C)$ , где  $B = (10, 0, 0), C = (0, 10, 0)$ .

е)  $B = (10, 0, 0), C = (0, 10, 0)$ .

### 3.20.

#### 4.1.

а)

$$\begin{cases} 6y_1 + 10y_2 \rightarrow \max \\ y_1 + y_2 \leq 1 \\ y_1 - y_2 \leq 3 \\ y_1 + 2y_2 \leq 1 \\ y_1 - 2y_2 \leq -1 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

б)  $y_1 = 0, y_2 = 1/2, u = 5$

в)  $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 5 + x_4, x_4 \geq 1/2, z = 5$ . Можно записать ответ в виде  $x \in A + \text{Cone}(u)$ , где  $A = (0, 0, 5.5, 0.5), u = (0, 0, 1, 1)$ .

#### 4.2.

а)

$$\begin{cases} 6y_1 + 10y_2 \rightarrow \min \\ y_1 + y_2 \geq 1 \\ y_1 - y_2 \geq 3 \\ y_1 + 2y_2 \geq 1 \\ y_1 - 2y_2 \geq -1 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

б)  $y_1 = 3, y_2 = 0, u = 18$

в)  $x_1 = 0, x_2 = 6, x_3 = 0, x_4 = 0, z = 18$

#### 4.3.

а)

$$\begin{cases} 6y_1 + 10y_2 \rightarrow \max \\ y_1 + y_2 \leq 1 \\ y_1 - y_2 = 3 \\ y_1 + 2y_2 \leq 1 \\ 3y_1 - 2y_2 \leq -1 \end{cases}$$

б)  $y_1 = -7, y_2 = -10, u = -142$

в)  $x_1 = 0, x_2 = -42, x_3 = 0, x_4 = 16, z = -142$

#### 4.4.

а)

$$\begin{cases} 6y_1 + 10y_2 \rightarrow \max \\ y_1 + y_2 \leq 1 \\ y_1 - y_2 = 3 \\ y_1 + 2y_2 \leq 1 \\ 3y_1 - 2y_2 \leq -1 \\ y_1 \geq 0 \end{cases}$$

б) Пустое допустимое множество.

в) Неограниченная задача.

#### 4.5.

а)

$$\begin{cases} 6y_1 + 10y_2 \rightarrow \max \\ y_1 + 2y_2 = 1 \\ y_1 + 2y_2 = 3 \\ y_1 + 2y_2 \leq 1 \\ 3y_1 + 6y_2 \leq -1 \end{cases}$$

б) Пустое допустимое множество.

в) Пустое допустимое множество.

#### 5.1.

#### 5.2.

а)

б)  $\text{Eq}_1 + \text{Eq}_2 = \text{Eq}_3 + \text{Eq}_4 + \text{Eq}_5$ ;

в) 4 базисных переменных и 2 свободных;

г)

д)

$$X = \begin{pmatrix} & 0 \\ 0 & \end{pmatrix}$$

е)

$$X = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

ж)

3)

$$X = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

5.3.

5.4.

а)  $3 \cdot 7 = 21;$

б)  $3 + 7 - 1 = 9, 21 - 9 = 12;$

в)  $3 + 7 = 10;$

г)  $10 + 21 = 31;$

5.5. Буквой «Б» отмечены переменные, которые обязательно являются базисными. Буквой «С» отмечены переменные, которые обязательно являются свободными. Надписью «Б или С» отмечены переменные, которые могут быть базисными или свободными.

а)

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
|  |         |         |         |
|  | Б       | Б или С | Б или С |
|  | Б или С | Б       | Б       |
|  | Б или С | С       | Б       |

б)

|  |   |         |   |
|--|---|---------|---|
|  |   |         |   |
|  | Б | Б или С | С |
|  | Б | Б или С | Б |
|  | С | Б или С | Б |

в)

|  |   |         |   |
|--|---|---------|---|
|  |   |         |   |
|  | Б | Б или С | С |
|  | Б | Б или С | С |
|  | Б | Б или С | Б |

г)

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |         |         |         |         |         |
|  | Б       | Б или С | Б       | С       | Б       |
|  | Б       | Б или С | С       | Б       | С       |
|  | С       | Б или С | Б       | С       | С       |
|  | Б или С | Б       | Б или С | Б или С | Б или С |

|           | $b_1 = 10$ | $b_2 = 20$ | $b_3 = 17$ |
|-----------|------------|------------|------------|
| $a_1 = 5$ | 12         | 10         | 6          |
| $a_2 = 6$ | 400        | 15         | 3          |
| $a_3 = 7$ | 300        | 7          | M          |
| $a_4 = 5$ | 11         | 8          | 6          |
|           |            | 500        | 300        |

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

a)  $c(S, T) = 5 + 3 + 6 + 1 + 6 = 21$ ;

б)  $c(S, T) = 3 + 6 + 4 + 4 + 2 = 19$ ;

в)  $v(f) = 4$ ;


г)  $f^{\text{out}}(S) = 0 + 2 + 1 + 1 + 1 = 5$ ,  $f^{\text{in}}(S) = 1 + 0 + 0 = 1$ ;

д)  $\text{bneck}(s - b - e - t, f) = \min\{2, 4, 3\} = 2$ ;

е)  $\text{bneck}(s - c - g - d - e - t, f) = \min\{1, 6, 1, 5, 3\} = 1$ .

6.6.

a)  $\max v(f) = 19$ ;




б)  $\min c(S, T) = 19, S = \{s, c\}, T = \{b, g, e, t\}$ .

6.7.

а)  $\max v(f) = 10$ ;

Один из возможных вариантов:



б)  $\min c(S, T) = 10, S = \{s, b, c, d, e, g\}, T = \{t\}$ .

в)

$$\begin{cases} x_{sb} + x_{sc} + x_{sd} \rightarrow \max \\ \text{все } x_{ij} \geq 0 \\ x_{sb} \leq 3, x_{sd} \leq 6, x_{sc} \leq 2, x_{bd} \leq 3, x_{be} \leq 5 \\ x_{cg} \leq 6, x_{cd} \leq 1, x_{de} \leq 5, x_{dt} \leq 2, x_{dg} \leq 2 \\ x_{et} \leq 4, x_{gt} \leq 4 \\ x_{sb} = x_{bd} + x_{be}, x_{be} + x_{de} = x_{et}, x_{sc} = x_{cd} + x_{cg} \\ x_{dg} + x_{cg} = x_{gt}, x_{sd} + x_{bd} + x_{cd} = x_{de} + x_{dt} + x_{dg} \end{cases}$$

6.8.

а)  $c(S, T) = 4 + 8 + 9 = 21$ ;

б)  $c(S, T) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40$ ;

в)  $v(f) = 2 + 8 = 10$ .

г)  $f^{\text{out}}(S)$  и входящий поток  $f^{\text{in}}(S)$  для множества  $S = \{s, c, g\}$ .

д)  $\text{bneck}(s - b - e - t, f) = \min\{2, 4, 10\} = 2$ .

е)  $\text{bneck}(s - c - g - b - e - t, f) = \min\{8, 7, 8, 4, 10\} = 4$ .

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

## Источники мудрости

- [Fer] Tomas Ferguson. *Linear programming: concise introduction*. URL: [http://web.tecnico.ulisboa.pt/mcasquilho/acad/or/ftp/FergusonUCLA\\_LP.pdf](http://web.tecnico.ulisboa.pt/mcasquilho/acad/or/ftp/FergusonUCLA_LP.pdf).
- [Law] Neil Laws. *Linear programming: lecture notes*. URL: <https://www.stats.ox.ac.uk/~cmcd/lp/lp.pdf>.
- [lit] littleO (<https://math.stackexchange.com/users/40119/littleo>). *Intuition behind the dual problem in optimization*. Mathematics Stack Exchange. URL: <https://math.stackexchange.com/q/223235>.
- [KT] Kleinberg, John and Tardos, Éva. *Lecture Slides for Algorithm Design*. URL: <https://www.cs.princeton.edu/~wayne/kleinberg-tardos/>.