

1) Покажем, что для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ и $f, g \in \mathcal{H}_2[0; T]$ справедливо равенство:

$$\int_0^T (\alpha f(s) + \beta g(s)) dW(s) = \alpha \int_0^T f(s) dW(s) + \beta \int_0^T g(s) dW(s) \quad (\text{п.н.}).$$

В самом деле, в силу предложения 1.1 для $f, g \in \mathcal{H}_2[0; T]$ найдутся последовательности $(f_n)_{n=1}^\infty, (g_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{H}_2[0; T]$ ступенчатых процессов, для которых выполнены соотношения

$$\mathbb{E} \int_0^T (f_n(s) - f(s))^2 ds \rightarrow 0 \quad \text{и} \quad \mathbb{E} \int_0^T (g_n(s) - g(s))^2 ds \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

Тогда согласно определению интеграла Ито:

$$\mathbb{E}[I(f) - I(f_n)]^2 \rightarrow 0 \quad \text{и} \quad \mathbb{E}[I(g) - I(g_n)]^2 \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

Далее, поскольку процессы f, g принадлежат $\mathcal{H}_2[0; T]$ и являются ступенчатыми, процесс $\alpha f + \beta g$ также принадлежит $\mathcal{H}_2[0; T]$ и является ступенчатым. Кроме того, при $n \rightarrow \infty$:

$$\mathbb{E} \int_0^T ((\alpha f_n + \beta g_n) - (\alpha f + \beta g))^2 ds \rightarrow 0 \quad \text{и} \quad \mathbb{E}[\alpha I(f_n) + \beta I(g_n) - \alpha I(f) - \beta I(g)]^2 \rightarrow 0.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} & \sqrt{\mathbb{E}[I(\alpha f + \beta g) - \alpha I(f) - \beta I(g)]^2} \leq \\ & \leq \sqrt{\mathbb{E}[I(\alpha f + \beta g) - I(\alpha f_n + \beta g_n)]^2} + \sqrt{\mathbb{E}[I(\alpha f_n + \beta g_n) - \alpha I(f) - \beta I(g)]^2} = \\ & = \sqrt{\mathbb{E}[I(\alpha f + \beta g) - I(\alpha f_n + \beta g_n)]^2} + \sqrt{\mathbb{E}[\alpha I(f_n) + \beta I(g_n) - \alpha I(f) - \beta I(g)]^2} \leq \\ & \leq \underbrace{\sqrt{\mathbb{E}[I(\alpha f + \beta g) - I(\alpha f_n + \beta g_n)]^2}}_{\rightarrow 0} + |\alpha| \underbrace{\sqrt{\mathbb{E}[I(f_n) - I(f)]^2}}_{\rightarrow 0} + |\beta| \underbrace{\sqrt{\mathbb{E}[I(g_n) - I(g)]^2}}_{\rightarrow 0}. \end{aligned}$$

Следовательно, $\sqrt{\mathbb{E}[I(\alpha f + \beta g) - \alpha I(f) - \beta I(g)]^2} = 0$, а значит,

$$I(\alpha f + \beta g) = \alpha I(f) + \beta I(g) \quad (\text{п.н.}). \quad \square$$

2) Для любого $f \in \mathcal{H}_2[0; T]$ справедливо равенство

$$\mathbb{E} \int_0^T f(s) dW(s) = 0.$$

Действительно, пусть $(f_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{H}_2[0; T]$ — последовательность ступенчатых процессов, такая, что $\mathbb{E} \int_0^T (f_n(s) - f(s))^2 ds \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. В силу определения стохастического интеграла $\mathbb{E}[I(f) - I(f_n)]^2 \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда, учитывая, что для простых процессов выполнено соотношение $\mathbb{E}I(f_n) = 0$, получаем, что при $n \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}I(f)|^2 &= |\mathbb{E}I(f) - \mathbb{E}I(f_n) + \mathbb{E}I(f_n)|^2 = |\mathbb{E}I(f) - \mathbb{E}I(f_n)|^2 = \\ &= |\mathbb{E}[I(f) - I(f_n)]|^2 \leq \mathbb{E}|I(f) - I(f_n)|^2 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Следовательно, $\mathbb{E}I(f) = 0$. \square