

Exercice 1

$$(P_1) \begin{cases} \max Z = & 3x_1 & -4x_2 \\ \text{s.c.} & 3x_1 + 2x_2 \leq 12 \rightarrow y_1 \\ & -x_2 \leq 18 \rightarrow y_2 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 4 \rightarrow y_3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \quad (D_1) \begin{cases} \min w = 12y_1 + 18y_2 + 4y_3 \\ \text{s.c.} & 3y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 3 \\ & 2y_1 - y_2 - y_3 \geq 4 \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$(P_2) \begin{cases} \min Z = -x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} & -x_1 + 3x_2 \geq 5 \rightarrow y_1 \\ & x_2 \geq 12 \rightarrow y_2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \max cx \\ Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \min yb \\ yA \geq c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$$(D_2) \begin{cases} \max w = 5y_1 + 12y_2 \\ \text{s.c.} & -y_1 \leq -1 \\ & 3y_1 + y_2 \leq 1 \\ & y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

| Problème de maximisation | Problème de minimisation |
|---|---|
| Fonction objectif | Second membre |
| A : matrice des contraintes | A ^t : matrice des contraintes |
| Variable x _i ≥ 0 | Contrainte i de type ≥ |
| Variable x _i ≤ 0 | Contrainte i de type ≤ |
| Variable x _i non contrainte en signe (∈ ℝ) | Contrainte i de type = |
| Contrainte j de type ≤ | Variable y _j ≥ 0 |
| Contrainte j de type = | Variable y _j non contrainte en signe (∈ ℝ) |
| Contrainte j de type ≥ | Variable y _j ≤ 0 |

$$(P_3) \begin{cases} \max Z = x_1 + 4x_2 \\ \text{s.c.} & x_1 + x_2 \leq 4 \rightarrow y_1 \\ & x_1 + x_2 \geq 2 \rightarrow y_2 \\ & x_1 - x_2 = -2 \rightarrow y_3 \\ & x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \geq 0 \end{cases} \quad (D_3) \begin{cases} \min w = 4y_1 + 2y_2 - 2y_3 \\ & y_1 + y_2 + y_3 = 1 \\ & y_1 + y_2 - y_3 \geq 4 \\ & y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Exercice 2

Résoudre graphiquement le programme linéaire suivant :


$$(P) \begin{cases} \min 4x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 6x_4 = w \\ \text{s.c.} & x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 6x_4 \geq 5 \rightarrow y_1 \\ & 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 5x_4 \geq 7 \rightarrow y_2 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Méthode :

- on écrit le dual qui ne comporte que 2 variables
- on résout graphiquement le dual
- on trouve la solution du primal à partir de celle du dual grâce aux écarts complémentaires.

$$\max w = 2 - 5u + 7v$$

- on résout graphiquement le dual
- on trouve la solution du primal à partir de celle du dual grâce aux écarts complémentaires.



Solution opt. de (D) : $y_1 = 0$, $y_2 = \frac{6}{5}$, valeur $z^* = \frac{42}{5}$

Pour en déduire la solution du primal, on écrit les conditions d'écarts complémentaires :

$$(I) \begin{cases} \forall j = 1, \dots, n, \tilde{x}_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} \tilde{y}_i - c_j \right) = 0 \\ \forall i = 1, \dots, m, \tilde{y}_i \left(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} \tilde{x}_j \right) = 0 \end{cases}$$

$$(P) \begin{cases} \min & 4x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 6x_4 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 6x_4 \geq 5 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 5x_4 \geq 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

Conditions d'écarts complémentaires :

$$(I) \begin{cases} x_1 (y_1 + 2y_2 - 4) = 0 \\ x_2 (3y_1 + y_2 - 5) = 0 \\ x_3 (2y_1 - 3y_2 - 2) = 0 \\ x_4 (6y_1 + 5y_2 - 6) = 0 \\ y_1 (x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 6x_4 - 5) = 0 \\ y_2 (2x_1 + x_2 - 3x_3 + 5x_4 - 7) = 0 \end{cases}$$

(I) devient

$$\begin{cases} x_1 \times \left(\frac{12}{5} - 4 \right) = 0 \\ x_2 \times \left(\frac{6}{5} - 5 \right) = 0 \\ x_3 \times \left(-\frac{30}{5} - 2 \right) = 0 \\ x_4 \times 0 = 0 \quad (\text{tjs vrai}) \\ 0 = 0 \\ \frac{6}{5} (2x_1 + x_2 - 3x_3 + 5x_4 - 7) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = \frac{7}{5} \end{cases}$$

Vérification $v(0, 0, 0, \frac{7}{5}) = \frac{42}{5} = z(0, \frac{6}{5})$

(D)
$$\begin{cases} \max z = 5y_1 + 7y_2 \\ y_1 + 2y_2 \leq 4 \rightarrow x_1 \\ 3y_1 + y_2 \leq 5 \rightarrow x_2 \\ 2y_1 - 3y_2 \leq 2 \rightarrow x_3 \\ 6y_1 + 5y_2 \leq 6 \rightarrow x_4 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

D'après le th. des écarts complémentaires, pour trouver la solution optimale de (P), il suffit d'injecter dans (I) la solution optimale de (D) : $y_1 = 0$, $y_2 = \frac{6}{5}$

c'est la sol. optimale de (P)

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = \frac{7}{5} \end{cases}$$

Exercice 3

Soit le programme linéaire :

$$(P) \begin{cases} \max Z = 36x_1 + 24x_2 \\ \text{s.c.} \quad \begin{cases} 3x_1 \leq 16 \\ x_1 + x_2 \leq 27 \\ 2x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

1. Résoudre ce programme à l'aide de la méthode du simplexe. Vérifiez graphiquement.
2. Écrire le programme dual, puis écrire le problème dual dans sa base optimale.
3. Retrouvez la solution optimale du dual à partir de la solution optimale du primal, cette fois en utilisant les relations d'écart complémentaires.

1) forme standard :

$$\begin{cases} \max Z = 36x_1 + 24x_2 \\ \text{s.c.} \quad \begin{cases} 3x_1 + x_3 = 16 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 27 \\ 2x_2 + x_5 = 10 \\ x \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$Z = \text{cte} + \sum_{i \in D} \Delta_i x_i$$

$$\sum \Delta_i x_i - Z = -\text{cte}$$

| B | x_1 | x_2 | x_3 | x_4 | x_5 | \bar{b} |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| $\leftarrow x_3$ | 3 | | 1 | | | 16 |
| x_4 | 1 | 1 | | 1 | | 27 |
| x_5 | | 2 | | | 1 | 10 |
| Δ | 36 | 24 | | | | 0 |

$$\Delta \neq 0 : \text{nelle itération}$$

Itération 1 x_1 entre, $\min \left(\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i1}} \right) = \min \left(\frac{16}{3}, \frac{27}{1} \right) = \frac{16}{3}$, x_3 sort

| | x_1 | x_2 | x_3 | x_4 | x_5 | \bar{b} |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| x_1 | 1 | | 1/3 | | | 16/3 |
| x_4 | 0 | 1 | -1/3 | 1 | | 65/3 |
| $\leftarrow x_5$ | 0 | 2 | | | 1 | 10 |
| Δ | 0 | 24 | -12 | 0 | 0 | -192 |

$$L_2 - \frac{1}{3} L_1$$

$$L_4 - 12 L_1$$

$$\Delta \neq 0$$

Itération 2 x_2 entre, $\min \left(\frac{65/3}{1}, \frac{10}{2} \right) = \frac{10}{2}$, x_5 sort

| | x_1 | x_2 | x_3 | x_4 | x_5 | \bar{b} |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| x_1 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | | 16/3 |
| x_4 | 0 | 0 | -1/3 | 1 | -1/2 | 50/3 |
| x_2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 5 |
| Δ | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 | -312 |

$$L_2 - L_3/2$$


$$L_3/2$$

$$L_4 - 12 L_3$$

$\Delta \leq 0$: la base est optimale

Sol. lin opt. de (P) : $x_1 = \frac{16}{3}$ $x_2 = 5$ $x_3 = 0$
 $x_4 = \frac{50}{3}$ $x_5 = 0$

Valeur optimale : $z^* = 312$



3)

$$(P) \begin{cases} \max Z = 36x_1 + 24x_2 \\ \text{s.c.} \begin{cases} 3x_1 \leq 16 \\ x_1 + x_2 \leq 27 \\ 2x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$(D) \begin{cases} \min W = 16y_1 + 27y_2 + 10y_3 \\ \begin{cases} 3y_1 + y_2 \geq 36 \\ y_2 + 2y_3 \geq 24 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

Relations d'écart complémentaires

$$(I) \begin{cases} x_1 (3y_1 + y_2 - 36) = 0 \\ x_2 (y_2 + 2y_3 - 24) = 0 \\ y_1 (3x_1 - 16) = 0 \\ y_2 (x_1 + x_2 - 27) = 0 \\ y_3 (2x_2 - 10) = 0 \end{cases}$$

ou bien

$$\begin{cases} x_1 y_4 = 0 \\ x_2 y_5 = 0 \\ y_1 x_3 = 0 \\ y_2 x_4 = 0 \\ y_3 x_5 = 0 \end{cases}$$

La solution optimale de (P) trouvée en 1) est : $x_1 = \frac{16}{3}$ $x_2 = 5$ ($x_3 = 0$ $x_4 = \frac{50}{3}$ $x_5 = 0$)
 hors-base hors-base

En l'injectant dans (I), il vient :

$$\begin{cases} 3y_1 + y_2 = 36 \\ y_2 + 2y_3 = 24 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = 12 \\ y_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Sol. opt. du dual}$$

$$(I) \begin{cases} 3y_1 + y_2 = 36 \\ y_2 + 2y_3 = 24 \\ y_1 = 0 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 12 \end{cases} \rightarrow \text{Sol. opt. du dual}$$

Rq $W(12, 0, 12) = 12 \times 16 + 12 \times 10 = 312 = 2 \left(\frac{16}{3}, 5 \right)$

2)

Le tableau du simplexe à l'optimum de P est le suivant :

| | x_1 | x_2 | x_3 | x_4 | x_5 | \bar{b} |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| x_1 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 16/3 |
| x_4 | 0 | 0 | -1/3 | 1 | -1/2 | 50/3 |
| x_2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 5 |
| Δ | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 | -312 |

Règle : x_i hors-base dans (P) $\Rightarrow y_i$ en base dans (D)

x_i hors-base dans (P) $\Rightarrow y_i$ en base dans (D)

Règles de correspondance :

init $\begin{pmatrix} x_1 & \text{---} & y_4 \\ x_2 & \text{---} & y_5 \end{pmatrix}$ écrit

écrit $\begin{pmatrix} x_3 & \text{---} & y_1 \\ x_4 & \text{---} & y_2 \\ x_5 & \text{---} & y_3 \end{pmatrix}$ init

x_3 hb $\Rightarrow y_1$ en base

x_5 hb $\Rightarrow y_3$ en base

| | x_1 | x_2 | x_3 | x_4 | x_5 | \bar{b} |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| x_1 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 16/3 |
| x_4 | 0 | 0 | -1/3 | 1 | -1/2 | 50/3 |
| x_2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 5 |
| Δ | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 | -312 |

(P)

| | y_1 | y_2 | y_3 | y_4 | y_5 | \bar{b} |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| y_1 | 1 | +1/3 | 0 | -1/3 | 0 | +12 |
| y_3 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | -1/2 | +12 |
| Δ | 0 | -59/3 | 0 | -16/3 | -5 | +312 |

version maxiat° de (D)

Exercice 4

On considère le problème de la programmation de l'activité d'un atelier qui fonctionne 45 h par semaine et peut fabriquer trois produits p_1 , p_2 et p_3 aux cadences de 50, 25 et 75 unités/heure. Par semaine, le marché ne peut absorber plus de 1000 unités de p_1 , 500 unités de p_2 et 1500 unités de p_3 . Les bénéfices unitaires sont respectivement de 4 u.m., 12 u.m. et 3 u.m. pour p_1 , p_2 et p_3 .

- Écrire le programme (P) de production qui maximise le bénéfice. Ce programme devra comporter 3 variables x_1 , x_2 et x_3 dont on donnera la signification.

x_i = # d'unités de p_i produites par semaine

$$\text{max } z = 4x_1 + 12x_2 + 3x_3$$

$x_1 = \pi$ unités de p_1 produites par semaine

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{max } z = 4x_1 + 12x_2 + 3x_3 \\ \text{s.c.} \quad \begin{array}{rcl} x_1 & & \leq 1000 \quad (1) \\ & x_2 & \leq 500 \quad (2) \\ & & x_3 \leq 1500 \quad (3) \end{array} \\ \frac{1}{50}x_1 + \frac{1}{25}x_2 + \frac{1}{75}x_3 \leq 45 \quad (4) \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{demande} \\ \text{tps disponible} \end{array}$$

$$(4) \times 150 \quad 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 6750$$

2. On souhaite tester l'optimalité de la solution (primale) $x_1 = 250$, $x_2 = 500$, $x_3 = 1500$. Montrer que cette solution est optimale à l'aide du dual de ce PL (pour cela, on déterminera une solution admissible particulière du dual).

Méthode : on écrit le dual et les conditions d'écarts complémentaires (I), puis on injecte dans (I) la solution candidate et on résout le système linéaire résultant. 3 cas sont alors possibles :

- on trouve une solution en y qui est réalisable pour (D) : d'après le th. des écarts complémentaires, la solution en x et la solution en y sont optimales (pour leur pb respectif)
- on trouve une solution en y non réalisable pour (D) : la solution en x n'est pas optimale pour (P)
- on ne trouve pas de solution au système linéaire : la solution en x n'est pas optimale pour (P)

$$(P) \left\{ \begin{array}{l} \text{max } z = 4x_1 + 12x_2 + 3x_3 \\ \text{s.c.} \quad \begin{array}{rcl} x_1 & & \leq 1000 \\ & x_2 & \leq 500 \\ & & x_3 \leq 1500 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 & \leq & 6750 \\ x_1, x_2, x_3 & \geq & 0 \end{array} \end{array} \right.$$

$$(D) \left\{ \begin{array}{l} \text{min } w = 1000y_1 + 500y_2 + 1500y_3 + 6750y_4 \\ \text{s.c.} \quad \begin{array}{rcl} y_1 & & +3y_4 \geq 4 \\ & y_2 & +6y_4 \geq 12 \\ & & y_3 +2y_4 \geq 3 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 & \geq & 0 \end{array} \end{array} \right.$$

Conditions d'écarts complémentaires :

$$(I) \left\{ \begin{array}{l} x_1 (y_1 + 3y_4 - 4) = 0 \\ x_2 (y_2 + 6y_4 - 12) = 0 \\ x_3 (y_3 + 2y_4 - 3) = 0 \\ y_1 (x_1 - 1000) = 0 \\ y_2 (x_2 - 500) = 0 \\ y_3 (x_3 - 1500) = 0 \\ y_4 (3x_1 + 6x_2 + 2x_3 - 6750) = 0 \end{array} \right.$$

Solution candidate : $x_1 = 250$, $x_2 = 500$, $x_3 = 1500$. Avec cette solution, (I) devient :

$$\begin{cases} y_1 + 3y_4 = 4 \\ y_2 + 6y_4 = 12 \\ y_3 + 2y_4 = 3 \\ y_1 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 4 \\ y_3 = 1/3 \\ y_4 = 4/3 \end{cases}$$

On doit vérifier si cette solution en y est ou non admissible pour le dual.

Rappel :

$$(D) \begin{cases} \min w = 1000y_1 + 500y_2 + 1500y_3 + 6750y_4 \\ \text{s.c.} \begin{array}{lll} y_1 & & +3y_4 \geq 4 \\ & y_2 & +6y_4 \geq 12 \\ & & y_3 + 2y_4 \geq 3 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{array} \end{cases}$$

$\begin{array}{ll} \text{① } 0 + 3 \times \frac{4}{3} \geq 4 & \text{② } 4 + 0 \geq 12 \\ \text{③ } \frac{1}{3} + \frac{8}{3} \geq 3 & \end{array}$

la solution trouvée en y est bien admissible pour (D), d'après le th. des écarts complémentaires, la solution en x est optimale pour (P) et celle en y optimale pour (D)

Rq : les valeurs optimales de (P) et (D) sont bien égales (= 11500)

3. Après vérification, il s'avère que les données initiales du PL sont légèrement erronées. Les nouveaux seconds membres des quatre contraintes sont respectivement 950, 550, 1575 et 6900. Écrire le dual de ce nouveau PL, et montrer que la solution duale trouvée précédemment est admissible pour ce nouveau dual. Cette solution est-elle optimale pour le nouveau dual (on utilisera le primal pour répondre à cette question) ? Déterminer une solution optimale pour le nouveau primal.

$$(P) \begin{cases} \max z = 4x_1 + 12x_2 + 3x_3 \\ \text{s.c.} \begin{array}{lll} x_1 & & \leq \text{1000} \rightarrow \text{950} \\ & x_2 & \leq \text{500} \rightarrow \text{550} \\ & & x_3 \leq \text{1500} \rightarrow \text{1575} \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 & \leq \text{6750} \rightarrow \text{6900} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array} \end{cases}$$

$$(D') \begin{cases} \min w = \text{950}y_1 + \text{550}y_2 + \text{1575}y_3 + \text{6900}y_4 \\ \text{s.c.} \begin{array}{lll} y_1 & & +3y_4 \geq 4 \\ & y_2 & +6y_4 \geq 12 \\ & & y_3 + 2y_4 \geq 3 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{array} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 4 \\ y_3 = 1/3 \\ y_4 = 4/3 \end{cases}$$

Seuls la fonction objectif du dual a changé => la solution en y qui était optimale pour (D) est admissible pour (D') (les contraintes de D et D' sont les mêmes)

Pour tester l'optimalité pour (D'), on ré-écrit les conditions d'écarts compl., on injecte y et on résout en x et on vérifie l'admissibilité de la solution trouvée en x pour (P) (s'il en existe une).

$$(I) \begin{cases} x_1 (y_1 + 3y_4 - 4) = 0 \\ x_2 (y_2 + 6y_4 - 12) = 0 \\ x_3 (y_3 + 2y_4 - 3) = 0 \\ y_1 (x_1 - \text{950}) = 0 \\ y_2 (x_2 - \text{550}) = 0 \\ y_3 (x_3 - \text{1575}) = 0 \\ y_4 (3x_1 + 6x_2 + 2x_3 - \text{6900}) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 4 \\ y_3 = 1/3 \\ y_4 = 4/3 \end{cases}$$

$$y_4 (3x_1 + 6x_2 + 2x_3 - 6900) = 0$$

Les 3 contraintes du dual sont saturées par la solution en y :

$$(I') \begin{cases} 0=0 & (4 \text{ fois}) \\ x_1 = 550 \\ x_2 = 550 \\ x_3 = 1575 \\ 3x_1 + 6 \times 550 + 2 \times 1575 = 6900 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 6900 - 6 \times 550 - 2 \times 1575 = 100 \\ x_2 = 550 \\ x_3 = 1575 \end{cases}$$

Les 3 contraintes de (P') et la non-négativité sont vérifiées par la sol. en x => on a la nouvelle solution optimale (pour P') en x et la solution en y est également optimale pour (D')

4. Finalement, les données initiales du PL étaient justes, mis à part le second membre de la quatrième contrainte. Les nouveaux seconds membres sont respectivement 1000, 500, 1500 et 9750. Montrer que la solution duale déterminée à la question 1 est admissible pour le dual de ce nouveau PL. En utilisant le théorème des écarts complémentaires, déterminer la solution du primale associée à cette solution duale. Cette solution primale est-elle admissible? Que pouvez-vous en conclure?

Les contraintes du nouveau dual sont inchangées => la solution en y est admissible pour le nouveau dual :

$$(D') \begin{cases} \min w = 1000y_1 + 500y_2 + 1500y_3 + 9750y_4 \\ \text{s.c.} \quad \begin{array}{lcl} y_1 & +3y_4 & \geq 4 \\ & y_2 & +6y_4 \geq 12 \\ & & y_3 +2y_4 \geq 3 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 & \geq 0 \end{array} \end{cases}$$

Nouvelles conditions d'écart compl. :

$$(I) \begin{cases} x_1 (y_1 + 3y_4 - 4) = 0 \\ x_2 (y_2 + 6y_4 - 12) = 0 \\ x_3 (y_3 + 2y_4 - 3) = 0 \\ y_1 (x_1 - 1000) = 0 \\ y_2 (x_2 - 500) = 0 \\ y_3 (x_3 - 1500) = 0 \\ y_4 (3x_1 + 6x_2 + 2x_3 - 9750) = 0 \end{cases} \xrightarrow[\text{on injecte } y = (0, 4, 1/3, 4/3)]{} \begin{cases} x_2 = 500 \\ x_3 = 1500 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 9750 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 500 \\ x_3 = 1500 \\ x_1 = 1100 \end{cases}$$

Or le problème primal actuel est :

$$(P'') \begin{cases} \max z = 4x_1 + 12x_2 + 3x_3 \\ \text{s.c.} \quad \begin{array}{lcl} x_1 & & \leq 1000 \\ & x_2 & \leq 500 \\ & & x_3 \leq 1500 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 & \leq & 6750 \quad 9750 \\ x_1, x_2, x_3 & \geq 0 \end{array} \end{cases} \rightarrow \text{non vérifiée}$$

En conclusion la solution trouvée en x n'étant pas admissible pour (P''), aucune des solutions n'est optimale (x n'est pas optimale pour P'' et y pas optimale pour D'').

Exercice 6

On considère le programme linéaire suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} \max Z = -2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 \\ \text{s.c.} \quad \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 \leq 7 \\ -x_1 - 2x_2 + 4x_3 \leq 12 \\ -x_1 - 4x_2 + 3x_3 + 8x_4 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \end{array} \right.$$

Au bout de deux itérations de l'algorithme du simplexe, on aboutit aux équations suivantes (e_1, e_2, e_3 sont les variables d'écart associées aux contraintes du problème) :

$$\left\{ \begin{array}{l} \max Z = 11 - 7/5 x_1 - 12/5 x_4 - 1/5 e_1 - 4/5 e_2 \\ \text{s.c.} \quad \begin{array}{l} 3/10 x_1 + x_2 + 4/5 x_4 + 2/5 e_1 + 1/10 e_2 = 4 \\ -1/10 x_1 + x_3 + 2/5 x_4 + 1/5 e_1 + 3/10 e_2 = 5 \\ 1/2 x_1 + 10 x_4 + e_1 - 1/2 e_2 + e_3 = 11 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, e_1, e_2, e_3 \geq 0 \end{array} \end{array} \right.$$

2. Donner la solution optimale de ce problème. Cette solution est-elle unique ?

variables de base : x_2, x_3, e_3

var. hb : x_1, x_4, e_1, e_2

Sol. de base : $x_1 = x_4 = e_1 = e_2 = 0$

$x_2 = 4, x_3 = 5, e_3 = 11$

valeur $z = 11$

La solution optimale est unique car tous les coûts réduits sont < 0