

Universidad de Antioquia

Caracterización Estructural y Dinámica de Cúmulos Estelares en la Galaxia

Carlos Bejarano

7 de mayo de 2026

Índice general

Resumen	III
1. Marco Teórico	1
1.1. Misión Gaia	1
1.2. Cúmulos Estelares	3
1.3. Corrección de la Distorsión Astrométrica en la Línea de la Visual	8
1.3.1. Proyección Gnomónica y Definición del Sistema Local	8
1.3.2. El modelo de King	9
1.3.3. Corrección de la Profundidad por Monte Carlo (<i>Rejection Sampling</i>)	9
1.3.4. Reconstrucción Astrométrica al Sistema de Referencia Global	10
2. Datos y Metodología	13
2.1. El Catálogo de Hunt y Reffert	13
2.1.1. Descripción de los datos	13
2.1.2. Criterios de Selección y Preprocesamiento	14
2.1.3. Parámetros disponibles	14
2.2. Tratamiento de Datos	15
2.2.1. Criterios de Selección y Limpieza de la Muestra	15
2.2.2. Sistemas de Referencia y Transformaciones	16
2.3. Procesamiento de Datos y Modelamiento	16
2.3.1. Análisis Radial de Propiedades Físicas y Cinemáticas	16
2.3.2. Análisis Fotométrico mediante Diagramas Color-Color y Color- Magnitud	17
2.3.3. Imputación de Masas Estelares mediante Cuadrículas Fotométricas	18
2.3.4. Reconstrucción de la Estructura Espacial Tridimensional	18
2.3.5. Corrección de la Distorsión Radial mediante Proyección Gnomónica y Muestreo de Monte Carlo	19
2.3.6. Análisis Estadístico de la Reconstrucción Espacial mediante Simulaciones de Monte Carlo	20

Resumen

Aquí va el resumen...

Capítulo 1

Marco Teórico

1.1. Misión Gaia

La misión Gaia, desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA), es un observatorio espacial de astrometría lanzado en diciembre de 2013 con el objetivo de cartografiar la Vía Láctea en tres dimensiones con una precisión sin precedentes. Su propósito fundamental es la construcción de un censo estereoscópico y cinemático de aproximadamente mil millones de estrellas, lo que corresponde a cerca del 1 % de la población estelar galáctica [Perryman, 2002]. Para ello, Gaia mide con muy alta precisión las posiciones ecuatoriales (α , δ), los paralajes ($\bar{\omega}$) y los movimientos propios (μ_α , μ_δ) de cada fuente, complementados con información fotométrica multibanda y, para un subconjunto de estrellas brillantes, velocidades radiales.

En comparación con su predecesora, la misión Hipparcos que catalogó del orden de 10^5 estrellas con una precisión significativamente menor, Gaia extiende su alcance a casi dos mil millones de fuentes, incrementando la exactitud astrométrica hasta en dos órdenes de magnitud [European Space Agency, 2013]. Este salto cualitativo permite no solo reconstruir la estructura tridimensional de la Galaxia, sino también abordar problemas fundamentales relacionados con su formación, evolución dinámica y la distribución de la materia oscura.

Gaia ha aportado uno de los conjuntos de datos astronómicos más completos y homogéneos disponibles en la actualidad. En la segunda publicación de datos (*Gaia Data Release 2*, DR2), se incluyeron aproximadamente 1.7 mil millones de fuentes con fotometría en la banda G , de las cuales alrededor de 1.3 mil millones cuentan con medidas de paralaje y movimiento propio [Gaia Collaboration et al., 2018]. Adicionalmente, se proporcionó fotometría en las bandas G_{BP} y G_{RP} para cerca de 1.4 mil millones de estrellas, así como velocidades radiales para unos 7 millones de objetos brillantes [Gaia Collaboration et al., 2018]. Para una fracción significativa de estas fuentes, se derivaron parámetros físicos estelares como temperaturas efectivas, extinción interestelar y radios a partir de espectros de baja

resolución.

Las versiones posteriores de los datos (EDR3 y DR3, publicadas entre 2020 y 2022) han refinado sustancialmente la precisión de estas mediciones y han incorporado nuevas clases de objetos, incluyendo estrellas variables, asteroides y fuentes extragalácticas, gracias a un mayor intervalo temporal de observaciones.

La alta precisión astrométrica y fotométrica de Gaia resulta particularmente valiosa para el estudio de cúmulos estelares. Las estrellas miembros de un cúmulo abierto comparten propiedades cinemáticas similares, como paralajes y movimientos propios coherentes, además de definir secuencias bien delimitadas en el diagrama color-magnitud [Castro-Ginard et al., 2019]. En consecuencia, los cúmulos pueden identificarse como sobredensidades en espacios de parámetros multidimensionales, típicamente definidos por la posición en el cielo, el paralaje y el movimiento propio. Diversos estudios han demostrado la eficacia de algoritmos de agrupamiento no supervisado, como DBSCAN, para la detección automática de cúmulos en los catálogos de Gaia [Castro-Ginard et al., 2019].

Por ejemplo, Castro-Ginard et al. (2019) aplicaron técnicas de detección basadas en aprendizaje automático a los datos de Gaia DR2 y descubrieron decenas de cúmulos abiertos previamente desconocidos en la región del anticentro galáctico, incrementando significativamente el censo conocido en esa zona [Castro-Ginard et al., 2019]. De manera similar, Cantat-Gaudin et al. (2018) construyeron un catálogo homogéneo de más de mil cúmulos abiertos confirmados a partir de Gaia DR2 [Cantat-Gaudin et al., 2018]. Y con el nuevo lanzamiento de Gaia DR3, Hunt y Reffert (2023) mejoraron el censo de cúmulos abiertos en la Vía Láctea reconociendo 7167 de estos objetos [Hunt and Reffert, 2023]. En conjunto, estos trabajos evidencian que Gaia ha revolucionado la detección, confirmación y caracterización de cúmulos estelares, permitiendo estudiar su distribución espacial, edades, cinemática interna y procesos evolutivos con un gran nivel de detalle [Castro-Ginard et al., 2019].

La determinación de distancias estelares en Gaia se basa fundamentalmente en la medición del paralaje trigonométrico. En su forma más simple, la distancia d (parsecs) se relaciona con el paralaje $\bar{\omega}$ (arcseg) mediante la expresión $d \approx 1/\bar{\omega}$. No obstante, debido a las incertidumbres observacionales, esta aproximación resulta inadecuada cuando los errores relativos del paralaje son significativos o cuando se obtienen valores de paralaje pequeños o incluso negativos.

En este contexto, Luri et al. (2018) subrayan la necesidad de emplear enfoques estadísticos, particularmente métodos bayesianos, para inferir distancias fiables a partir de los datos de Gaia [Luri et al., 2018]. Estos métodos combinan la información observacional con distribuciones previas basadas en modelos astrofísicos de la distribución estelar en la Galaxia, permitiendo explotar de manera óptima incluso mediciones con grandes incertidumbres. Un ejemplo destacado es el catálogo de distancias bayesianas publicado por Bailer-Jones et al. (2018) [Bailer-Jones et al., 2018], ampliamente utilizado en estudios

galácticos y extragalácticos.

La precisión alcanzada por Gaia es excepcional. Para estrellas brillantes ($G < 15$), los errores típicos en posición son del orden de decenas de microsegundos de arco [European Space Agency, 2013], lo que se traduce en errores relativos en distancia extremadamente pequeños para objetos cercanos. Incluso para estrellas situadas a distancias de varios kiloparsecs, las incertidumbres en paralaje permiten estimaciones de distancia con precisiones del orden del 10-20 % [European Space Agency, 2013]. Estas cifras superan ampliamente las capacidades de misiones anteriores, como Hipparcos, cuyas precisiones se limitaban al nivel de milisegundos de arco. Gracias a esta exactitud, Gaia proporciona distancias muy precisas para numerosos cúmulos estelares galácticos, obtenidas a partir del paralaje medio de sus miembros. Esto permite restringir de forma robusta parámetros fundamentales como la edad, la masa y la estructura interna de los cúmulos.

1.2. Cúmulos Estelares

Estos son grupos gravitacionalmente ligados de decenas a miles de estrellas nacidas simultáneamente de la misma nube molecular. Existen cúmulos abiertos que se caracterizan por ser jóvenes de baja masa y se encuentran en el disco galáctico, y cúmulos globulares que son cúmulos antiguos, masivos y se encuentran en el halo. Su estudio aborda la identificación de miembros, propiedades físicas comunes y la dinámica interna.

Para determinar qué estrellas pertenecen al cúmulo y cuáles al campo de la Galaxia clásicamente se usan métodos paramétricos: se ajustan distribuciones de velocidad y posición p. ej. mezcla de gaussianas para asignar probabilidades de membresía (el método de Sanders 1971 [Sanders, 1971] es un ejemplo histórico). Con los datos modernos de Gaia se emplean cada vez más algoritmos no paramétricos y de aprendizaje automático. Un método ampliamente usado es UPMASK, que combina clustering por k-medias con pruebas de significancia en el espacio multivariado (posición, paralaje, movimiento propio) [Elsanhoury et al., 2026]. Por ejemplo, Cantat-Gaudin et al. (2018) aplicaron UPMASK a los datos de Gaia DR2 para miles de cúmulos conocidos [Cantat-Gaudin et al., 2018]. UPMASK demuestra alta pureza y completitud al separar estadísticamente las estrellas reales del cúmulo del fondo estelar [Elsanhoury et al., 2026][Cantat-Gaudin et al., 2018]. Otros enfoques modernos incluyen métodos bayesianos, p. ej. análisis bayesiano de campo estelar, y algoritmos de agrupamiento como DBSCAN. En síntesis, la combinación de astrometría (coordenadas y movimientos propios) y fotometría en el espacio de fase permite identificar con robustez los miembros reales del cúmulo en presencia de contaminación de campo [Elsanhoury et al., 2026] [Cantat-Gaudin et al., 2018].

Por otra parte, los cúmulos estelares comparten propiedades físicas medibles: masa total, radios característicos, densidad estelar, edad y metalicidad. La masa total suele estimarse sumando las masas individuales de estrellas miembros (usando modelos M/L),

o bien dinámicamente mediante el teorema del virial. Según este último, un cúmulo en equilibrio obedece $2T + \Omega = 0$, donde T y Ω son energía cinética y potencial, lo que lleva a una relación aproximada $M \sim \sigma^2 R / G$, donde σ es la dispersión de velocidad y R es el radio característico [Elsanhoury et al., 2026]. Por ejemplo, Elsanhoury et al. (2026) usan dispersiones propias y radiales para derivar masas totales de cúmulos abiertos, encontrando desde unos $5 \times 10^2 M_\odot$ hasta $\sim 3 \times 10^3 M_\odot$ en sus sistemas estudiados [Elsanhoury et al., 2026].

La densidad interna y distribución radial se modelan con perfiles teóricos p. ej. modelos de King o Plummer que ajustan el brillo superficial observado. El radio tidal o de Jacobi es la distancia de equilibrio con el campo galáctico, estimado por equilibrio gravitacional. Para un cúmulo de masa m orbitando a distancia R de una galaxia de masa M , la fórmula de Spitzer aproxima $r_t \approx R(m/3M)^{1/3}$ [Renaud, 2018]. Este radio indica hasta dónde domina la gravedad del cúmulo sobre las mareas galácticas. En la práctica, parámetros derivados de perfiles de brillo como los radios central, de medio perfil y tidal se extraen mediante ajuste de modelos isotrópicos de equilibrio.

El diagrama Hertzsprung-Russell (diagrama color-magnitud) es herramienta clave. Graficando magnitud absoluta versus color o temperatura, el cúmulo revela una secuencia principal común para todas sus estrellas integrantes, ya que estas nacieron casi a la vez, así como ramas evolutivas de gigantes jóvenes o viejas. Ajustando isócronas teóricas se determina la edad y en ocasiones metalicidad del cúmulo. El ajuste puede realizarse mediante técnicas bayesianas o MCMC tal como en Elsanhoury et al. (2026), donde usando Gaia DR3 y UPMASK para limpieza, obtuvieron edades entre $\log \tau = 7,0 - 8,15$ para cúmulos jóvenes [Elsanhoury et al., 2026]. Por otra parte, comprendiendo qué parte de los diagramas color-color de un cúmulo corresponde a su respectivo diagrama color-magnitud, se facilita la caracterización de la composición estelar de los cúmulos ya que los diagramas color-color no dependen de la distancia como sí lo hacen los diagramas color-magnitud.

Los cúmulos se forman en nubes moleculares gigantes. Los cúmulos embebidos (recién nacidos dentro de gas y polvo) son abundantes, sin embargo, tras algunas decenas de Myr muchos se disgregan (el gas es expulsado por retroalimentación masiva). Estudios como Lada & Lada (2003) muestran que la mayoría de las estrellas nacen en agrupamientos embebidos, pero pocos sobreviven como cúmulos abiertos maduros [Lada and Lada, 2003]. El efecto de marea como supernovas o viento estelar y la rotación diferencial galáctica determinan la vida útil. Un cúmulo inicialmente subvirial puede “rebotar” al expulsar gas; solo con una alta eficiencia de formación ($\gtrsim 50\%$) se mantiene ligado. De esta forma, la evolución temprana, hasta ~ 100 Myr, suele ser dinámicamente activa: los cúmulos jóvenes a menudo no están aún en equilibrio virial completo. Conforme envejecen, el cúmulo alcanza equipartición de energía y puede sufrir colapso del núcleo, expulsión lenta de estrellas, etc. [Spitzer, 1987][Heggie and Hut, 2003].

La función de luminosidad de un cúmulo describe el número de estrellas en función de

su brillo, típicamente se mide combinando fotometría profunda con corrección de miembros. Esta está directamente relacionada con la función de masa inicial (IMF). Históricamente, Salpeter (1955) propuso una IMF de ley de potencia $\xi(M) \propto M^{-\alpha}$ con $\alpha \approx 2,35$, es decir una pendiente $-2,35$ en la escala $\log N$ vs $\log M$ [Salpeter, 1955]. En cúmulos abiertos se suele observar una pendiente próxima a Salpeter en masas medias-altas. Por ejemplo, Elsanhoury et al. (2026) hallan pendientes de IMF $\sim -2,26$, muy similares a $-2,35$, en cúmulos jóvenes [Elsanhoury et al., 2026]. A bajas masas ($< 0,5 M_{\odot}$) la IMF se aplana (modelo de Kroupa 2001 [Kroupa, 2001] o Chabrier 2003 [Chabrier, 2003]). Estudios de cúmulos masivos revelan que, a pesar de distintas condiciones, la IMF parece casi universal (Kroupa 2002 [Kroupa, 2002]; Bastian et al. 2010 [Bastian et al., 2010]).

La función de luminosidad resulta de combinar la IMF con la función de masa-luminosidad dada por la evolución estelar y la edad. Es conveniente en cúmulos jóvenes, es decir, aún con mayoría de estrellas en secuencia principal, donde la transformación masa-brillo es monótona. Con estas funciones se infieren la masa total integrada y la población estelar. En trabajos recientes, se modela simultáneamente la IMF y la función de luminosidad usando datos fotométricos profundos y algoritmos bayesianos, para descartar estrellas de campo y estimar la pendiente α y la masa total [Elsanhoury et al., 2026][Cantat-Gaudin et al., 2018].

Ahora, para las condiciones dinámicas internas y equilibrio, Desde el punto de vista dinámico, un cúmulo puede aproximarse como un sistema auto-gravitante que busca un estado de equilibrio dinámico. Para cúmulos antiguos, p. ej. globulares, se asume a menudo un equilibrio virial, donde la energía cinética neta es la mitad en magnitud de la energía potencial (Teorema del virial). En dicho caso el cúmulo es isotrópico y estacionario. En cambio, cúmulos jóvenes o que estén disgregándose pueden estar fuera de equilibrio; su virialización depende de factores como la expulsión de gas, colisiones y perturbaciones externas.

El tiempo de relajación t_{relax} es el lapso en que las interacciones de dos cuerpos (colisiones gravitacionales débiles) redistribuyen la energía cinética interna. Aproximadamente $t_{\text{relax}} \sim (0,1N/\ln N)t_{\text{cross}}$, con N el número de estrellas y t_{cross} el tiempo de cruce. Si la edad del cúmulo supera t_{relax} , alcanza equipartición parcial y se dice que está relajado. En Elsanhoury et al. (2026) se encuentra que sólo los cúmulos más viejos del estudio, NGC 2301 y NGC 2384b habían relajado su población; los más jóvenes aún evolucionan dinámicamente [Elsanhoury et al., 2026]. Esto concuerda con la idea de que la mayoría de los cúmulos abiertos persisten pocos cientos de Myr antes de evaporarse hacia el campo galáctico.

Por otra parte, según la densidad, los cúmulos pueden ser colisionales (frecuentes interacciones de trayectorias estelares) o no colisionales. Los cúmulos globulares densos tienen t_{relax} más corto que la edad del universo, por lo que la dinámica colisional es esencial (core-collapse, procesos de Spitzer, etc.). Muchos cúmulos abiertos, al ser poco

masivos, son casi no colisionales en su halo. La frontera entre ambos regímenes se ilustra comparando t_{relax} con la edad: si $t_{\text{relax}} \ll \text{edad}$, el cúmulo tiende al equilibrio térmico, es colisional; si $t_{\text{relax}} \gg \text{edad}$, sigue más un flujo libre colisional, es no colisional. Esta distinción determina la validez de la aproximación de Boltzmann no colisional: en cúmulos con larga relajación, la ecuación de Boltzmann sin término de colisión (Jeans) describe bien el equilibrio medio; si no, hay que añadir términos de difusión de Boltzmann o simulaciones N-cuerpos completas (Heggie & Hut 2003) [Heggie and Hut, 2003].

Los cúmulos se caracterizan por radios típicos:

- **Radio central o core** (r_c): donde la densidad cae a la mitad del centro.
- **Radio de mitad de masa** (r_h): radio que encierra la mitad de la masa total.
- **Radio tidal** (r_t): límite externo impuesto por las mareas galácticas; en modelos de King (1962) aparece como radio donde la densidad proyectada alcanza cero. Matemáticamente, la aproximación clásica para órbita circular en potencial esférico da $r_t \simeq R(m/3M)^{1/3}$ [Spitzer, 1987]. Este radio tidal también llamado radio de Jacobi, define el volumen de influencia gravitacional del cúmulo. En la práctica, se ajustan modelos teóricos como King, Plummer, o modelos modernos “limepy” [Cheng and Jiang, 2023], a perfiles de brillo superficial para inferir estos radios y la concentración (cociente r_t/r_c).

En las observaciones, se utilizan perfiles de densidad o brillo radial: los modelos isotrópicos clásicos (King 1966) ajustan bien los cúmulos globulares, mostrando un núcleo plano y caída acentuada cerca de r_t . El modelo de Plummer (1911) es otro perfil simétrico con densidad $\rho(r) \propto (1 + (r/a)^2)^{-5/2}$, donde a es el radio característico, que no se trunca naturalmente, aunque puede aproximar regiones internas. Según Cheng & Jiang (2023), su familia de modelos “limepy” incorpora King y Plummer como casos especiales: el modelo de King surge restando una energía de corte al DF isotrópico [Cheng and Jiang, 2023], y el Plummer corresponde a un caso particular $g = 3,5$ con masa finita e extensión infinita [Cheng and Jiang, 2023]. Estas modelizaciones dinámicas permiten relacionar observaciones proyectadas con distribuciones de masa tridimensional.

La masa de un cúmulo se estima cinemáticamente midiendo la dispersión de velocidades de las estrellas, tanto radiales como tangenciales, y aplicando los esquemas anteriores (teorema del virial o ecuaciones de Jeans). En la forma más simple, es decir, asumiendo un cúmulo esférico o isotrópico, el teorema del virial da $M \approx \frac{5\sigma^2 r_h}{G}$ o similar, donde el factor de 5 depende del perfil. Alternativamente, integrando la ecuación de Jeans radial se obtiene la masa interior a r :

$$\frac{d(\rho\sigma_r^2)}{dr} + \frac{2\beta\rho\sigma_r^2}{r} = -\rho\frac{d\Phi}{dr}$$

donde $\rho(r)$ es la densidad estelar, σ_r la dispersión radial y β el parámetro de anisotropía. Al conocer $\sigma(r)$ y $\rho(r)$, se inferiría el potencial $\Phi(r)$ y por ende la masa. Sin embargo, sin β se suele asumir isotropía ($\beta = 0$). En la práctica se comparan perfiles de velocidad con modelos como King, Plummer u otros de distribución, que fijan masa total y M/L. Por ejemplo, Cantat-Gaudin et al. usaron UPMASK más isocronas para encontrar masa integrada y distribución de masa [Cantat-Gaudin et al., 2018], y Elsanhoury et al. obtuvieron masas totales directamente de tales ajustes MCMC de Gaia [Elsanhoury et al., 2026]. Los cúmulos más masivos o densos requieren explicar por qué su valor M/L dinámico puede exceder el de la población de estrellas visibles, esto puede ser por la presencia de enanas blancas, estrellas binarias, etc.

Una técnica actual es ajustar conjuntamente brillo superficial y perfil de dispersión de velocidad con modelos de DF (King/Michie o limepy). Cheng & Jiang (2023) aplicaron precisamente esta estrategia con limepy a 18 cúmulos globulares, determinando masa total, radio de mitad de masa y relaciones M/L que describen bien los datos [Cheng and Jiang, 2023]. La modelización detallada permite inferir también la anisotropía radial que es el exceso de órbitas radiales frente a tangenciales, parámetro importante para la estabilidad futura del cúmulo.

Para describir la estructura interna de cúmulos en equilibrio se usan modelos de distribución de velocidades. Los modelos de King (1962) suponen una distribución de Maxwell con energía truncada: la función de distribución dependiente de la energía específica E toma la forma $f(E) \propto \exp(-E/\sigma^2)$ para $E < 0$ y $f = 0$ para $E > 0$, donde la energía cero corresponde a la energía en el radio tidal. Esto genera un perfil de densidad esférico con núcleo plano y corte abrupto en r_t . Como explican Cheng & Jiang (2023), el modelo de King se obtiene al restar sucesivas constantes del DF para truncar la distribución hasta energía cero [Cheng and Jiang, 2023]. En cambio, el modelo de Plummer (1911) es un caso de esfera isotrópica sin truncación; su densidad $\rho_P(r) = \frac{3M}{4\pi a^3} (1 + r^2/a^2)^{-5/2}$ se extiende infinitamente sin llegar a cero [Cheng and Jiang, 2023]. Cheng & Jiang señalan que la familia limepy generaliza ambos: el caso de Plummer (finita la masa pero sin corte) equivale a un parámetro de truncamiento $g = 3,5$ [Cheng and Jiang, 2023], mientras que $g = 1$ recupera el perfil de King isotrópico [Cheng and Jiang, 2023].

Estas soluciones estacionarias surgen de imponer la ecuación de Jeans en equilibrio. En su forma radial simplificada, la ecuación de Jeans liga el gradiente de la presión cinética ($\rho\sigma_r^2$) con la pendiente del potencial gravitatorio. Así, dado un perfil de densidad $\rho(r)$, la dispersión $\sigma(r)$ viene determinada por la masa interior. Los modelos mencionados son casos particulares de soluciones auto-consistentes de dicha ecuación bajo supuestos de isotropía o anisotropía. En la práctica se utiliza software de ajuste que, dado perfiles observados de brillo y dispersión, explora parámetros como la concentración, radio de anisotropía y masa total [Cheng and Jiang, 2023].

1.3. Corrección de la Distorsión Astrométrica en la Línea de la Visual

En el estudio cinemático y dinámico de cúmulos estelares utilizando datos astrométricos, como los dados por Gaia, existe una asimetría inherente en la precisión de las mediciones. Mientras que las coordenadas ecuatoriales transversales, ascensión recta (α) y declinación (δ), poseen precisiones del orden de microsegundos de arco, los paralajes (ϖ) exhiben errores relativos significativamente mayores, los cuales se propagan a las distancias fotogeométricas inferidas.

Al transformar estas coordenadas observacionales a un sistema cartesiano 3D heliocéntrico (X, Y, Z), la incertidumbre en la distancia se manifiesta como una elongación del cúmulo a lo largo de la línea de la visual. Este artefacto geométrico destruye la morfología esférica real del sistema estelar, impidiendo un análisis espacial y dinámico correcto. Para mitigar este efecto, se propone un método estadístico que asume simetría esférica en el cúmulo, dictada por un perfil de densidad de King, para redistribuir espacialmente las estrellas a lo largo de la línea de la visual conservando sus posiciones proyectadas en el cielo.

1.3.1. Proyección Gnomónica y Definición del Sistema Local

Para evitar las imprecisiones inherentes a la aproximación de ángulos pequeños en astrometría esférica, las coordenadas ecuatoriales (α, δ) de cada estrella se proyectan sobre un plano tangente a la esfera celeste en el centro del cúmulo (α_c, δ_c).

Se utilizan las ecuaciones de las coordenadas estándar (ξ, η), donde el denominador de proyección d está dado por:

$$d = \sin(\delta_c) \sin(\delta) + \cos(\delta_c) \cos(\delta) \cos(\alpha - \alpha_c)$$

Las coordenadas estándar en radianes se definen como:

$$\xi = \frac{\cos(\delta) \sin(\alpha - \alpha_c)}{d}$$

$$\eta = \frac{\cos(\delta_c) \sin(\delta) - \sin(\delta_c) \cos(\delta) \cos(\alpha - \alpha_c)}{d}$$

Multiplicando estas coordenadas angulares por la distancia heliocéntrica al centro del cúmulo (d_c) se obtienen las coordenadas cartesianas locales transversales (X, Y) en parsecs:

$$X = d_c \xi \quad Y = d_c \eta$$

En este sistema local de referencia, el centro del cúmulo se ubica en el origen (0, 0, 0)

y el radio proyectado de cualquier estrella es $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$.

1.3.2. El modelo de King

Los cúmulos estelares dinámicamente relajados se describen adecuadamente mediante los modelos isotérmicos truncados propuestos por Ivan King (1962). Físicamente, este modelo asume que el cúmulo posee un núcleo isotérmico de densidad constante y una envoltura que decrece hasta llegar a cero en el radio de marea (r_t), punto en el cual el campo gravitacional de la galaxia anfitriona domina sobre la autogravedad del cúmulo.

A partir del ajuste del perfil de densidad superficial:

$$\Sigma(R) = k \left(\frac{1}{[1 + (r/r_c)^2]^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{[1 + (r_t/r_c)^2]^{\frac{1}{2}}} \right)^2$$

a las coordenadas (X, Y) , se obtienen empíricamente el radio del núcleo (r_c), el radio de marea (r_t) y la constante de normalización k relacionada con la densidad central. Con estos parámetros, la densidad espacial volumétrica 3D, $\rho(r)$, se define como:

$$\rho(r) = \frac{k}{\pi r_c [1 + (r_t/r_c)^2]^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{w^2} \left[\frac{1}{w} \cos^{-1} w - (1 - w^2)^{\frac{1}{2}} \right]$$

donde r es la distancia espacial tridimensional de la estrella al centro del cúmulo ($r = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$), y w es un parámetro adimensional definido como:

$$w = \left[\frac{1 + (r/r_c)^2}{1 + (r_t/r_c)^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

1.3.3. Corrección de la Profundidad por Monte Carlo (*Rejection Sampling*)

Conociendo que la distribución radial tridimensional real del cúmulo obedece la función $\rho(r)$, pero la coordenada Z observacional está severamente contaminada por el error astrométrico, se procede a simular estadísticamente el valor de Z para cada estrella condicionándolo a su posición transversal conocida R .

Se emplea el algoritmo de *Rejection Sampling*, un método de Monte Carlo utilizado para generar observaciones a partir de una función de densidad de probabilidad arbitraria.

El procedimiento para cada estrella observada a un radio proyectado R es el siguiente:

1. **Definición del dominio:** La estrella debe estar confinada gravitacionalmente, por lo que su coordenada Z máxima posible está acotada por el radio de marea: $Z_{\max} = \sqrt{r_t^2 - R^2}$.

2. **Cota de probabilidad máxima:** Para un R fijo, la densidad volumétrica es máxima en el plano medio del cúmulo ($Z = 0$, equivalente a $r = R$). Se evalúa este máximo como $\rho_{\max} = \rho(R)$.
3. **Generación de candidatos:** Se muestrea un valor candidato $Z_{\text{cand}} \sim \mathcal{U}(-Z_{\max}, Z_{\max})$ a partir de una distribución uniforme. Simultáneamente, se muestrea una variable auxiliar $u \sim \mathcal{U}(0, \rho_{\max})$.
4. **Criterio de aceptación:** Se calcula el radio espacial tridimensional del candidato $r_{\text{cand}} = \sqrt{R^2 + Z_{\text{cand}}^2}$. El candidato Z_{cand} es aceptado como la verdadera coordenada en la línea de la visual si y solo si $u \leq \rho(r_{\text{cand}})$. En caso contrario, el candidato es rechazado y el ciclo se repite.

Este proceso garantiza que la nueva distribución espacial (X, Y, Z) sea tridimensionalmente consistente con el potencial gravitacional inferido del modelo de King, eliminando la dispersión artificial.

1.3.4. Reconstrucción Astrométrica al Sistema de Referencia Global

El paso final consiste en transformar el sistema cartesiano local, ahora físicamente coherente, de vuelta al sistema de coordenadas observables ecuatoriales. Esto se realiza mediante una transformación vectorial en el espacio euclidiano tridimensional.

Se definen los vectores base ortonormales del plano local en función de la posición central del cúmulo (α_c, δ_c) :

- Vector Este ($\hat{u}_x$): $(-\sin \alpha_c, \cos \alpha_c, 0)$
- Vector Norte ($\hat{u}_y$): $(-\sin \delta_c \cos \alpha_c, -\sin \delta_c \sin \alpha_c, \cos \delta_c)$
- Vector Radial ($\hat{u}_z$): $(\cos \delta_c \cos \alpha_c, \cos \delta_c \sin \alpha_c, \sin \delta_c)$

La posición cartesiana heliocéntrica global (X_g, Y_g, Z_g) de cada estrella se determina sumando su componente transversal proyectada a su nueva distancia radial total $(d_c + Z)$, multiplicadas por sus respectivos vectores direccionales:

$$\vec{r} = X\hat{u}_x + Y\hat{u}_y + (d_c + Z)\hat{u}_z$$

Finalmente, las nuevas coordenadas ecuatoriales observacionales y la distancia corregida se extraen aplicando las transformaciones esféricas inversas:

$$d_{\text{nuevo}} = |\vec{r}| = \sqrt{X_g^2 + Y_g^2 + Z_g^2}$$

$$\alpha_{\text{nuevo}} = \arctan\left(\frac{Y_g}{X_g}\right)$$

$$\delta_{\text{nuevo}} = \arcsin\left(\frac{Z_g}{d_{\text{nuevo}}}\right)$$

Como resultado, α_{nuevo} y δ_{nuevo} mantienen casi una correspondencia uno a uno con el catálogo, preservando la alta precisión angular de Gaia, mientras que d_{nuevo} refleja la verdadera estructura espacial compacta del cúmulo, depurada de la dispersión de la línea de la visual.

Capítulo 2

Datos y Metodología

2.1. El Catálogo de Hunt y Reffert

Este trabajo utiliza como base fundamental el catálogo de cúmulos estelares desarrollado por Hunt y Reffert, el cual es el resultado de un esfuerzo sistemático por actualizar y limpiar el censo de agrupaciones estelares en la Vía Láctea utilizando aprendizaje automático no supervisado. El catálogo final es el producto de una metodología desarrollada a lo largo de tres estudios consecutivos, evolucionando desde la selección de algoritmos de agrupamiento espacial, pasando por la implementación a nivel de todo el cielo, hasta la limpieza dinámica del censo basada en masas y radios de Jacobi.

2.1.1. Descripción de los datos

El censo se construye utilizando los datos astrométricos y fotométricos del tercer conjunto de datos de la misión Gaia (Gaia DR3). A diferencia de catálogos anteriores que operaban con el catálogo Gaia DR2 y cortes de magnitud muy restrictivos ($G \leq 18$), el catálogo definitivo de Hunt y Reffert procesa una base de aproximadamente 729.7 millones de fuentes estelares.

Los autores utilizan el espacio de cinco dimensiones (5D) proporcionado por la astrometría de Gaia para la búsqueda de cúmulos:

- **Posiciones espaciales:** Ascensión recta (α) y declinación (δ).
- **Cinemática:** Movimientos propios en ambas coordenadas espaciales ($\mu_{\alpha*}$, μ_{δ}).
- **Distancia:** Paralaje (ϖ).

Para evitar distorsiones esféricas e inhomogeneidades en la densidad de los datos, el cielo se divide utilizando la teselación HEALPix en diferentes niveles según la profundidad de la búsqueda, y los datos de las cinco dimensiones son re-escalados y centrados antes de aplicar los algoritmos de agrupamiento.

2.1.2. Criterios de Selección y Preprocesamiento

La metodología de selección de miembros y validación de cúmulos realizada por los autores se destaca por aplicar rigurosos filtros de calidad, tanto a nivel de estrellas individuales como a nivel de la agrupación candidata:

1. **Corte de calidad astrométrica:** En lugar de aplicar un corte estricto de magnitud, se utiliza una red neuronal indicadora de calidad astrométrica (específicamente la bandera de calidad v1 de Rybizki et al. con un valor $> 0,5$). Esto permite recuperar estrellas miembro más débiles de hasta magnitudes $G \sim 20$ que aún poseen astrometría confiable, aumentando drásticamente la relación señal-ruido de los cúmulos distantes.
2. **Algoritmo de agrupamiento:** El catálogo emplea el algoritmo HDBSCAN, seleccionado por su sensibilidad superior para detectar cúmulos en conjuntos de datos con densidades variables.
3. **Validación fotométrica:** Las agrupaciones detectadas son filtradas mediante Redes Neuronales Convolucionales Bayesianas entrenadas con isocronas PARSEC sintéticas, para confirmar que el Diagrama Color-Magnitud (CMD) de la agrupación es estadísticamente compatible con una población estelar simple y co-evolutiva.
4. **Criterio de ligadura gravitacional:** Para el catálogo final y “limpio”, los autores filtran grupos de movimiento no ligados (asociaciones) calculando la masa fotométrica total de cada agrupación y derivando su Superficie de Roche o Radio de Jacobi (r_J). Solo se retienen en la muestra de alta calidad aquellos cúmulos con una probabilidad mayor al 50 % de poseer un radio de Jacobi válido ($P(r_J) \geq 0,5$) y una masa mínima ligada de $40 M_{\odot}$. Esto redujo el censo drásticamente, garantizando que los objetos de estudio son auténticos cúmulos abiertos unidos gravitacionalmente.

2.1.3. Parámetros disponibles

El catálogo provee una parametrización exhaustiva que resulta ideal para el análisis dinámico y estructural, proporcionando las siguientes variables fundamentales para cada cúmulo:

- **Astrométricos y cinemáticos:** Posiciones medias, paralajes medios, y movimientos propios medios derivados de los miembros de alta probabilidad.
- **Parámetros Estructurales:** Radio que contiene el 50 % de los miembros (r_{50}), radios del núcleo (r_c), radios de marea aparentes (r_t), y radios de Jacobi (r_J).

- **Parámetros Físicos y Fotométricos:** Edad ($\log t$), extinción interestelar (A_V), extinción diferencial (ΔA_V) y módulo de distancia ($m - M$), todos inferidos utilizando técnicas de Inferencia Variacional.

2.2. Tratamiento de Datos

2.2.1. Criterios de Selección y Limpieza de la Muestra

El conjunto de datos inicial para este trabajo se obtuvo a partir del catálogo de Hunt y Reffert, el cual consta originalmente de 7167 cúmulos estelares y 1291929 estrellas miembro. Dado que los archivos originales de este catálogo se encuentran en formato FITS, se empleó la librería Astropy para la lectura y extracción inicial de las tablas.

El catálogo original clasifica las estructuras detectadas en diversas categorías mediante la columna **Type**, tales como Open Clusters (OC), Globular clusters (GC), Moving groups (MG), Too distant y Rejected. Mediante la aplicación de una máscara lógica sobre esta columna, la muestra de trabajo se restringió exclusivamente a los cúmulos abiertos (OC) y los cúmulos globulares (GC). Una vez aislados los tipos de cúmulos de interés, se identificaron sus respectivas estrellas miembro realizando un cruce de datos mediante la columna **Name**, presente tanto en la tabla de cúmulos como en la de miembros.

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de limpieza del catálogo de miembros para eliminar entradas duplicadas, utilizando la librería Pandas y tomando como identificador único la columna **GaiaDR3**. Para optimizar la manipulación de los datos en las fases posteriores y aprovechar las herramientas de análisis de Pandas, las tablas resultantes se exportaron a formato CSV. Durante esta conversión, fue necesario realizar un preprocesamiento de las cadenas de caracteres (strings) en las columnas **Name** y **Type**, las cuales se importaban inicialmente como objetos de bytes (`b'...'`); estos caracteres adicionales fueron suprimidos para garantizar la correcta interpretación de las etiquetas.

Con el objetivo de realizar los cálculos estructurales adecuados, se incorporaron a la base de datos las distancias fotométricas de Bailer-Jones, disponibles en el archivo de Gaia. Estas distancias, junto con sus respectivas incertezas, fueron extraídas mediante consultas ADQL utilizando el identificador de Gaia. La integración de esta información espacial geométrica al catálogo principal de miembros se realizó mediante una unión en Pandas usando la columna **GaiaDR3** en común, almacenando el resultado final nuevamente en formato CSV.

Para asegurar que el análisis de la dinámica interna de los sistemas contará con suficiente significancia estadística, se impuso un criterio de selección estricto, requiriendo un límite inferior de mil miembros por cúmulo. Este criterio inicial redujo la muestra a 114 cúmulos masivos. Finalmente, se realizó una inspección morfológica de estos sistemas, descartando 12 cúmulos que no presentaban una simetría esférica suficiente, condición

fundamental para el posterior ajuste de los modelos teóricos de densidad. De este modo, se consolidó una muestra final de 102 cúmulos estelares para el análisis.

2.2.2. Sistemas de Referencia y Transformaciones

Durante el desarrollo del flujo de trabajo, se conservaron en su mayoría las unidades físicas estándar empleadas en el catálogo original: grados (deg) para coordenadas espaciales, milisegundos de arco (mas) para paralajes, milisegundos de arco por año (mas/yr) para movimientos propios, magnitudes (mag) para fotometría, kilómetros por segundo (km/s) para velocidades cinemáticas, masas solares ($M_{\odot}$) y pársecs (pc) para distancias físicas. Como única excepción, y con el fin de garantizar la compatibilidad operativa con las funciones trigonométricas de la librería NumPy, las coordenadas angulares se convirtieron sistemáticamente de grados (deg) a radianes (rad).

El sistema de referencia base adoptado corresponde al Sistema Internacional de Referencia Celeste (ICRS) en la época J2016.0, provisto por el catálogo. Sin embargo, para el análisis de cada estructura individual, se definió un sistema de coordenadas relativo centrado en cada cúmulo. El origen temporal de este sistema local se hizo coincidir con el punto de mayor densidad del cúmulo, valor reportado previamente en el catálogo de Hunt y Reffert. Esta traslación del origen de coordenadas es de vital importancia, ya que facilita directamente el cálculo de las distancias radiales de cada estrella respecto al centro, paso indispensable para la construcción de los perfiles radiales de densidad.

2.3. Procesamiento de Datos y Modelamiento

2.3.1. Análisis Radial de Propiedades Físicas y Cinemáticas

Como paso preliminar para la exploración de las características físicas de los cúmulos estelares, se seleccionaron los sistemas con mayor población estelar dentro del conjunto de datos. Para cada cúmulo analizado, se estableció como centro de referencia el punto de mayor densidad estelar, cuyas coordenadas ecuatoriales de ascensión recta (α_c) y declinación (δ_c) fueron extraídas directamente del catálogo de Hunt y Reffert.

A partir de este centro geométrico, se determinó la separación angular (d) de cada estrella miembro del cúmulo respecto al núcleo utilizando métricas esféricas, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$d = 2 \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\delta - \delta_c}{2} \right) + \cos(\delta_c) \cos(\delta) \sin^2 \left(\frac{\alpha - \alpha_c}{2} \right)} \right)$$

donde α y δ corresponden a las coordenadas individuales de cada estrella. Una vez calculadas las distancias radiales de todos los miembros, el área espacial del cúmulo se dis-

cretizó mediante la construcción de anillos concéntricos desde el centro hasta la distancia angular máxima observada.

Para estimar el perfil de densidad de número estelar, se contabilizó la cantidad de estrellas presentes en cada intervalo radial. La densidad superficial por anillo se calculó dividiendo este conteo poblacional sobre el área geométrica del anillo correspondiente, dada por $A = \pi (r_{\text{ext}}^2 - r_{\text{int}}^2)$, donde r_{ext} y r_{int} denotan el radio exterior e interior de cada intervalo, respectivamente. Los valores de densidad resultantes se asignaron al radio medio de cada anillo para su posterior representación gráfica.

De manera análoga al cálculo del perfil de densidad, se determinó el comportamiento espacial de otras propiedades astrofísicas y cinemáticas del sistema a partir de los datos astrométricos y fotométricos de la tercera publicación de datos de la misión Gaia. Tras categorizar a cada estrella dentro de su anillo correspondiente, se calculó para cada subdivisión radial el valor medio del índice de color, la velocidad radial observada, el movimiento propio en declinación (μ_δ) y el movimiento propio en ascensión recta ($\mu_{\alpha*} = \mu_\alpha \cos \delta$). Este proceso de agrupamiento espacial permitió obtener perfiles radiales promediados, facilitando la caracterización de los gradientes dinámicos y fotométricos desde el centro hacia las regiones externas del cúmulo.

2.3.2. Análisis Fotométrico mediante Diagramas Color-Color y Color- Magnitud

Para la caracterización fotométrica de las poblaciones estelares, se construyeron diagramas color-color (CC) y diagramas color-magnitud (CMD) utilizando la fotometría de la misión Gaia. Específicamente, se emplearon las magnitudes en las bandas G , G_{BP} y G_{RP} , junto con los índices de color derivados ($BP - G$, $G - RP$ y $BP - RP$). La implementación del diagrama CC se justificó por su independencia intrínseca respecto a la distancia del cúmulo, proporcionando una herramienta analítica robusta que no requiere la conversión previa a magnitudes absolutas.

La metodología consistió en una segmentación topológica del diagrama CC, aislando regiones morfológicas distintivas de la distribución estelar. Una vez aisladas, las poblaciones correspondientes a cada subregión fueron proyectadas espacialmente sobre el diagrama CMD del mismo cúmulo. Este mapeo fotométrico cruzado se ejecutó con el propósito de establecer la correspondencia entre las agrupaciones empíricas del diagrama CC y las etapas evolutivas estelares observables en el CMD.

Para profundizar en la caracterización física de estas secuencias, se integraron las estimaciones de masa estelar provenientes del catálogo de Hunt y Reffert. Este análisis de masas se aplicó de manera detallada sobre el cúmulo abierto NGC 6791, seleccionado como caso de estudio por su alta completitud de datos de masa. Se mapeó la distribución de masas de sus miembros simultáneamente en los diagramas CC y CMD, lo que permitió

correlacionar empíricamente la posición fotométrica de las estrellas con su masa estelar y validar la segregación de las distintas poblaciones evolutivas del sistema.

2.3.3. Imputación de Masas Estelares mediante Cuadrículas Fotométricas

Con el fin de solventar la incompletitud en los datos de masa estelar provenientes del catálogo original, se implementó un método estadístico de imputación basado en el espacio fotométrico de los cúmulos. Como paso de validación preliminar, se contrastó la distribución espacial de la población con masas conocidas frente a la población sin asignación de masa en el diagrama color-color. Esta superposición permitió confirmar que ambos subconjuntos poblacionales ocupaban regiones análogas dentro del dominio fotométrico, justificando así la viabilidad de la estimación.

El procedimiento consistió en la construcción de una cuadrícula bidimensional sobre el espacio definido por los índices de color $BP - G$ y $G - RP$. El dominio se discretizó en 40 intervalos, configurando una resolución espacial que permitiera un equilibrio óptimo entre el nivel de detalle fotométrico y la significancia estadística. Para cada celda de la cuadrícula, se calculó la mediana de las masas utilizando exclusivamente la submuestra de estrellas con valores reportados en el catálogo.

Posteriormente, cada estrella carente de datos de masa fue proyectada sobre esta misma cuadrícula. A cada una de estas estrellas se le asignó el valor de la mediana correspondiente a su respectiva celda fotométrica. En los casos donde una estrella sin registro de masa se ubicó en un bin carente de ejemplares con masa conocida para el cálculo de la mediana, dicha entrada fue descartada del análisis. Se determinó que las estrellas excluidas bajo este criterio representaban menos del 1% de los cúmulos, garantizando que su remoción no afectara la representatividad de la muestra. Para las estrellas situadas en los límites extremos del dominio, se realizó una asignación al bin de frontera más cercano. Este procedimiento permitió generar un registro poblacional completo y robusto para el análisis dinámico posterior.

2.3.4. Reconstrucción de la Estructura Espacial Tridimensional

Con el propósito de caracterizar la morfología espacial de los sistemas estelares, se analizó la estructura tridimensional de los cúmulos más poblados, estableciendo como criterio de selección aquellos con un censo superior a los mil miembros confirmados. Para llevar a cabo esta reconstrucción, se transformaron las coordenadas esféricas observacionales de cada estrella a un sistema de coordenadas cartesianas heliocéntricas. Esta conversión espacial se ejecutó utilizando la ascensión recta (α), la declinación (δ) y las distancias geométricas (d) estimadas por Bailer-Jones et al. (2021) para el catálogo Gaia EDR3/DR3, mediante las siguientes relaciones geométricas:

$$X = d \cos \delta \cos \alpha$$

$$Y = d \cos \delta \sin \alpha$$

$$Z = d \sin \delta$$

Una vez obtenidas las posiciones cartesianas, se generaron proyecciones bidimensionales sobre los planos XY y XZ para inspeccionar la arquitectura espacial de los cúmulos. Durante este proceso de visualización, se identificó una distorsión sistemática en la dirección de la línea de la visual en todos los sistemas analizados. Esta elongación artificial, inherente a la reconstrucción cartesiana, se atribuyó a la propagación del error asociado a la determinación de la distancia fotométrica y su efecto en la transformación de coordenadas, lo cual constituye una limitación metodológica importante para la interpretación de la forma real de los cúmulos en el eje radial.

2.3.5. Corrección de la Distorsión Radial mediante Proyección Gnomónica y Muestreo de Monte Carlo

Para mitigar la elongación artificial a lo largo de la línea de la visual detectada en las reconstrucciones iniciales, se implementó un protocolo de corrección geométrica e imputación probabilística. Como caso de estudio inicial, se usó la muestra de los cúmulos con mayor significancia estadística (poblaciones superiores a mil miembros).

El primer paso consistió en desacoplar las coordenadas transversales de la coordenada radial mediante una proyección gnomónica centrada en las coordenadas del punto de mayor densidad del cúmulo (α_c, δ_c) . Esta transformación proyectó las posiciones estelares sobre un plano tangente bidimensional, produciendo coordenadas angulares locales (ξ, η) que fueron escaladas por la distancia central del sistema (d_0) para obtener las distancias físicas transversales $(X_{\text{local}}, Y_{\text{local}})$.

A partir de las posiciones proyectadas $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$, se modeló la distribución de densidad superficial. Para los cúmulos con poblaciones superiores a mil miembros, el dominio radial se discretizó en 30 intervalos, mientras que para el procesamiento automatizado para estos sistemas se empleó una resolución de 10 bins para asegurar la estabilidad estadística. Mediante rutinas de optimización no lineal, se ajustó un modelo de King a estos datos para derivar el radio del núcleo (r_c) , el radio de marea (r_t) y la constante de normalización (k) para cada cúmulo.

Una vez caracterizada la morfología bidimensional, se procedió a la reconstrucción de la tercera dimensión (Z_{sim}) . La profundidad de cada estrella fue imputada utilizando un algoritmo de muestreo de rechazo de Monte Carlo. La probabilidad de posición se definió en proporción a la densidad espacial de King, $\rho(\sqrt{R^2 + Z^2})$. Para la ejecución del

muestreo, se evaluaron coordenadas Z aleatorias dentro de los límites físicos del cúmulo. Como criterio de aceptación del algoritmo, se utilizó la densidad máxima local calculada para cada estrella individual, garantizando la convergencia del perfil dinámico simulado con las restricciones estructurales del modelo.

Finalmente, el conjunto de coordenadas locales $(X_{\text{local}}, Y_{\text{local}}, Z_{\text{sim}})$ fue transformado de vuelta a un sistema de coordenadas globales heliocéntricas. Este procedimiento permitió obtener un catálogo tridimensional depurado de la dispersión radial originada por los errores observacionales, facilitando una representación física más fiel de la estructura interna de los cúmulos.

2.3.6. Análisis Estadístico de la Reconstrucción Espacial mediante Simulaciones de Monte Carlo

Para validar la robustez y el comportamiento estadístico de las imputaciones radiales en la línea de la visual, se implementó un análisis detallado de las distribuciones de probabilidad marginales $P(Z)$ y condicionales $P(Z|R)$ resultantes del algoritmo de muestreo de rechazo. Con este fin, se seleccionó un subconjunto de control compuesto por cuatro sistemas: tres cúmulos dinámicamente estables y bien delimitados (King 11, NGC 1912 y NGC 6475), y un caso límite (NGC 2437) que presentaba miembros con distancias proyectadas superiores al radio de marea estimado ($R > r_t$).

Para asegurar la validez física del proceso, se aplicó un criterio de filtrado para estrellas anómalas: aquellas cuya posición proyectada excediera el límite gravitacional del sistema ($R > r_t$) fueron excluidas del análisis. Esta decisión metodológica se fundamentó en que, bajo las premisas del modelo de King, la probabilidad de encontrar un miembro más allá de dicho radio es nula, lo que anula la función de probabilidad y hace inviable la ejecución del muestreo de rechazo en tales registros.

El procedimiento de corrección y reconstrucción se sometió a un proceso iterativo de $m = 1000$ realizaciones para cada cúmulo. Este volumen de iteraciones se seleccionó bajo un criterio de convergencia estadística, garantizando que las distribuciones resultantes fueran estables y representativas de la incertidumbre intrínseca del modelo sin comprometer la eficiencia computacional del procesamiento. Tras aplicar la proyección gnomónica y calcular los parámetros estructurales (r_c, r_t, k) , se inicializó una matriz de dimensiones $N \times m$, donde N es el número de miembros, para almacenar las profundidades simuladas (Z_{sim}).

El análisis de esta matriz permitió extraer las propiedades estadísticas fundamentales de los sistemas. La distribución global de los valores almacenados representó la función de densidad de probabilidad total en la línea de la visual, $P(Z)$, mientras que cada fila individual capturó la distribución condicional $P(Z|R)$ para una estrella específica. Finalmente, se examinó la variación de la dispersión probabilística mediante el estudio de

estrellas de prueba ubicadas en distintas regiones radiales: el centro ($R \sim 0$), el radio del núcleo ($R \sim r_c$), la zona de transición intermedia y la frontera del radio de marea ($R \sim r_t$). Este muestreo estratificado documentó cómo la restricción física del modelo de King acota progresivamente la incertidumbre en la profundidad simulada conforme la posición estelar se aproxima al límite de marea.

Bibliografía

- [Bailer-Jones et al., 2018] Bailer-Jones, C. A., Rybizki, J., Fouesneau, M., Mantelet, G., and Andrae, R. (2018). Estimating distance from parallaxes. iv. distances to 1.33 billion stars in gaia data release 2. *The Astronomical Journal*, 156(2):58.
- [Bastian et al., 2010] Bastian, N., Covey, K. R., and Meyer, M. R. (2010). A universal stellar initial mass function? a critical look at variations. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 48:339–389.
- [Cantat-Gaudin et al., 2018] Cantat-Gaudin, T., Jordi, C., Vallenari, A., Bragaglia, A., Balaguer-Núñez, L., Soubiran, C., Bossini, D., Moitinho, A., Castro-Ginard, A., Krone-Martins, A., et al. (2018). A gaia dr2 view of the open cluster population in the milky way. *Astronomy & Astrophysics*, 618:A93.
- [Castro-Ginard et al., 2019] Castro-Ginard, A., Jordi, C., Luri, X., Cantat-Gaudin, T., and Balaguer-Núñez, L. (2019). Hunting for open clusters in gaia dr2: the galactic anticentre. *Astronomy & Astrophysics*, 627:A35.
- [Chabrier, 2003] Chabrier, G. (2003). Galactic stellar and substellar initial mass function1. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 115(809):763.
- [Cheng and Jiang, 2023] Cheng, C.-H. and Jiang, I.-G. (2023). Investigating dynamical properties of globular clusters through a family of lowered isothermal models. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 519:445–459.
- [Elsanhoury et al., 2026] Elsanhoury, W. H., Tademir, S., Çnar, D. C., Canbay, R., Haroon, A. A., and Ahmed, A. (2026). Exploring the Structure and Evolution of Four Young Open Clusters Near the Galactic Mid-plane via Gaia DR3. *arXiv e-prints*.
- [European Space Agency, 2013] European Space Agency (2013). Gaia factsheet. www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_factsheet. Consultado en 2026.
- [Gaia Collaboration et al., 2018] Gaia Collaboration, Brown, A. G. A., Vallenari, A., Prusti, T., de Bruijne, J. H. J., Babusiaux, C., Bailer-Jones, C. A. L., and *et al.* (2018).

- Gaia data release 2: Summary of the contents and survey properties. *Astronomy & Astrophysics*, 616:A1.
- [Heggie and Hut, 2003] Heggie, D. and Hut, P. (2003). Book review: The gravitational million-body problem: A multidisciplinary approach to star cluster dynamics. *Classical and Quantum Gravity*, 20(20):4504–4505.
- [Hunt and Reffert, 2023] Hunt, E. L. and Reffert, S. (2023). Improving the open cluster census-ii. an all-sky cluster catalogue with gaia dr3. *Astronomy & Astrophysics*, 673:A114.
- [Kroupa, 2001] Kroupa, P. (2001). On the variation of the initial mass function. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 322(2):231–246.
- [Kroupa, 2002] Kroupa, P. (2002). The initial mass function of stars: evidence for uniformity in variable systems. *Science*, 295(5552):82–91.
- [Lada and Lada, 2003] Lada, C. J. and Lada, E. A. (2003). Embedded Clusters in Molecular Clouds. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 41:57–115.
- [Luri et al., 2018] Luri, X., Brown, A. G. A., Sarro, L. M., Arenou, F., Bailer-Jones, C. A. L., Castro-Ginard, A., de Bruijne, J. H. J., and *et al.* (2018). Gaia data release 2: using gaia parallaxes. *Astronomy & Astrophysics*, 616:A9.
- [Perryman, 2002] Perryman, M. A. C. (2002). Gaia: An astrometric and photometric survey of our galaxy. *Astrophysics and Space Science*, 280:1–10.
- [Renaud, 2018] Renaud, F. (2018). Star clusters in evolving galaxies. *New Astronomy Reviews*, 81:1–38.
- [Salpeter, 1955] Salpeter, E. E. (1955). The luminosity function and stellar evolution. *Astrophysical Journal*, vol. 121, p. 161, 121:161.
- [Sanders, 1971] Sanders, W. (1971). An improved method for computing membership probabilities in open clusters. *Astronomy and Astrophysics*, Vol. 14, p. 226-232, 14:226–232.
- [Spitzer, 1987] Spitzer, L. (1987). *Dynamical Evolution of Globular Clusters*. Princeton University Press.