





*Jejum*  
Glicêmico  2D

Dieta verde

# Dieta verde

## Segunda-feira

- **Café da manhã:** Como de costume
- **Almoço:** Como de costume
- **Lanche:** Como de costume
- **Jantar:** Como de costume

## Terça-feira

- **Café da manhã:**  
2 ovos inteiros mexidos ou cozidos  
1 fatia grossa de queijo coalho **ou** 1 fatia fina de queijo curado  
1 colher de sopa de azeite ou manteiga (usar na frigideira)  
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:** Como de costume
- **Lanche:** Como de costume
- **Jantar:** Como de costume

## Quarta-feira

- **Café da manhã:**  
Omelete com 2 ovos + 1 colher de frango desfiado + 1 fatia fina de muçarela  
1 colher de sopa de azeite ou manteiga  
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:**  
150g de carne ou frango  
2 colheres de sopa de arroz + 2 colheres de sopa de feijão  
Salada à vontade  
Legumes ao forno à vontade
- **Lanche:** Como de costume
- **Jantar:** Como de costume

## Quinta-feira

- **Café da manhã:**  
2 ovos inteiros mexidos ou cozidos + 1 fatia de bacon  
1 colher de sopa de azeite ou manteiga  
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:**  
1 abobrinha recheada com 150g de patinho moído ou frango desfiado  
Queijo ralado para gratinar  
Salada à vontade
- **Lanche:** Pular o lanche
- **Jantar:** Como de costume

Acesse: Materiais complementares, Lista de substituições e muito mais...

# Dieta verde

## Sexta-feira

- **Café da manhã:**  
Pão de caneca + 1 fatia de queijo  
muçarela  
Montar um sanduíche  
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:**  
150g de frango assado ou lombo de  
porco  
Salada à vontade com molho de  
iogurte  
Legumes ao forno à vontade
- **Lanche:** Pular o lanche
- **Jantar:**  
200g de coxinhas de frango  
preparadas na airfryer

## Domingo

- **Café da manhã:**  
2 ovos inteiros mexidos ou cozidos +  
1 fatia de bacon  
1 colher de sopa de azeite ou  
manteiga  
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:**  
150g de carne ou frango  
Salada à vontade  
Legumes ao forno à vontade  
Suco de beterraba com limão e  
cúrcuma
- **Lanche:** Pular o lanche
- **Jantar:**  
Pizza de frigideira

## Sábado

- **Café da manhã:**  
Omelete com 2 ovos + 1 colher de  
frango desfiado + 2 fatias finas de  
muçarela  
1 colher de sopa de azeite ou  
manteiga  
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:**  
1 hambúrguer caseiro (150g)  
2 fatias de queijo por cima  
Salada à vontade
- **Lanche:** Pular o lanche
- **Jantar:**  
200g de enroladinho de frango com  
bacon

## **HIPOGLICEMIA (glicemia abaixo de 70 mg/dL)**

Geralmente a hipoglicemia ocorre quando a glicemia fica abaixo de 70 mg/dl, porém, quem tem glicemias muito altas e/ou está fazendo uso de insulina ou de medicações que podem causar hipoglicemia, pode ter sintomas de hipoglicemia mesmo com ela acima desse valor.

O importante é observar os sinais e corrigir a glicemia caso você identifique os sintomas.

### Sintomas mais comuns:

- Tremores
- Suor frio
- Palpitação
- Tontura ou fraqueza
- Visão embaçada
- Irritação ou confusão mental
- Dor de cabeça
- Sensação de desmaio

### **Por que é perigosa:**

A hipoglicemia pode evoluir rápido e, se não tratada, causar perda de consciência, convulsões e até coma. Ela é mais comum em pessoas que usam insulina ou medicamentos que forçam o pâncreas a liberar insulina (como sulfonilureias).

### **O que fazer ao perceber sintomas de hipoglicemia:**

1. Meça a glicemia imediatamente
2. Se estiver abaixo de 70 mg/dL, corrija com 1 colher de chá de açúcar dissolvida em 1/2 copo de água (100 mL)
3. Espere 15 a 30 minutos e meça novamente
4. Se a glicemia continuar baixa, repita o processo
5. Quando normalizar, faça uma refeição completa e equilibrada

# Guia Rápido



(Sintomas e seus perigos)

 **HIPERGLICEMIA** (glicemia acima de 140 mg/dL em jejum ou acima de 180 mg/dL pós-refeição)

 Sintomas mais comuns:

- Boca seca
- Sede excessiva
- Urina frequente
- Cansaço anormal
- Visão embaçada
- Dores de cabeça
- Fome fora de hora
- Irritação e dificuldade de concentração

## Por que é perigosa:

A glicemia alta, quando mantida por dias ou semanas, pode causar danos nos olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. Em casos graves e agudos, pode levar à cetoacidose diabética (quando o corpo entra em estado de emergência metabólica).

## O que fazer em caso de hiperglicemia:

- Verifique se há algum alimento ou refeição fora do planejado
- Beba água e mantenha-se hidratado
- Pratique uma caminhada leve (se a glicemia estiver abaixo de 250 mg/dL e sem cetoacidose)
- Não aumente a medicação sem orientação profissional

**Lembrete final:** Se você faz uso de insulina ou medicamentos orais, sempre tenha à mão um glicosímetro, algo para corrigir hipoglicemia (como açúcar, glicose em gel ou pastilhas) e mantenha sua família informada sobre como agir em uma emergência.

 Esse desafio foi planejado para você recuperar seu controle, e não para você correr riscos.  
**Aprender a reconhecer os sinais do corpo é o primeiro passo para uma nova relação com a sua saúde.**