

Jejum
Glicêmico 2D

Dieta vermelha

Dieta vermelha

Jejum
Glicêmico 2D

Segunda-feira

- **Café da manhã:** Como de costume
- **Almoço:** Como de costume
- **Lanche:** Como de costume
- **Jantar:** Como de costume

Terça-feira

- **Café da manhã:**
2 ovos inteiros mexidos ou cozidos
2 fatias grossas de queijo coalho **ou**
2 fatias finas de queijo curado
1 colher de sopa de azeite ou
manteiga (usar na frigideira)
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:** Como de costume
- **Lanche:** Como de costume
- **Jantar:** Como de costume

Quarta-feira

- **Café da manhã:**
Omelete com 2 ovos + 1 colher de
frango desfiado + 2 fatias finas de
muçarela
1 colher de sopa de azeite ou
manteiga
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:**
200g de carne ou frango
3 colheres de sopa de arroz + 3
colheres de sopa de feijão
Salada à vontade
Legumes ao forno à vontade
- **Lanche:** Como de costume
- **Jantar:** Como de costume

Quinta-feira

- **Café da manhã:**
2 ovos inteiros mexidos ou cozidos +
2 fatias de bacon
1 colher de sopa de azeite ou
manteiga
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:**
1 e ½ abobrinhas recheadas com
200g de patinho moído ou frango
desfiado
Queijo ralado para gratinar
Salada à vontade
- **Lanche:** Pular o lanche
- **Jantar:** Como de costume

Acesse: Materiais complementares, Lista de substituições e muito mais...

Dieta vermelha

Jejum
Glicêmico 2D

Sexta-feira

- **Café da manhã:**
Pão de caneca + 2 fatias de queijo muçarela
Montar um sanduíche
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:**
200g de frango assado ou lombo de porco
Salada à vontade com molho de iogurte
Legumes ao forno à vontade
- **Lanche:** Pular o lanche
- **Jantar:**
200g de coxinhas de frango preparadas na airfryer

Domingo

- **Café da manhã:**
2 ovos inteiros mexidos ou cozidos + 2 fatias de bacon
1 colher de sopa de azeite ou manteiga
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:**
200g de carne ou frango
Salada à vontade
Legumes ao forno à vontade
Suco de beterraba com limão e cúrcuma
- **Lanche:** Pular o lanche
- **Jantar:** Pizza de frigideira

Sábado

- **Café da manhã:**
Omelete com 2 ovos + 1 colher de frango desfiado + 2 fatias finas de muçarela
1 colher de sopa de azeite ou manteiga
Café preto ou chá sem açúcar
- **Almoço:**
2 hambúrgueres caseiros (100g cada)
2 fatias de queijo por cima
Salada à vontade
- **Lanche:** Pular o lanche
- **Jantar:**
200g de enroladinho de frango com bacon

Acesse: Materiais complementares, Lista de substituições e muito mais...

HIPOGLICEMIA (glicemia abaixo de 70 mg/dL)

Geralmente a hipoglicemia ocorre quando a glicemia fica abaixo de 70 mg/dl, porém, quem tem glicemias muito altas e/ou está fazendo uso de insulina ou de medicações que podem causar hipoglicemia, pode ter sintomas de hipoglicemia mesmo com ela acima desse valor.

O importante é observar os sinais e corrigir a glicemia caso você identifique os sintomas.

Sintomas mais comuns:

- Tremores
- Suor frio
- Palpitação
- Tontura ou fraqueza
- Visão embaçada
- Irritação ou confusão mental
- Dor de cabeça
- Sensação de desmaio

Por que é perigosa:

A hipoglicemia pode evoluir rápido e, se não tratada, causar perda de consciência, convulsões e até coma. Ela é mais comum em pessoas que usam insulina ou medicamentos que forçam o pâncreas a liberar insulina (como sulfonilureias).

O que fazer ao perceber sintomas de hipoglicemia:

1. Meça a glicemia imediatamente
2. Se estiver abaixo de 70 mg/dL, corrija com 1 colher de chá de açúcar dissolvida em 1/2 copo de água (100 mL)
3. Espere 15 a 30 minutos e meça novamente
4. Se a glicemia continuar baixa, repita o processo
5. Quando normalizar, faça uma refeição completa e equilibrada

Guia Rápido



(Sintomas e seus perigos)

 **HIPERGLICEMIA** (glicemia acima de 140 mg/dL em jejum ou acima de 180 mg/dL pós-refeição)

 Sintomas mais comuns:

- Boca seca
- Sede excessiva
- Urina frequente
- Cansaço anormal
- Visão embaçada
- Dores de cabeça
- Fome fora de hora
- Irritação e dificuldade de concentração

Por que é perigosa:

A glicemia alta, quando mantida por dias ou semanas, pode causar danos nos olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. Em casos graves e agudos, pode levar à cetoacidose diabética (quando o corpo entra em estado de emergência metabólica).

O que fazer em caso de hiperglicemia:

- Verifique se há algum alimento ou refeição fora do planejado
- Beba água e mantenha-se hidratado
- Pratique uma caminhada leve (se a glicemia estiver abaixo de 250 mg/dL e sem cetoacidose)
- Não aumente a medicação sem orientação profissional

Lembrete final: Se você faz uso de insulina ou medicamentos orais, sempre tenha à mão um glicosímetro, algo para corrigir hipoglicemia (como açúcar, glicose em gel ou pastilhas) e mantenha sua família informada sobre como agir em uma emergência.

-  Esse desafio foi planejado para você recuperar seu controle, e não para você correr riscos. **Aprender a reconhecer os sinais do corpo é o primeiro passo para uma nova relação com a sua saúde.**