# Rozpoznávanie obrazcov - 4. cvičenie Výber príznakov

Viktor Kocur viktor.kocur@fmph.uniba.sk

DAI FMFI UK

12.3.2019

### Shannonvá entrópia

$$H(Y) = -\sum_{y \in \omega} P(Y = y) \cdot log_2(P(Y = y))$$

X	Y
Matematika	Áno
História	Nie
Informatika	Áno
Matematika	Nie
Matematika	Nie
Informatika	Áno
História	Nie
Matematika	Áno

#### Shannonvá entrópia

$$H(Y) = -\sum_{y \in \omega} P(Y = y) \cdot log_2(P(Y = y))$$

X	Y
Matematika	Áno
História	Nie
Informatika	Áno
Matematika	Nie
Matematika	Nie
Informatika	Áno
História	Nie
Matematika	Áno

$$H(X) = 1.5$$

#### Shannonvá entrópia

$$H(Y) = -\sum_{y \in \omega} P(Y = y) \cdot log_2(P(Y = y))$$

X	Y
Matematika	Áno
História	Nie
Informatika	Áno
Matematika	Nie
Matematika	Nie
Informatika	Áno
História	Nie
Matematika	Áno

$$H(X) = 1.5$$

$$H(Y) = 1$$

# 

$$H(Y|X = v) = H(Y)$$
, len pre hodnoty Y, kde  $X = x$ 

X	Y
Matematika	Áno
História	Nie
Informatika	Áno
Matematika	Nie
Matematika	Nie
Informatika	Áno
História	Nie
Matematika	Áno

$$H(Y|X = v) = H(Y)$$
, len pre hodnoty  $Y$ , kde  $X = x$ 

X	Y
Matematika	Áno
História	Nie
Informatika	Áno
Matematika	Nie
Matematika	Nie
Informatika	Áno
História	Nie
Matematika	Áno

$$H(Y|X = M) = 1$$

$$H(Y|X = v) = H(Y)$$
, len pre hodnoty  $Y$ , kde  $X = x$ 

X	Y
Matematika	Áno
História	Nie
Informatika	Áno
Matematika	Nie
Matematika	Nie
Informatika	Áno
História	Nie
Matematika	Áno

■ 
$$H(Y|X = M) = 1$$
  
■  $H(Y|X = H) = 0$ 

$$H(Y|X=v)=H(Y)$$
, len pre hodnoty Y, kde  $X=x$ 

X	Y
Matematika	Áno
História	Nie
Informatika	Áno
Matematika	Nie
Matematika	Nie
Informatika	Áno
História	Nie
Matematika	Áno

$$H(Y|X = M) = 1$$

$$H(Y|X = H) = 0$$

$$H(Y|X=I)=0$$

#### Podmienená entrópia

$$H(Y|X) = \sum_{x \in \Omega_x} P(X = x) \cdot H(Y|X = x)$$

X	Y
Matematika	Áno
História	Nie
Informatika	Áno
Matematika	Nie
Matematika	Nie
Informatika	Áno
História	Nie
Matematika	Áno

#### Podmienená entrópia

$$H(Y|X) = \sum_{x \in \Omega_x} P(X = x) \cdot H(Y|X = x)$$

X	Y
Matematika	Áno
História	Nie
Informatika	Áno
Matematika	Nie
Matematika	Nie
Informatika	Áno
História	Nie
Matematika	Áno

$$H(Y|X) = 0.5$$

### Entrópia - Matlab

#### Načítanie dát

```
load census1994
Y = categorical(adultdata.salary);
X1 = categorical(adultdata.education);
```

### Úloha

Vytvorte funkciu entropia(X), ktorá vráti hodnotu ktorú sme definovali ako H(X).

#### countcats

countcats(X) - vráti početnosti jednotlivých kategórii z X (ak je X typu categorical)

### Entrópia - Matlab

### Úloha

Vytvorte funkciu podm\_entropia(Y, X), ktorá vráti hodnotu ktorú sme definovali ako H(Y|X).

### categories

 $\begin{array}{l} c = \mathsf{categories}(X) \text{ - vráti cell štruktúru c s jednolivými kategóriami } z \text{ X (ak je X typu categorical)}. Pozn.: z cell dostane kategóriu ako c{i} a použijeme pri indexácii logickou maticou (X == c{i}). \end{array}$