

1. የመድኃኒት አወሳሰድ እና መደበኛነት (Adherence)

ጥያቄ:- መድኃኒቱን መውሰድ በረሳሽ ምን ማድረግ ይኖርብኛል?

መልስ:- መድኃኒቱን መውሰድ እንደረሱ ካስታወሱ ወዲያውኑ ይውሰዱ። ነገር ግን ለሚቀጥለው የክፍለ ጊዜ አወሳሰድ ከ4 ሰዓት ያነሰ ጊዜ ከቀረፆት የረሱትን ትተው መደበኛውን ሰዓት ይጠብቁ። በጭራሽ ሁለት መጠን (double dose) በአንድ ላይ አይውሰዱ።

ጥያቄ:- መድኃኒቱን በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት መውሰድ ለምን አስፈለገ?

መልስ:- በደምዎ ውስጥ ያለው የመድኃኒት መጠን ሳይቀንስ ቫይረሱን ሁልጊዜ እንዲቆጣጠረው ለማድረግ ነው። ሰዓት ማዛባት ቫይረሱ መድኃኒቱን እንዲለምድ (Drug Resistance) ሊያደርግ ይችላል።

2. የመድኃኒት ለውጥ እና የጎንዮሽ ጉዳዮች (Regimen & Side Effects)

ጥያቄ:- መድኃኒቱ መጀመሪያ አካባቢ የሚያመጣቸው የጎንዮሽ ጉዳዮች ምንድን ናቸው?

መልስ:- አንዳንድ ታካሚዎች ማቅለሽለሽ፣ ራስ ምታት ወይም መጠነኛ መፍዘዝ ሊሰማቸው ይችላል። እነዚህ ምልክቶች አብዛኛውን ጊዜ ከ2 ሳምንት በኋላ ይጠፋሉ። ነገር ግን ከፍተኛ የቆዳ ሽፍታ ወይም የዓይን ቢጫ መሆን ካለ በአስቸኳይ ወደ ከሊኒክ ይሂዱ።

3. የቀጠሮ መከታተል (Appointments)

ጥያቄ:- የቀጠሮ ቀኔን ባልመጣ ምን ችግር አለው?

መልስ:- ቀጠሮ ማክበር መድኃኒትዎ እንዳያልቅብዎ እና የቫይረስ መጠንዎ (Viral Load) በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ለመከታተል ይረዳል። መድኃኒት ሳይወስዱ የሚቆዩባቸው ቀናት ቫይረሱ በሰውነትዎ ውስጥ እንዲባዛ ዕድል ይሰጡታል።

4. ተጓዳኝ ኢንፌክሽኖች (Opportunistic Infections)

ጥያቄ:- ከኤችአይቪ ጋር በተያያዘ የሚመጡ በሽታዎችን እንዴት መከላከል እችላለሁ?

መልስ:- ዋናው መከላከያ የኤአርቲ (ART) መድኃኒትን በአግባቡ መውሰድ ነው። በተጨማሪም የተቀቀለ ውሃ መጠጣት፣ የግል ንጽሕናን መጠበቅ እና በክሊኒኩ የሚታዘዙ እንደ ኮትሪሞክሳዛል (Cotrimoxazole) ያሉ መከላከያ መድኃኒቶችን መውሰድ ያስፈልጋል።

5. የኤአርቲ መድኃኒት እና የተመጣጠነ ምግብ

- ✓ ከምግብ ጋር መወሰድ ያለባቸው መድኃኒቶች:- እንደ ዶሎቴግራቪር (Dolutegravir) ያሉ መድኃኒቶች በሰውነት ውስጥ በደንብ እንዲሟሟሉ ከተመጣጠነ ምግብ ጋር መወሰድ አለባቸው።
- ✓ ምግብ ምርጫ:- እንደ አትክልት፣ ፍራፍሬ እና ፕሮቲን (ባቆላ፣ አተር፣ ስጋ) ማዘውተር የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅም ይጨምራል።
- ✓ መወገድ ያለባቸው:- መድኃኒት በሚወስዱበት ወቅት አልኮል መጠጣት የመድኃኒቱን ውጤታማነት ከመቀነሱም በላይ ለጉበት በሽታ ያጋልጣል።

6. ተጓዳኝ በሽታዎችን የመከላከያ መንገዶች

- ✓ ሳንባ ነቀርሳ (TB):- ኤችአይቪ ባለባቸው ሰዎች ላይ ሳንባ ነቀርሳ የመከሰት ዕድሉ ከፍተኛ ነው። የማያቋርጥ ሳል፣ ትኩሳት እና የሌሊት ላብ ካለብዎት በአስቸኳይ ምርመራ ያድርጉ።
- ✓ ንጹሕ ውሃ:- የአሜባ እና የሆድ ውስጥ ጥገኛ ትልን ለመከላከል ውሃን አፍልቶ መጠጣት ወይም በውሃ አጋር ማከም ያስፈልጋል።
- ✓ የንጽሕና አጠባበቅ:- ምግብ ከመመገብ በፊት እና ከመጸዳጃ ቤት መልስ እጅን በሳሙና መታጠብ ከብዙ ተላላፊ በሽታዎች ይጠብቃል።

7. የቫይረስ መጠን (Viral Load) ምርመራ ጥቅሞች

- ✓ የምርመራው ዓላማ፡- በደም ውስጥ ያለው የቫይረስ መጠን ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ ይረዳል። መጠኑ "ሊታወቅ የማይችል" (Undetectable) ደረጃ ላይ ሲደርስ ቫይረሱ ወደ ሌላ ሰው የመተላለፍ ዕድሉ በጣም ዝቅተኛ ይሆናል።
- ✓ የመድኃኒት ለውጥ፡- የቫይረስ መጠኑ ካልቀነስ፣ ሐኪሙ የመድኃኒቱን ዓይነት ሊቀይር ይችላል። ይህ የሚሆነው ቫይረሱ መድኃኒቱን ሲለምድ (Resistance) ነው።
- ✓ መደበኛ ክትትል፡- በየ6 ወሩ ወይም በየዓመቱ የቫይረስ መጠን ምርመራ ማድረግ ለጤንነትዎ ወሳኝ ነው።

8. ኤአርቲ ምንድን ነው?

መልስ፡ ኤአርቲ(Antiretroviral Therapy) የሚለው ሦስት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ የኤችአይቪ መድኃኒቶች ጥምረት ነው። ይህ ጥምረት በሰውነት ውስጥ ያለውን የቫይረስ መጠን (የቪራል ጭነት) በጣም ዝቅ ማድረግና የማከም ስርዓትን (ጤናቀማ) መጠበቅ ያስችለዋል።

9. ኤአርቲን ለመውሰድ ምን ያህል ጊዜ ይወስደኛል?

መልስ፡ ኤአርቲ ለህይወት ያለመቀረጥ መውሰድ አለበት። መድኃኒቱ ቫይረሱን ያሳንሳል ግን ሙሉ ለሙሉ አያጠፋውም። መድኃኒት ከቆረጡ በኋላ ቫይረሱ እንደገና ይበዛል እና ጤናዎ ሊበላሽ ይችላል።

10. መድኃኒቱን አንድ ቀን ከረሳሁ ምን ማድረግ አለብኝ?

መልስ፡ እስከ 12 ሰዓት ያህል ከተቆጠረው ጊዜ ቢዘገይ ወዲያውኑ ይውሰዱት። ከ12 ሰዓት በላይ ከሆነ ያንን ሰዓት ያለፈውን መድኃኒት አትውሱዱ፤ ቀጣዩን መድኃኒትዎን በተለመደው ጊዜዎ ይውሰዱ። በማንኛውም ሁኔታ ሁለት መድኃኒት በአንድ ጊዜ አይውሰዱ።

11. የጤና ቀን (አፖይንትመንት) ላይ ማይቀር የሚል ነገር ቢኖር ምን ማድረግ አለብኝ?

መልስ፡ በተቻለህ ፍጥነት ወደ ህክምና ማዕከልዎ ይግለጹ። አፖይንትመንትዎን እንደገና ለመወሰን ወይም በሌላ ቀን ለመምጣት ይቅረቡ። ሳይጠብቁ መድኃኒትዎ ከተጠናቀቀ በፊት አይቁሙ። በቅርብ የሚገኝ ሕክምና ማእከል ላይ መድኃኒትዎን ማግኘት ይችላሉ።

12. የመድኃኒት ጭብጥ (ሬጀሜን) ለምን ይቀየራል?

መልስ፡ የሚቀየረው በሶስት ዋና ምክንያቶች ነው፡

የጎንዮሽ ጉዳት (ሰይድ ኢፌክት(side effect)) ከፍ ያለ ከሆነ።

ከሌሎች ህመሞች (ለምሳሌ በረሮ(TB)) ህክምና ጋር ግጭት ካለ።

ቫይረሱ ለአንዳንድ መድኃኒቶች ተባባሪነት (የመድኃኒት መቋቋም) ከፈጠረ።

መጠን ባለማድረግ ሁኔታዎን ለማሻሻል የሚረዱ አዳዲስ መድኃኒቶች ስለሚመጡ ሊቀየር ይችላል። ይህ ልዩነት የእርስዎ ጤና ላይ ትኩረት እንዲደረግ የተደረገ ነው።

ደረጃ 2: የኤአርቲ መውሰዳ ህጎች እና ጤንነት ምክሮች

(Document 2: ART Adherence Rules and Health Tips)

ርዕስ፡ የኤአርቲ መውሰዳ ቁልፍ ህጎች (≥95% Adherence)

በትክክለኛው ጊዜ ይውሰዱ፡ በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት።

በትክክለኛው መጠን፡ የተገለጸውን የግጭት ብዛት ብቻ።

በትክክለኛው መንገድ፡ ከምግብ ወይም ባዶ ሆድ (እንደ አይነቱ)።

መድኃኒትዎን አትካፈሉ፡ ግጭታዎ እስከተጠናቀቀ ድረስ ሳይቋረጥ ይውሰዱ።

ለዘላቂ ጤና ምክሮች፡

ተጨማሪ ምግብ ይመገቡ፡ ትክክለኛ እና ሚዛናዊ ምግብ የጤና ስርዓትዎን ያጠናክራል።

የሚያስከትሉ መርኖችን ያርቁ፡ አልኮል፣ ሲጋሬት እና ያላጸዳ መርፌ (የግጭት መሳሪያ)።

አካላዊ እንቅስቃሴ ያድርጉ፡ በመተንፈስ ለሚደረግ እንቅስቃሴ እንኳን በቂ ነው።

የአዕምሮ ጤናዎን ይንከባከቡ፡ ውድቀት፣ ፍርሃት ወይም ተስፋ ማጣት ከተሰማችሁ ከባልደረባ ወይም ከሞካሪው ጋር በነጻ ይናገሩ።

የአካል ንጽህና ጠበቅ፡ ለመከላከል ጡትዎን ይታጠቡ፣ ምግብዎን በደንብ ይበስሉ።

ደረጃ 3፡ የጊዜ ሰሌዳ እና የአፖይንትመንት ማስታወሻ

(Document 3: ART Dosing Schedule and Appointment Tracker)

(ይህ ለመሙላት የተዘጋጀ ባዶ ሰንጠረዥ መልክ ይሆናል)

ሳምንታዊ የመድሃኒት መውሰዳችንን ሰንጠረዥ

ቀን	መድሃኒት ስም	መጠን	የመውሰጃ ጊዜ (ሰዓት)	✓ ከወሰድኩ
ሰኞ	_____	_____	_____	☐
ማክሰኞ	_____	_____	_____	☐
ረቡዕ	_____	_____	_____	☐
ሐሙስ	_____	_____	_____	☐
ዓርብ	_____	_____	_____	☐
ቅዳሜ	_____	_____	_____	☐
እሁድ	_____	_____	_____	☐

የጤና ቀናቴ (Appointment Dates)

የሚቀጥለው ቀን፡ ____/____/____

የቀጠለው ቀን፡ ____/____/____

ማስታወሻ፡ በጤና ቀንዎ ላይ የተጠራቀመ የሰውነት ፈሳሽ (Blood) መሰብሰብ እንደሚያስፈልግ አስታውሱ።

ደረጃ 4፡ የአደጋ ማደርጊያ ኢንፌክሽኖች (Opportunistic Infections - OIs)

(Document 4: Guide on Common Opportunistic Infections)

ርዕስ፡ ምን ማድረግ እንዳለብን እና መከላከል

ኤችአይቪ የማከም ስርዓትን (ጤናቀማ) የሚያዳከም ስለሆነ የሚከተሉት ኢንፌክሽኖች ሊከሰቱ ይችላሉ። መድሃኒትዎን በጥብቅ መውሰድ እነዚህን ያስቀርፋል!

1. በረሮ (TB)፡

ምልክቶች፡ ለሁለት ሳምንታት የሚቆየው ደረቅ የሳል ትካስ፣ ዕድል የሌለው የሰውነት ክብደት መቀነስ፣ ሌሊት ማዕበል።

ምን ማድረግ ያስፈልጋል፡ ወዲያውኑ ወደ ህክምና ማዕከል ይሂዱ። የበረሮ ህክምና ከኤአርቲ ጋር በአንድነት ሊሰጥ ይችላል።

2. የአፍ ወይም የምድጃ በሽታ (Oral Thrush)፡

ምልክቶች፡ በአፍ ውስጥ ነጭ ነጠብጣብ፣ መብላት ሲቃወም።

ምን ማድረግ ያስፈልጋል፡ ከሞካሪዎ ጋር ያነጋግሩ፤ ለማከም የሚረዱ ስርጭቶች አሉ።

3. በሽታ የሚከላከሉ መድሃኒቶች (Prophylaxis):

ኩትሪሞክሳዞል (Cotrimoxazole / SEPTTRIN) የተባለውን ፒል በየወሩ ለመከላከል ሊያዝዎት ይችላል። እሱንም በጥንቃቄ ይውሰዱት።

የእርስዎ የህክምና ቡድን ለማንኛውም አዲስ ምልክት እንዲያውቁ ማድረግ ያስፈልግዎታል!

ስለ ኤች. አይ. ቪ. እና ኤድስ በግልጽ እንወያይ

ኤች አይ ቪ ኤድስ፡ማለት ሕይወትን አሙኖ ደፊሽንሲ ሲንድሮም የሚባል የቫይረስ ስም ሲሆን፤ ኤድስ ኤች.አይ.ቪ. የሚያደርሰው የመጨረሻ ደረጃ ወይም የበሽታው ስም ነው። ኤች አይ ቪ በደሙ ውስጥ ያለበት ሰው ኤድስ በሽታ ደረጃ ላይ ለመድረስ ብዙ አመታት ሊወስድበት ይችላል። ይኸውም መዳኒቱንም ሳይጀምር የኤች.አይ.ቪ፣ ቫይረስ በደሙ እያለ ለብዙ አመት ሊቆይ ይችላል። አንድ ሰው የኤድስ በሽታ ደረጃ ላይ ደረሰ ማለት የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ የአካላችንን የተፈጥሮ የበሽታ መከላከያ ሃይል ተቁዋማትን ደምስሶ፣ ሰውነታችንን ከማንኛውም በሽታ የመቋቋም ሃይሉን በማዳከም፣ ለተለያዩ ኢንፈክሽኖች ይጋለጣል ማለት ነው። አንድ ሰው አንድ ወይም ሁለት ኢንፌክሽኖች ሲኖሩበት እና በጣም ዝቅ ያለ የቲ-ሴል ቁጥር(የአካላችን የተፈጥሮ የበሽታ መከላከያ) ሲኖረው ያሰው በኤድስ በሽታ ደረጃ ደረሰ ሊያስብለው ይችላል።

ኤችአይቪ (በእንግሊዘኛ ቋንቋ: Human Immunodeficiency Virus (HIV) ህይማን ኢምዩኖደፊሽንሲ ቫይረስ) በመባል የሚታውቅ ቫይረስ ነው። ኤችአይቪ ቫይረስ የሰውነትን የበሽታ መከላከያ ኃይል፣ በተለይ ነጭ የደም ሴሎችን (ህዋሳትን) በማጥቃት በቀላሉ ሰውነት ለበሽታ እንዲጋለጥ የሚያደርግ አደገኛ ቫይረስ ነው። ኤች.አይ.ቪ. ያለባቸው ሰዎች የበሽታው ምልክት ሳይታይባቸው ለብዙ አመታት መኖር እንደሚችሉ ከዚህ በላይ ተገልጿል። ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ እስከ አስር ዓመትና ከዚያም በላይ በመቆየት፣ ምንም አይነት የህመም ምልክት ሳይታይበት በመኖር፣ እና ይህንም ባለማውቅ በዚህ ሁኔታ ቫይረሱ በደሙ ያለበት ሰው ቫይረሱን ወደሌላ ሰው ሊያስተላለፍ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው።

በኤች አይ ቪ ሊያዝ (ሊጠቃ) የሚችለው ማን ነው ?

ኤችአይቪ (በእንግሊዘኛ ቋንቋ: Human Immunodeficiency Virus (HIV) ህይማን ኢምዩኖደፊሽንሲ ቫይረስ) በመባል የሚታውቅ ቫይረስ ነው። ኤችአይቪ ቫይረስ የሰውነትን የበሽታ መከላከያ ኃይል፣ በተለይ ነጭ የደም ሴሎችን (ህዋሳትን) በማጥቃት በቀላሉ ሰውነት ለበሽታ እንዲጋለጥ የሚያደርግ አደገኛ ቫይረስ ነው። ኤች.አይ.ቪ. ያለባቸው ሰዎች የበሽታው ምልክት ሳይታይባቸው ለብዙ አመታት መኖር እንደሚችሉ ከዚህ በላይ ተገልጿል። ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ እስከ አስር ዓመትና ከዚያም በላይ በመቆየት፣ ምንም አይነት የህመም ምልክት ሳይታይበት በመኖር፣ እና ይህንም ባለማውቅ በዚህ ሁኔታ ቫይረሱ በደሙ ያለበት ሰው ቫይረሱን ወደሌላ ሰው ሊያስተላለፍ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው።

በኤች አይ ቪ ሊያዝ (ሊጠቃ) የሚችለው ማን ነው ?

መልሱ ጥንቃቄ የጎደለው ማንኛውም ሰው ነው !

ኤድስ ማንንም ከማን ሳይለይ ጥንቃቄ የጎደለውን ሁሉ ሊጎዳ ይችላል ፡- ማለትም ሴቶችን ፣-ወንዶችን ፣ግብረ ሰዶማውያንን (ሆሞዎችን)፣ወጣቶችን ፣ አዋቂዎችን፣የሚወለዱ ጨቅላ ሕጻናትንም በአንድነት ሊያጠቃ ይችላል ፤ ማንኛውም ጥንቃቄ የጎደለው፣ኮንዶም አልባ የግብረ ሥጋ ግኑኝነት የሚፈፅም ሁሉ በቀላሉ በኤች .አይ .ቪ ቫይረስ ሊጠቃ ይችላል።

በኤች. አይ. ቪ. ቫይረስ እንዴት ልንያዝ እንችላለን ?

በኤች.አይ.ቪ. ቫይረስ የመያዝ አደጋ የሚደርሰው፣ በቫይረሱ በደሙ ያለበት ሰው የዘር ፈሳሽ ወደ ብልቶች ሲገባና፣ ወይም በቀጥታ በልዩ ልዩ ሁኔታዎች ደም ከደም ለመቀላቀል ሲችል ነው። የኤች.አይ.ቪ. መተላለፊያ መንገዶች፡-

ኤች.አይ.ቪ. ከማንም ሰው ጋር በምናደርጋቸው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ማለትም ለምሳሌ፣ እንደ እጅ መጨባበጥ፣ መተቃቅፍ፣ እና መሳሳም ሊያስተላልፉ እንደማይችሉና፣ በተጨማሪም ኤች አይቪ በመጸዳጃ ቤት መቀመጫ፣ በበር መክፈቻ፣ በመጠጫ ብርጭቆ ፣ በምግብ ወይም በማንኛውም አይነት ተመሳሳይ ነገሮች አይተላለፍም በአጠቃላይ በማህበራዊ ኑሮ ሊተላለፍ አይችልም። እንደ ቢንቢ ትንኝ ንክሻ በመሳሰሉት ምክንያትም ሊይዝ አይችልም። ቫይረሱ ከሰው ወደ ሰው እንጂ፡ ከሰው ወደ እንስሳ ወይ ከእንስሳ ወደ ሰው ሊተላለፍ አይችልም።

የሚተላለፈው በ3 ዋና ዋና መንገዶች ነው።

1. በወሲብ አማካኝነት ማለትም ያለ ኮንዶም በሚፈፀም ልቅ የሆነ የወሲብ(ግብረሰጋ) ግንኙነት።
2. በደም አማካኝነት- ለምሳሌ በስሪንጋ(መርፌ)
3. ከእናት ወደ ፅንሰ ይህ ደግሞ ፡- 1. በእርግዝና ወራት
3. በወሊድ (በሚወለድበት) ጊዜ
4. በጡት አማካኝነት ማለትም እናቱ ጡትዋን እምታጠባው ከሆነ ሊተላለፍ ይችላል።

ለኤድስ በሽታ መድኃኒት አለውን ?

በአሁኑ ጊዜ በኤችአይቪ ዙሪያ ላይ ብዙ መረጃዎችና እንክብካቤ የሚገኝበት ጊዜ ስለሆነ [የኤች.አይ.ቪ ቫይረስን አዳክሞና ተቆጣጥሮ አብሮ ለመኖር](#) ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት ኤች.አይ.ቪን እንደማንኛውም አይነት ቫይረስ ቆጥሮ ሕክምናን በመከታተል ጤናን እየጠበቁና መንፈስን ሳያስጨንቁ ፣ተረጋግቶ መኖር ይቻላል።

ኤችአይቪ እንዳይዘን የምንከላከልበት [ከትባት](#) በአሁኑ ሰዓት የለም። ኤችአይቪ ከያዘም በኋላ የሚፈውስ መድኃኒት የለም። ነገር ግን [ኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ጋር ተስማምቶ ለመኖር](#) ይቻላል። በአሁኑ ጊዜ [ፀረ-ኤችአይቪ መዳኒቶች](#) ከፈተኛውን አስታውጶ በማድረግ ላይ የገኛሉ። ኤችአይቪ ያለበት ሰው በትክክል የፀረ-የኤችአይቪ መዳኒቶቹን በመውሰድ እንደማንኛውም ሰው ሥራን አየሠራ ኒሮውን መምራት ይችላል። ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች መውለድ ሲፈልጉ ከጤና ባለሙያቸው ጋር በመነጋገር ተገቢውን የህክምና አገልግሎት በመቀበል ጤናኛ ልጅ መውለድ ይችላሉ። [ኤች.አይ.ቪ. ያለባት እናት](#) ከማርገዝባ በፊት ማወቅ የሚገባትን ቅድመ ዝግጅቶች ጠንቅቃ ማወቅና መፈጸም ይኖርባታል።

የኤች.አይ.ቪን መስፋፋት/መሰራጨት በጽኑ ስለመከታተል፡- መከላከል

- መታቀብ (ከማንኛውም አይነት የግብረ ሥጋ ግንኙነት መቆጠብ) አንድ -ለአንድ የሆነ ተማማኝ የትዳር ሾደኛ እስከሚያገኙ ድረስ በጥብቅ መጠንቀቅ ፣ "ያለኮንዶም፣ ዕምነት የለም "።
- ሁለት ኤች.አይ.ቪ. እንዳለባቸው ያወቁ ባለትዳሮች፣ ወይም አበረው ያሉ ጉዋድኞች፣ በግብረ-ሥጋ ግንኙነት ጊዜ ኮንዶም መጠቀም አለባቸው ፤ ምክንያቱም ከተለያዩ የአባላዘር በሽታዎች ለመከላከል እና በተለያዩ የኤች.አይ.ቪ .ንዑስ ዝርያዎች ደግሞ ላለመጋለጥ እንዲረዳ ነው።
- ከሁለት አንዳቸው ብቻ ከሆኑ ኤችአይቪ ያለበት ሁልጊዜ ኮንዶም መጠቀም እና ቅባት (Lubricant) ያለው ኮንዶም መጠቀም ግዴታ አለበት።
- ከአንድ ሰው በላይ ጋር የግብረ-ሥጋ ግንኙነት የሚፈጸሙ ከነበሩ ወይም ከሆኑ፣ የኤች.አይ.ቪ .ምርመራ ያድርጉ!
- ወንድ ከሆኑ እና ከወንድ ጋር የግብረ- ሰዶም ግንኙነት ፈፅመው ከሆነ ቢያንስ ቢያንስ በአመት አንዴ ይመርመሩ !
- ሴት ከሆኑ እና ለማርገዝ እቅድ ካሉዎት ወይም ካረገዙ በአስቸኳይ ይመርምሩ (ጤናኛ ልጅ መውለድ ያስችልዎታል)

- የግብረ-ሥጋ ግንኙነት ከመፈጸም በፊት ስለ ኤች.አይ.ቪ እና ስለ ተለያዩ የአባላዘር በሽታዎች ከወንድ/ከሴት ጋር በግልጽ መወያየት ልምድ ማረግ አለብን
- በደንብ ተጠናኩ፣ ተወያዩ፣ ስለ ሁለታችሁም ስለ አለፈው ወሲባዊ ሕይወት ታሪካችሁ ተነጋገሩ፣ ወይም በአደንዛዥ ዕጽ ትጠቀሙ ከነበረ ፣ ስለ መጠጥ፣ ጫት ወዘተ ተወያዩ፣
- ከዚህ በፊት የኤች.አይ.ቪ. ምርመራ አድርገው እንደሚያቁና እንደማያቁ መጠያየቅ !
- ምንም እንኳን የኤች.አይ.ቪ. እያዛለሁ ብለው ምንም ጥርጣሬ ባይኖሮትም፣ ሁልጊዜ ለጠቅላላ ምርመራ በሚሄዱበት ወቅት የኤች.አይ.ቪ. ምርመራ ቢያረጉ በጣም ጠቃሚ ነው !
- በአንድ ወቅት ምርመራ ከአኤች አይ ቪ ነፃ መሆን ማለት፣ ሁልጊዜም ነፃ አያደርግምና፣ ከተለያዩ ሰዎች ጋር የግረ-ሥጋ ግንኙነት ከዘወተሩ በየወቅቱ ይመርመሩ !

ስለኤች.አይ.ቪ. ምርመራ

እራስህን በርግጠኛ ለማወቅ፣ መልሱ የሚገኘው የኤች.አይ.ቪ .ምርመራን በማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ እራስዎን የሚጠራጠሩ ከሆነ ይመርመሩ።

ተመርምረው ውጤትው ከቫይረሱ ነፃ ስለ መሆንዎ ቢነገሮትም፣ "አንዳንድ" አጠራጣሪ ውጤት" የሚባል ሁኔታ (ዊንዶፕ ፔሬድ የሚባል) ስላለ፣ ከ 2-3 ወር በኋላ እርግጠኛ ለመሆን ደግመው መመርመር ይገባል። ይህን እስኪያደርጉ ግን አሁንም ኮንዶም መጠቀምን አይርሱ።

ውስጣዊ ስስ ብልቶች ምን ምን ናቸው?

አይን፣ ፊት፣ እና አፍንጫ ፤ ወዋጫ ጎሮሮ ፤ የሴት ብልት ፤ የወንድ ብልት ፤ ፊንጢጣ ወይም የዓይነት-ምድር መውጫ ናቸው ።

ከሴት ብልት የሚመነጭ ፈሳሽ ምንድን ነው?

የሴት ብልት (ቫጀና) ፡- ከሴት ብልት ውስጥ ተፈጥሯዊ የሆኑ ብዙ ፈሳሾች ይመነጫሉ። የፈሳሹ አይነት ነጭጭ ወይም ጥርት ያለ ሲሆን ተግባሩም የሴቷን ብልት ከተለያዩ ብክለቶች የሚከላከል ነው።

የፈሳሹ ዓይነት ከሴት፣ ሴት እና ከእድሜ ልዩነት የተነሳ ሊለያይ ይችላል።

ግብረ ሥጋ ግንኙነት በሚፈጠርበት ወቅት የፈሳሹ መጠን ይጨምራል ፣ይህም የሴቷን ብልት በማለሰለስ የወንዱ ብልት ወደ ሴቷ ብልት የሚገባበትን ሂደት ቀላል እና ምቹ ያደርገዋል ማለት ነው።

በወር አበባ ወቅት የሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ለምን የበለጠ አደገኛ ሆነ?

የ ኤች አይ ቪ ቫይረስ በሴቷ ብልት ውስጥ ባሉት ፈሳሾች እና በደሟ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ስለሚገኝ በሽታውን የማስተላለፍ ዕድሉ ዕጅግ በጣም የላቀና አደገኛ ነው።

በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት ኮንዶም ማጥለቅ ያስፈልጋል!!! በአጭሩ ከውጭ መጨረስ ብሎ ነገር አይሰራም!!!

ኤች. አይ .ቪ. ቫይረስ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት አዎ ይተላለፋል፣ ማለትም ወንዱ ወይም ሴቷ የዚህ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለ ከሆኑ ።

ኤች አይ ቪ ሊተላለፍባቸው የማይችሉ መንገዶች ፡-

- የኤች አይቪ ቫይረስ ከሰውነት ከወጣ በኋላ በጣም ደካማ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ አይቆይም ወድያውኑ ይሞታል።

በዚህ የተነሳ ነው ኤች.አይ.ቪ ከማንም ሰው ጋር በምናደርጋቸው የዕለት ተዕለት ንክኪዎች ለምሳሌ፣ እንደ እጅ መጨባበጥ፣ መተቃቅፍ፣ እና ጉንጭና ግንባርን መሳሳም አይስተላልፍም ። በተጨማሪም ኤች .አይ.ቪ. በመጸዳጃ ቤት መቀመጫ፣ በበር

መክፈቻ፣ በመጠጫ ብርጭቆ ፣ በምግብ ወይም በማንኛውም አይነት እንስሳ እንደ ቢንቢ ንክሻ በመሳሰሉት ሊተላለፍ አይችልም።

የኤችአይቪ መተላለፊያ ሁኔታዎች እንደሚከተለው ነው፡-

- ቫይረሱ ያለበት ሰው የተጠቀመበትን የህሽሽ (ሳሚም) መርፌ ሌላ ሰው ደግሞ ቢጠቀምበት (Intravenous) ቫይረሱ በቀጥታ ከደም ወደ ደም ሊተላለፍ ይችላል።
- ቫይረሱ ካለበት ማንኛውም ሰው (ወንድ ወይም ሴት) ጋር ያለኮንዶም የግብረ ሰዶም ግንኙነት (Homosexual, bisexual intercourse) በማድረግ በሽታው ሊያዝ /ሊተላለፍ ይችላል።
- ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር በሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት (Heterosexual intercourse)
- **ኤች** አይ ቪ ያለባት እናት ቫይረሱን (በእርግዝና ወራትና በወሊድ ጊዜ) ለሕፃንዋ ማስተላለፍ (Intrauterine, perinatal) ትችላለች።
- ቫይረሱ ያለባት እመጫት ጡት ወተት ካጠባች ቫይረሱ ሊተላለፍ ይችላል።

ለኤችአይቪ/ኤድስ መከላከያ ውጤታማ ስልቶች

የሰው ልጅ የበሽታ መከላከያ ቫይረስ (ኤችአይቪ) እና የተዳከመ የበሽታ መከላከል ሲንድረም (ኤድስ) በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የህዝብ ጤና ተግዳሮቶችን ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። በሕክምናው መስክ የተደረጉ መሻሻሎች ቢኖሩም እነዚህን በሽታዎች ለመከላከል በሚደረገው ትግል ውስጥ መከላከል ዋነኛው ነው። ይህ ጽሁፍ ኤችአይቪ/ኤድስን ለመከላከል ውጤታማ ስልቶችን በማዳበር የመተላለፍ አደጋን በእጅጉ የሚቀንሱ አሰራሮች ላይ ሰፊ ግንዛቤን ይሰጣል።

ኤችአይቪ እና ኤድስን መረዳት

የመከላከያ ስልቶችን ከመፈተሽ በፊት፣ በኤችአይቪ እና በኤድስ መከላከል ያለውን ልዩነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ኤችአይቪ ቫይረስን የሚያጠቃ ቫይረስ ነው። [የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት](#) በተለይም ለበሽታ መከላከያ ወሳኝ የሆኑት ሲዲ4 ህዋሶች (ቲ ሴሎች)። ህክምና ካልተደረገለት ኤችአይቪ ወደ ኤድስ ሊያመራ ይችላል፣ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን የመጨረሻ ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት እና ለአደጋ የተጋለጡ ኢንፌክሽኖች እና አንዳንድ ነቀርሳዎች ተጋላጭነት ይጨምራል።

የኤች አይ ቪ ስርጭትን መከላከል

ደህንነቱ የተጠበቀ የወሲብ ልምዶች

በጣም ውጤታማ ከሆኑ መንገዶች ውስጥ አንዱ [ኤችአይቪን መከላከል](#) ማስተላለፍ ደህንነቱ የተጠበቀ የግብረ ሥጋ ግንኙነትን በመለማመድ ነው። ይህ የሚያጠቃልለው፡-

- **ቋሚ እና ትክክለኛ የኮንዶም አጠቃቀም፡-** በሴት ብልት፣ በፊንጢጣ እና በአፍ በሚፈጸም የግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት ኮንዶም መጠቀም የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ተጋላጭነትን በእጅጉ ይቀንሳል። ወንድ እና ሴት ኮንዶም በቫይረሱ ላይ ውጤታማ መከላከያዎች ናቸው።
- **የወሲብ አጋሮችን ቁጥር መቀነስ፡-** የጾታ አጋሮችን ቁጥር መገደብ ከኤችአይቪ ፖዘቲቭ ሰው ጋር የመገናኘት እድልን ይቀንሳል።
- **መደበኛ ሙከራ እና ግንኙነት፡** ስለ ኤችአይቪ ሁኔታ እና ስለ ወሲባዊ ታሪክ መደበኛ የኤችአይቪ ምርመራ እና ከወሲብ አጋሮች ጋር ግልጽ የሆነ ግንኙነት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ይህ አስቀድሞ መለየትን ያረጋግጣል እና ሳያውቅ ቫይረሱን የመተላለፍ አደጋን ይቀንሳል።

ቅድመ-መጋለጥ ፕሮፊላክሲስ (PrEP)

ቅድመ-መጋለጥ ፕሮፊላክሲስ (PrEP) ለኤችአይቪ ኢንፌክሽን ከፍተኛ ተጋላጭ ለሆኑ ግለሰቦች የመከላከያ እርምጃ ነው። PrEP እንደ ትሩቫ ወይም ዴስኮቪ ያሉ ዕለታዊ መድሃኒቶችን መውሰድን ያካትታል ይህም በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወይም

በመርፌ መድሐኒት በመጠቀም በኤች አይ ቪ የመያዝ አደጋን በእጅጉ ይቀንሳል። በተከታታይ ሲወሰዱ፣ PREP በኤች አይ ቪ የመያዝ እድልን እስከ 99 በመቶ እንደሚቀንስ ታይቷል።

የኤድስ መከላከያ መመሪያዎች

የድህረ-ተጋላጭነት መከላከያ (ፒኢፒ)

የድህረ-ተጋላጭነት መከላከያ (PEP) ለኤችአይቪ ከተጋለጡ በኋላ የበሽታ መከላከልን ለመከላከል የፀረ-ኤችአይቪ መድሃኒቶችን መውሰድን ያካትታል። PEP ከተጋለጡ በ72 ሰዓታት ውስጥ መጀመር አለበት እና በተለምዶ ለ28 ቀናት የታዘዘ ነው። ለኤችአይቪ እንደተጋለጡ ካመኑ ወዲያውኑ የሕክምና እርዳታ ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው።

የፀረ-ኤችአይቪ ሕክምና (ART)

ከኤችአይቪ ጋር ለሚኖሩ ግለሰቦች የፀረ-ኤችአይቪ ቴራፒ (ART) የሕክምናው የማዕዘን ድንጋይ ነው። ART ቫይረሱን ለመቆጣጠር የኤችአይቪ መድሃኒቶችን በየቀኑ መውሰድን ያካትታል። ውጤታማ አርት የቫይረስ ጭነቱን ወደማይታወቅ ደረጃ ይቀንሳል ይህም ከኤችአይቪ ጋር የሚኖረውን ሰው ጤና ከማሻሻል ባለፈ ቫይረሱን ወደ ወሲባዊ አጋሮች የመተላለፍ አደጋን ያስወግዳል ይህ ጽንሰ-ሀሳብ Undetectable = Untransmittable (U=U) በመባል ይታወቃል።

የኤችአይቪ ስጋት ቅነሳ

መርፌ ልውውጥ ፕሮግራሞች

የመርፌ መድሃኒት አጠቃቀም የኤችአይቪ ስርጭት ወሳኝ መንገድ ነው። የመርፌ መለዋወጫ መርሃ ግብሮች (NEPs) አደንዛዥ ዕፅ ለሚወጡ ግለሰቦች የጸዳ መርፌዎችን እና መርፌዎችን ይሰጣሉ፤ ይህም የኤችአይቪ ስርጭት አደጋን ይቀንሳል። እነዚህ ፕሮግራሞች እንደ የኤችአይቪ ምርመራ፣ የምክር አገልግሎት እና የአደንዛዥ እጽ አጠቃቀም መታወክን የመሳሰሉ ተጨማሪ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ።

የጉዳት ቅነሳ ስልቶች

የጉዳት ቅነሳ ስልቶች ዓላማቸው ከመድኃኒት አጠቃቀም ጋር ተያይዘው የሚመጡትን የጤና ችግሮች ለመቀነስ ነው። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- **ክትትል የሚደረግባቸው የመርፌ ጣቢያዎች፡** ከመጠን በላይ የመጠጣት እና የኤችአይቪ ስርጭት አደጋን በመቀነስ ግለሰቦች በሕክምና ባለሙያዎች ቁጥጥር ስር አደንዛዥ ዕፅን የሚጠቀሙባቸው ፋሲሊቲዎች።
- **የኦፒዮይድ ምትክ ሕክምና (OST)** እንደ ሜታዶን ወይም ቡፕረኖርፊን ያሉ የኦፒዮይድ አጠቃቀም ችግር ላለባቸው ሰዎች መስጠት መርፌ መድሐኒት የመጠቀም ፍላጎትን ይቀንሳል፤ በዚህም የኤችአይቪ የመተላለፍ እድልን ይቀንሳል።

ኤችአይቪ/ኤድስን ለመከላከል 5 መንገዶች

ትምህርት እና ግንዛቤ

ትምህርት እና ግንዛቤ የኤችአይቪ/ኤድስ መከላከል መሰረታዊ አካላት ናቸው። ደህንነቱ የተጠበቀ የወሲብ ተግባራትን፣ የኤች አይ ቪ ስርጭትን እና የመከላከያ ዘዴዎችን የሚሸፍኑ አጠቃላይ የወሲብ ትምህርት ፕሮግራሞች አስፈላጊ ናቸው። የህዝብ ጤና ዘመቻዎች እና የማህበረሰብ ማዳረስ ተነሳሽነት መረጃዎችን በማሰራጨት እና ከኤችአይቪ/ኤድስ ጋር የተያያዙ መግለሎችን በመቀነስ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።

የወንድ ግርዛት

የህክምና ወንድ ግርዛት ሄትሮሴክሹዋል ወንዶች ለኤችአይቪ የመጋለጥ እድልን በ60 በመቶ እንደሚቀንስ ታይቷል። በተለይም ከፍተኛ የኤችአይቪ ስርጭት ባለባቸው ክልሎች ግርዛት እንደ አጠቃላይ የኤችአይቪ መከላከል ስትራቴጂ አካል ተደርጎ መወሰድ አለበት።

ከእናት ወደ ልጅ መተላለፍ መከላከል

ኤችአይቪ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ (MTCT) መከላከል የኤችአይቪ/ኤድስ መከላከል ወሳኝ ገጽታ ነው። ከኤችአይቪ ጋር የሚኖሩ ነፍስ ጡር እናቶች በእርግዝና፣ በወሊድ እና ጡት በማጥባት ቫይረሱን ወደ ጨቅላዎቻቸው የመተላለፍ አደጋን ለመቀነስ ART መቀበል አለባቸው። ለኤችአይቪ የተጋለጡ ጨቅላዎችን ቀደም ብሎ መመርመር እና ማከም አስፈላጊ ነው።

ደህንነቱ የተጠበቀ የደም ዝውውር

የኤችአይቪ ስርጭትን ለመከላከል የደም ዝውውርን ደህንነት ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። ለኤችአይቪ እና ለሌሎች ተላላፊ ወኪሎች የሚሰጠውን የደም ልገሳ ጠንከር ያለ የማጣሪያ ምርመራ እና የጻዳ መሳሪያዎችን ከመጠቀም ጋር በህክምና ቦታዎች አስፈላጊ ልምዶች ናቸው።

የአጋር ማስታወቂያ እና ሙከራ

የአጋር ማስታወቂያ እና ምርመራ ለወሲብ አጋሮች ለኤችአይቪ ሊጋለጡ እንደሚችሉ ማሳወቅ እና እንዲመረመሩ ማበረታታት ነው። ይህ ሂደት የኤችአይቪ ሁኔታቸውን የማያውቁ ግለሰቦችን ለመለየት ይረዳል። ይህም ቀደም ብሎ ምርመራ እና ህክምና ያስችላል።

መደምደሚያ

ኤችአይቪ/ኤድስን መከላከል ደህንነታቸው የተጠበቀ የፆታ ተግባራትን፣ የህክምና ዕርምጃዎችን፣ የጉዳት ቅነሳ ስልቶችን እና ትምህርትን ያካተተ ዘርፈ ብዙ አቀራረብን ይፈልጋል። እነዚህን ስልቶች በመተግበር እና ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ግለሰቦች ድጋፍ ሰጪ አካባቢን በማሳደግ የኤችአይቪ ስርጭትን በእጅጉ በመቀነስ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩትን የህይወት ጥራት ማሻሻል እንችላለን።

አጠቃላይ የመከላከያ እርምጃዎችን በሕዝብ ጤና ፖሊሲዎች እና በተናጥል አሠራሮች ውስጥ ማካተት ከኤችአይቪ/ኤድስ ጋር እየተካሄደ ባለው ትግል አስፈላጊ ነው። በቀጣይ ምርመራ፣ ትምህርት እና የማህበረሰብ ተሳትፎ፣ ኤች አይ ቪ/ኤድስን በብቃት የሚቆጣጠርበት እና በመጨረሻም የሚጠፋበት ጊዜ ላይ መስራት እንችላለን።

ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች

1. ኤችአይቪ/ኤድስን ለመከላከል ምን መንገዶች አሉ?

በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት ኮንዶምን ያለማቋረጥ እና በትክክል ይጠቀሙ።

2. መደበኛ የኤችአይቪ ምርመራ ኤድስን ለመከላከል የሚረዳው እንዴት ነው?

መደበኛ ምርመራ ኤችአይቪን በጊዜ ለማወቅ ይረዳል፣ ወቅታዊ ህክምናን ይፈቅዳል እና የመተላለፍን አደጋ ይቀንሳል።

3. PREP ኤችአይቪን በመከላከል ረገድ ምን ሚና ይጫወታል?

PrEP (ቅድመ-መጋለጥ ፕሮፊሊሲስ) ከፍተኛ ተጋላጭነት ባላቸው ሰዎች ላይ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን አደጋን የሚቀንስ መድኃኒት ነው።

4. የወሲብ አጋሮችን ቁጥር መቀነስ እንዴት ይረዳል?

ጥቂት አጋሮች ለኤችአይቪ እና ለሌሎች የመጋለጥ እድላቸውን ሊቀንሱ ይችላሉ። [በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች](#)።

5. መርፌዎችን ከመጋራት መቆጠብ አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው?

መርፌዎችን መጋራት ኤችአይቪን እና ሌሎች ደም-ነክ በሽታዎችን ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ሁልጊዜ የጻዳ መርፌዎችን ይጠቀሙ።

ኤችአይቪ እና ኤድስ፡ ምልክቶች፣ መንስኤዎች እና ህክምናዎች

ኤች አይ ቪ (Human Immunodeficiency Virus) በሽታ የመከላከል ስርዓትን የሚያጠቃ ቫይረስ ሲሆን በጊዜ ሂደት ወደ ኤድስ (Acquired Immunodeficiency Syndrome) ሊያመራ ይችላል። ኤድስ በሽታን የመከላከል አቅሙ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሲደርስ የሚከሰት በሽታ ሲሆን ይህም ሰውነት ለአፖርቹኒዝም እንዲጋለጥ ያደርገዋል። [ኢንፌክሽኖች እና ካንሰሮች](#)። በዚህ ብሎግ ስለ ኤች አይ ቪ እና ኤድስ ምልክቶች፣ መንስኤዎች እና ህክምናዎች እንነጋገራለን።

ምልክቶች:

በመጀመሪያዎቹ ደረጃዎች, ብዙ ሰዎች የኤችአይቪ ኤድስ ምልክቶች አይታዩም. ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ለቫይረሱ ከተጋለጡ ከ2-4 ሳምንታት ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ እንደ ትኩሳት፣ ራስ ምታት እና ድካም የመሳሰሉ የጉንፋን አይነት ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ። ቫይረሱ እየገፋ ሲሄድ ምልክቶቹ የሊምፍ ኖዶች እብጠት፣ ክብደት መቀነስ፣ ተቅማጥ እና የሌሊት ላብ ሊያካትቱ ይችላሉ። በኋለኞቹ የኤችአይቪ ደረጃዎች፣ ወደ ኤድስ ሲሸጋገር፣ ምልክቶቹ የማያቋርጥ ሳል፣ የጉንፋሽ ማጠር እና ተደጋጋሚ ትኩሳት ሊያጠቃልሉ ይችላሉ።

በኤች አይ ቪ የተያዙ ብዙ ሰዎች መጀመሪያ ላይ ምንም ምልክት ሊያዩ ይችላሉ። የኤችአይቪ ኢንፌክሽን እድገት ብዙውን ጊዜ በበርካታ ደረጃዎች ውስጥ ያልፋል-

- **አጣዳፊ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን (ደረጃ 1)** ይህ ደረጃ ከበሽታው በኋላ ከጥቂት ሳምንታት እስከ ወራት ውስጥ ያድጋል እና የጉንፋን ምልክቶችን ሊያካትት ይችላል. ይሁን እንጂ እነዚህ ምልክቶች ብዙውን ጊዜ ቀላል እና በቀላሉ በሌሎች በሽታዎች ሊሳሳቱ ይችላሉ.
- **ሥር የሰደደ ወይም የማያሳይ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን (ደረጃ 2)** በዚህ ደረጃ, ለአስር አመታት ወይም ከዚያ በላይ ሊቆይ በሚችልበት ጊዜ, ግለሰቦች ብዙውን ጊዜ ምንም የሚታዩ ምልክቶች አይታዩም. ፍጹም ጤነኛ ሊሰማቸው ይችላል፣ነገር ግን አሁንም ቫይረሱን ወደሌሎች ሊያስተላልፉ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል።
- **ኤድስ (Acquired Immunodeficiency Syndrome) (ደረጃ 3)** ህክምና ከሌለ ሁሉም ማለት ይቻላል በኤች አይ ቪ የተያዙ ሰዎች በመጨረሻ ወደ ኤድስ ይደርሳሉ። አንዳንዶቹ ከበሽታው በኋላ በአንፃራዊነት በፍጥነት ኤድስን ሊያዙ ይችላሉ፣ሌሎች ደግሞ ከ10 እስከ 20 ዓመታት ጤነኛ ሆነው ሊቆዩ ይችላሉ፣ ይህም የረዥም ጊዜ ተራማጅ ያልሆኑ በመባል ይታወቃሉ።
- ኤድስ ያለባቸው ሰዎች በኤችአይቪ በደረሰው ጉዳት ምክንያት የመከላከል አቅማቸው በእጅጉ ተዳክሟል። ይህ የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ ያልተለመዱ ኢንፌክሽኖች (Opportunistic infections) በመባል የሚታወቁ ኢንፌክሽኖች የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ነው። እነዚህ ኢንፌክሽኖች በባክቴሪያ፣ ቫይረሶች፣ ፈንገሶች ወይም ፕሮቶዞአዎች ሊከሰቱ ይችላሉ። በተጨማሪም ኤድስ ያለባቸው ሰዎች ለአንዳንድ ካንሰሮች በተለይም ሊምፎማዎች እና ካፖዚ ሳርኮማ ለተባለ የቆዳ ካንሰር በጣም የተጋለጡ ናቸው።

ከኤችአይቪ እና ኤድስ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ምልክቶች እንደ ልዩ የአጋጣሚ ኢንፌክሽን እና በተጎዳው የሰውነት ክፍል ላይ ተመስርተው ይለያያሉ. የተለመዱ ምልክቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

- የሳንባ ኢንፌክሽኖች ብዙውን ጊዜ ወደ ሳል ፣ ትኩሳት እና የመተንፈስ ችግር ያመጣሉ ።
- ተቅማጥ ፣ የሆድ ህመም ፣ ማስታወክ እና የመዋጥ ችግሮች ሊያስከትሉ የሚችሉ የአንጀት ኢንፌክሽኖች።
- እንደ ክብደት መቀነስ፣ ትኩሳት፣ የሌሊት ላብ፣ ሽፍታ እና የሊምፍ እጢዎች ያሉ ሌሎች አጠቃላይ ምልክቶችም ሊኖሩ ይችላሉ።

ምክንያቶች

ኤች አይ ቪ በዋነኝነት የሚተላለፈው ደም፣ የዘር ፈሳሽ፣ የሴት ብልት ፈሳሽ እና የጡት ወተትን ጨምሮ የተወሰኑ የሰውነት ፈሳሾችን በመለዋወጥ ነው። በጣም የተለመደው የመተላለፊያ ዘዴ በግብረ ሥጋ ግንኙነት በተለይም ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከታመመ አጋር ጋር የሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ነው። በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር መርፌን ወይም መርፌን መጋራት፣ በበሽታው ከተያዘ ሰው ደም መውሰድ ወይም የአካል ክፍል መተካት እና ከእናት ወደ ልጅ በወሊድ ወይም ጡት በማጥባት የመተላለፊያ መንገዶች ናቸው።

ኤች አይ ቪ በደም ወይም የአካል ልገሳ ሂደቶች አይተላለፍም። ሰዎች ደም ወይም የአካል ክፍሎች ሲለግሱ በቀጥታ ከተቀባዮቹ ጋር አይገናኙም። በተጨማሪም በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ የጻዳ መርፌዎች እና የሕክምና መሳሪያዎች ሁልጊዜ ጥቅም ላይ ይውላሉ።

የደም ባንኮች እና የአካል ክፍሎች ለጋሾች ፕሮግራሞች ለጋሾች፣ ደም እና ሕብረ ሕዋሳት ጥልቅ ምርመራ ያካሂዳሉ። ስለዚህ፣ በደም ምትክ፣ በደም ምርቶች፣ ወይም በአካል ወይም በቲሹ ንቅለ ተከላ በኤች አይ ቪ የመያዝ እድሎች በጣም ዝቅተኛ ናቸው።

የኤችአይቪ ስርጭት አደጋን ከፍ የሚያደርጉ ምክንያቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- ጥንቃቄ የጎደለው የፊንጢጣ ወይም የሴት ብልት የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማድረግ በጣም አደገኛው የፊንጢጣ ወሲብ መቀበያ ነው። ብዙ የግብረ ሥጋ አጋሮች መኖራቸው አደጋውን ከፍ ያደርገዋል። በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት አዲስ ኮንዶም በትክክል መጠቀም ይህንን አደጋ በእጅጉ ይቀንሳል።
- መድሃኒቶችን መጠቀም እና መርፌዎችን ወይም መርፌዎችን መጋራት ይህም ግለሰቦችን ለተበከለ ደም ወይም የሰውነት ፈሳሽ ሊያጋልጥ ይችላል።
- ኤችአይቪ ያለበት እና የኤችአይቪ መድሃኒት የማይወስድ የግብረ ሥጋ ጓደኛ ማፍራት ይህ የመተላለፍ እድልን ይጨምራል።
- በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎችን (STD) መቀበል፣ ይህም የኤች አይ ቪ ስርጭትን ሊያመቻች ይችላል።

ህክምናዎች

ለኤችአይቪ ወይም ለኤድስ መድሃኒት ባይኖርም ቫይረሱን ለመቆጣጠር እና ወደ ኤድስ የሚደረገውን እድገት ለመከላከል የሚረዳ የኤችአይቪ ኤድስ ህክምና አለ። የፀረ ኤችአይቪ ሕክምና (ART) መደበኛው የኤችአይቪ ሕክምና ነው። አርት (ART) ቫይረሱን የሚጨቁኑ መድሃኒቶችን በማጣመር በሽታ የመከላከል ስርአቱ እንዲያገግም እና ወደ ኤድስ እንዳይሸጋገር ያደርጋል። ኤችአይቪ ያለባቸው ሰዎች ረጅም እና ጤናማ ህይወት እንዲኖሩ በማድረግ አርት በጣም ውጤታማ እንደሆነ ታይቷል።

ከ ART በተጨማሪ የኤችአይቪ እና የኤድስ ምልክቶችን እና ችግሮችን ለመቆጣጠር ሌሎች ህክምናዎች አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ እንደ አፖርቹኒካል ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል እና ለማከም መድሃኒቶች [የሳምባ ነቀርሳ](#) እና ቲዩቢርክሎዝስ፣ ሊታዘዙ ይችላሉ። እንደ የምክር እና የአመጋገብ ድጋፍ ያሉ ድጋፍ ሰጪ እንክብካቤዎችም ሊመከሩ ይችላሉ።

ቀደም ባሉት ጊዜያት ኤችአይቪ ያለባቸው ሰዎች የሲዲ 4 ሴል ቁጥራቸው ከቀነሰ ወይም ከኤችአይቪ ኢንፌክሽን ጋር የተያያዙ ችግሮች ሲያጋጥማቸው የፀረ-ኤችአይቪ ሕክምናን ይጀምራሉ። ይሁን እንጂ በዛሬው ጊዜ የሲዲ 4 ሴል ቁጥራቸው በተለመደው ክልል ውስጥ ቢሆንም በኤች አይ ቪ ለተያዙ ሰዎች ሁሉ የኤችአይቪ ሕክምና መጀመር ይመከራል።

ሁለት ዋና ዋና የኤችአይቪ ሕክምና ዓይነቶች አሉ፡-

- **የአፍ ውስጥ መድኃኒቶች (ከኒኖች)** እነዚህ የኤችአይቪ ሕክምና ለጀመሩ ግለሰቦች የታዘዙ ናቸው።
- **የሚወጡ መድኃኒቶች (ቮች)፡-** አንዳንድ ግለሰቦች ሊታወቅ የማይችል የቫይረስ ሎድ (በደም ውስጥ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የኤችአይቪ መጠን) ካገኙ ወይም ቢያንስ ለሶስት ወራት የቫይረስ መከላከያ ከቆዩ በመርፌ የሚወሰዱ መድኃኒቶችን ሊያገኙ ይችላሉ። እነዚህ መርፌዎች በየወሩ ወይም በየወሩ ሊደረጉ ይችላሉ።

በደም ውስጥ ያለውን የኤችአይቪ ቫይረስ መጠን የሚለካውን የቫይረስ ጭነት ለመቆጣጠር መደበኛ የደም ምርመራዎች አስፈላጊ ናቸው። የሕክምናው ዓላማ በደም ውስጥ ያለው የኤችአይቪ ቫይረስ ወደ ዝቅተኛ ደረጃ በመቀነስ በምርመራዎች ላይ የማይታወቅ ይሆናል።

ህክምናው ሲጀመር እና በተለይም የሲዲ4 ሴል ቆጠራዎች ቀደም ብለው ከቀነሱ የሲዲ 4 ቆጠራው ቀስ በቀስ መጨመር ይጀምራል። የበሽታ መከላከያ ስርዓቱ እያገገመ ሲመጣ፣ ከኤችአይቪ ኢንፌክሽን ጋር የተያያዙ ችግሮች ብዙ ጊዜ ይቀንሳሉ ወይም ይጠፋሉ።

ኤች አይ ቪ እንዴት እንደሚሰራጭ

ኤችአይቪን ለመያዝ አንድ ሰው የተበከለ ደም፣ የዘር ፈሳሽ ወይም የሴት ብልት ፈሳሾች ጋር መገናኘት አለበት፤ እነዚህም በተለያዩ መንገዶች ሊከሰቱ ይችላሉ።

- **ወሲባዊ ግንኙነት፡** ኢንፌክሽን ከኤችአይቪ ፖዘቲቭ አጋር ጋር በሴት ብልት፣ በፊንጢጣ ወይም በአፍ በሚፈጸም ግንኙነት ሊከሰት ይችላል። ቫይረሱ በአፍ ቁስሎች ወይም በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት በሚፈጠሩ ትናንሽ እንባዎች ወደ ሰውነት ውስጥ ሊገባ ይችላል።
- **መርፌ መጋራት፡** ለመድኃኒት መርፌ የተበከሉ መርፌዎችን ወይም መርፌዎችን መጋራት ለኤችአይቪ መተላለፍ ከፍተኛ አደጋን ይፈጥራል፤ እንዲሁም እንደ ሄፓታይተስ ያሉ ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች።
- **የደም መፍሰስ፡** ምንም እንኳን ጥብቅ የደም ምርመራ በሚደረግባቸው አገሮች ውስጥ ኤችአይቪ በደም ምትክ ሊተላለፍ ይችላል። ውስን የማጣሪያ ግብዓቶች ባለባቸው ክልሎች አደጋው ከፍ ያለ ነው።
- **ከእናት ወደ ልጅ ማስተላለፍ፡** በቫይረሱ የተጠቁ እናቶች በእርግዝና፣በወሊድ ጊዜ እና ጡት በማጥባት ቫይረሱን ወደ ልጆቻቸው ሊያስተላልፉ ይችላሉ። በእርግዝና ወቅት ወቅታዊ ህክምና ይህንን አደጋ በእጅጉ ይቀንሳል።

መከላከል

የኤች አይ ቪ ስርጭትን መከላከል ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ቁልፍ ነው። ኤች አይ ቪን ለመከላከል በርካታ ውጤታማ ስልቶች አሉ፡ ከነዚህም ውስጥ፡-

1. ኮንዶም በመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማድረግ
2. ለኤችአይቪ እና ለሌሎች በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች በየጊዜው መመርመር
3. መርፌዎችን ወይም መርፌዎችን ከሌሎች ጋር ከመጋራት መቆጠብ
4. ለደም መውሰድ፣ ወይም ለመተካት የተጣራ የደም እና የአካል ምርቶችን ብቻ መጠቀም
5. ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ ለመከላከል በኤች አይ ቪ የተያዙ እርጉዝ ሴቶችን ማከም

ከነዚህ ስልቶች በተጨማሪ የቅድመ ተጋላጭነት ፕሮፈላክሲስ (PrEP) ለኤችአይቪ ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው ሰዎች ኢንፌክሽንን ለመከላከል ሊወሰዱ የሚችሉ መድኃኒቶች ናቸው።

የኤችአይቪ ምርመራዎች

ፀረ እንግዳ አካላት መከራዎች እነዚህ በጣም የተለመዱ የኤችአይቪ ምርመራዎች ናቸው። ኤችአይቪን ለመዋጋት በሰውነት ውስጥ የሚፈጠሩ ፀረ እንግዳ አካላትን ይለያሉ። የሚከተሉትን ያጠቃልላል።

- የ ELISA ምርመራ በደም ውስጥ ወይም በምራቅ ውስጥ ፀረ እንግዳ አካላትን ይፈልጋል። ውጤቱ አወንታዊ ከሆነ፣ ብዙውን ጊዜ በከትትል ምርመራ የተረጋገጠ ነው።
- ፈጣን የፀረ-ሰው መከራዎች፡- እነዚህ ከELISA ፈተናዎች በበለጠ ፍጥነት ይሰጣሉ።

የኑክሊክ አሲድ መከራ (ኤንኤቲ)፡ ይህ ምርመራ ቫይረሱን የጄኔቲክ ቁሳቁሶችን በመለየት በቀጥታ በደም ውስጥ ይመለከታል። ፀረ እንግዳ አካላት ውጤታማ በማይሆኑበት ጊዜ በበሽታው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ጥቅም ላይ ይውላል።

የሶስተኛ ትውልድ ምርመራዎች ሁለቱንም የኤችአይቪ ፀረ እንግዳ አካላትን እና አንቲጂኖችን ይለያሉ፣ ይህም ከፀረ-ሰው ከመሞከር ቀደም ብሎ እንዲገኝ ያስችለዋል።

የቤት መከራ ኪት እነዚህ መሳሪያዎች ሰዎች የራሳቸውን ምራቅ ወይም ደም በቤት ውስጥ እንዲፈትሹ ያስችላቸዋል። አዎንታዊ የምርመራ ግኝቶች በጤና አጠባበቅ ባለሙያ መረጋገጥ አለባቸው።

የኤችአይቪ ስጋት ምክንያቶች

- ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት በኤች አይ ቪ የመያዝ እድልን ይጨምራል።
- መርፌዎችን ወይም መርፌዎችን በመርፌ መወጋት፣ መበሳት መሳሪያዎች ከተበከሉ ወደ ኤች አይ ቪ እንዲተላለፉ ሊያደርጉ ይችላሉ።

- ኤች አይ ቪ ከተያዘች እናት ወደ ልጅዋ በእርግዝና፣ በወሊድ ወይም ጡት በማጥባት ሊተላለፍ ይችላል።
- በጤና እንክብካቤ ሰራተኞች ወይም በስራ አካባቢ ውስጥ ለደም ወይም የሰውነት ፈሳሽ የተጋለጡ ግለሰቦች ጥበቃ ሳይደረግላቸው አደጋ ላይ ናቸው።
- ለጋሹ ኤችአይቪ ፖዘቲቭ ከሆነ (ምንም እንኳን በጣም አልፎ አልፎ ቢሆንም) ኤች አይ ቪ በተበከለ ደም በመሰጠት ወይም የአካል ክፍሎችን በመተካት ሊተላለፍ ይችላል።
- ሌሎች የአባላዘር በሽታዎች መኖር በኤች አይ ቪ የመያዝ እድልን ይጨምራል ምክንያቱም እነዚህ ኢንፌክሽኖች የኤችአይቪ ስርጭት ሊያስከትሉ ስለሚችሉ ነው።

እነዚህን የአደጋ መንስኤዎችን መረዳት እና ለኤችአይቪ በየጊዜው መመርመር፣ በተለይም ከተጋለጡ በኋላ ወይም ከፍተኛ ተጋላጭነት ባላቸው ተግባራት ውስጥ ከተሰማሩ በኋላ አስቀድሞ ለማወቅ እና በበሽታው ከተያዙ ወቅታዊ ህክምና ለማግኘት ወሳኝ ነው። የኤችአይቪ ስርጭትን መከላከል ደህንነቱ የተጠበቀ የግብረ-ሥጋ ግንኙነት ቴክኒኮችን፣ የጾዳ መርፌዎችን መጠቀም እና ተገቢውን የህክምና እንክብካቤ መፈለግን ይጠይቃል።

መደምደሚያ

በማጠቃለያው ኤች አይ ቪ እና ኤድስ ከፍተኛ የጤና ተጽእኖ የሚያስከትሉ ከባድ ሁኔታዎች ናቸው። ለእነዚህ ሁኔታዎች ምንም አይነት መድሃኒት ባይኖርም ቫይረሱን ለመቆጣጠር እና ወደ ኤድስ የሚደረገውን እድገት ለመከላከል የሚረዱ ህክምናዎች አሉ። እንደ ደህንነቱ የተጠበቀ የግብረ ሥጋ ግንኙነትን መለማመድ እና መርፌን ከመጋራት መቆጠብ የኤችአይቪን ስርጭት ለመቆጣጠር አስፈላጊዎች ናቸው። ለኤችአይቪ ተጋልጠሃል ብለው የሚያስቡ ከሆነ ቶሎ ምርመራ ማድረግ እና የህክምና እርዳታ መፈለግ ውጤቱን ለማሻሻል እና የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ይረዳል።

ከላይ ከተዘረዘሩት ውስጥ ለአንዳቸውም ከተጋለጡ እና ምልክቶችን ካዩ ብቃት ያለው ዶክተር ማነጋገር አስፈላጊ ነው። እባክዎን ይጎብኙ www.carehospitals.com እና የሕክምና ዕርዳታ ለማግኘት ከፈለጉ ቀጠሮ ይያዙ።

ተደጋጋሚ ጥያቄዎች

1. በኤችአይቪ እና በኤድስ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?

ኤች አይ ቪ እና ኤድስ የሚለያዩት ኤች አይ ቪ ቫይረስ ነው የበሽታ ተከላካይ ስርአታችን ጥንካሬን የሚቀንስ ሲሆን ኤድስ ደግሞ በኤችአይቪ ኢንፌክሽን ምክንያት የበሽታ መከላከያ ስርአታችን በከፍተኛ ሁኔታ ሲዳከም የሚመጣ በሽታ ነው።

በኤች አይ ቪ ካልተያዙ በስተቀር ኤድስ ሊከሰት አይችልም። እንደ እድል ሆኖ፣ የቫይረሱን ተፅእኖ በሚቀንስ ህክምና ሁሉም ኤችአይቪ ያለባቸው ሰዎች ኤድስ አይያዙም። ነገር ግን ህክምና በሌለበት ጊዜ ሁሉም ማለት ይቻላል በኤች አይ ቪ የተያዙ ሰዎች በመጨረሻ ወደ ኤድስ ይደርሳሉ።

2. ኤችአይቪ ምን ያህል የተለመደ ነው?

አዲስ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ቀንሷል። በ2019፣ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ወደ 1.2 ሚሊዮን የሚጠጉ ከኤችአይቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። በሚያስደነግጥ ሁኔታ 13% ያህሉ የኤችአይቪ ሁኔታቸውን አያውቁም፣ ይህም መደበኛ የኤችአይቪ ምርመራ አስፈላጊነትን ያሳያል።

3. የኤችአይቪ ደረጃዎች ምን ምን ናቸው?

የኤችአይቪ (የሰው ልጅ የበሽታ መከላከያ ቫይረስ) ኢንፌክሽን በተለያዩ ደረጃዎች ያልፋል፣ እና የበሽታው ከብደት በእያንዳንዱ ደረጃ ይለያያል። የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ደረጃዎች የሚከተሉት ናቸው፡

- አጣዳፊ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን፡- የመጀመርያ ደረጃ ከጉንፋን መሰል ምልክቶች ጋር ወይም ምንም የለም።
- ከሊኒካዊ መዘግየት (ሥር የሰደደ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን)፡- ምንም ወይም መለስተኛ ምልክቶች የሌሉበት የእንቅልፍ ደረጃ።
- ምልክታዊ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን፡- አንዳንዶች ትኩሳት፣ ተቅማጥ እና ከብደት መቀነስን ጨምሮ ምልክቶችን ያጋጥማሉ።
- የበሽታ መከላከያ ሲንድረም (ኤድስ)፡- ከፍተኛ የበሽታ መከላከል ስርዓት ተጎድቷል፣ ይህም ወደ አፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽኖች እና ኤድስን የሚወስኑ በሽታዎችን ያስከትላል።

4. ኤድስን የሚወስኑ በሽታዎች ምንድን ናቸው?

ኤድስን የሚወስኑ ሕመሞች በተለይ የተራቀቀ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን (ኤድስ) ባለባቸው ግለሰቦች ላይ የሚከሰቱ ልዩ የሕክምና ሁኔታዎች ናቸው። እነዚህ ህመሞች እንደ ካፖሲ ሳርኮማ፣ የሳንባ ምች (pneumocystis pneumonia) እና ወራሪ የማህፀን በር ካንሰርን የመሳሰሉ ከባድ አፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽኖችን እና የተወሰኑ ካንሰሮችን ያጠቃልላሉ። የእነሱ መኖር ለኤድስ ቁልፍ የምርመራ መስፈርት ነው።

5. ኤችአይቪን የሚያውቁት የትኞቹ ምርመራዎች ናቸው?

የኤችአይቪ ኢንፌክሽንን ለመለየት ብዙ ምርመራዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ-

- **የኤች አይ ቪ ፀረ እንግዳ አካላት ምርመራ**፣ ለኤችአይቪ ምላሽ ለመስጠት በሽታን የመከላከል ስርዓት የሚያመነጩ ፀረ እንግዳ አካላትን ያገኛል። የተለመዱ ዓይነቶች ELISA እና ፈጣን ፀረ እንግዳ አካላት ምርመራዎችን ያካትታሉ። አዎንታዊ ከሆነ፣ ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርመራ ይደረጋል።
- **የኩለኪ አሲድ ሙከራ (NAT)**፡- የቫይረሱን ጀነቲካዊ ቁሶች በቀጥታ ፈልጎ ያገኛል። ቀደም ብሎ ለመለየት ጥቅም ላይ ይውላል፣ እና በጣም ትክክለኛ ነው።
- **አንቲጂን-አንቲ አካል ሙከራ (4ኛ ትውልድ ወይም ጥምር ሙከራ)** ሁለቱንም የኤችአይቪ ፀረ እንግዳ አካላትን እና አንቲጂኖችን (የቫይረስ ፕሮቲኖችን) ያገኛቸዋል፣ ይህም ፀረ እንግዳ አካላትን ከመመርመር ይልቅ ቀደም ብሎ ተገኝቷል።

- **የቤት የኤችአይቪ መመርመሪያ እቃዎች፡-** ለራስ-ምርመራ ይገኛሉ፣ የአፍ ውስጥ ፈሳሽ ወይም የደም ናሙናዎችን ይጠቀማሉ እና በቤት ውስጥ ውጤቶችን ይሰጣሉ።
- **CD4 የሕዋስ ብዛት፡-** የበሽታ መከላከል ስርዓትን ጤና ይለካል እና የኤችአይቪ እድገትን ለመገምገም ይረዳል።
- **የቫይረስ ጭነት መከራ፤** በደም ውስጥ ያለውን የኤችአይቪ መጠን ይለካል፣ የቫይረስ እንቅስቃሴን እና የሕክምናውን ውጤታማነት ይገመግማል።
- **የምዕራባዊ የብሎት መከራ** የፀረ-ሰው ምርመራዎች አዎንታዊ ሲሆኑ የኤችአይቪ ኢንፌክሽንን ለማረጋገጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
- **የእንክብካቤ ነጥብ (POC) መከራዎች፡-** ፈጣን ውጤቶችን የሚያቀርቡ ፈጣን መከራዎች፣ ብዙ ጊዜ በክሊኒኮች እና በአገልግሎት መስጫ ቦታዎች ውስጥ ያገለግላሉ።

Immuno Deficiency Syndrome (ኤድስ) በሰው ልጅ የበሽታ መከላከያ ቫይረስ (ኤችአይቪ) የሚመጣ በሽታ ነው። ኤች አይ ቪ በሽታ የመከላከል ስርዓትን ይጎዳል እናም የሰውነትዎ ኢንፌክሽኖችን እና በሽታዎችን የመከላከል አቅምን ይቀንሳል።

በ 1980 ዎቹ መጀመሪያ ላይ ዶክተሮች በግብረ ሰዶማውያን ወንዶች መካከል ያልተለመዱ ኢንፌክሽኖችን እና ነቀርሳዎችን ገልጸዋል። እነዚህ ሰዎች በ *Pneumocystis carini* እና እንደ ካፖዚ ባሉ ካንሰሮች የሚመጡ ያልተለመዱ የሳንባ ሞት ያዙ ሳርኮማ እና በሰውነታቸው በሽታን የመከላከል አቅማቸው ከፍተኛ ጉድለት የተነሳ ህይወታቸው አልፏል። እ.ኤ.አ. በሴፕቴምበር 1982 ሲዲቢ ይህንን ሁኔታ ኤድስ ወይም የበሽታ መከላከያ እጥረት ሲንድሮም (syndrome) ተብሎ ሰይሞታል እና በሴሎች መካከለኛ የሰውነት መከላከያ ላይ ጉድለት እንዲፈጠር ሀሳብ አቅርቧል። በኋላ ላይ፣ በሽታው በደም ውስጥ በሚገቡ አደንዛዥ እጾች እና በሄሞፊሊያ የሚሠቃዩ ታካሚዎች ላይ ተጽእኖ እንደሚያሳድር ታይቷል። እ.ኤ.አ. በ 1984 የሰው የበሽታ መከላከያ ቫይረስ በሳይንቲስቶች ሉክ ሞንታግኒየር እና ሮበርት ጋሎ የኤድስ መንስኤ ሆኖ ተገኝቷል ።

በክሊኒካዊ, ቪ ኢንፌክሽኑ በ 3 ደረጃዎች ያልፋል ፣ እነሱም ፣ አጣዳፊ የመጀመሪያ ደረጃ ኢንፌክሽን ፣ የክሊኒካዊ መዘግየት ደረጃ እና ኤድስ። በእነዚህ ደረጃዎች ውስጥ, የግለሰቡ የበሽታ መከላከያ ቀስ በቀስ እየቀነሰ ይሄዳል, እና የበሽታ መከላከያ ሴሎች ቁጥር ይቀንሳል።

በኤች አይ ቪ የተለከፈ ሰው የመከላከል አቅሙ እጅግ ሲዳከም፣ በሰውነቱ ውስጥ ያሉት ልዩ የመከላከያ ሴሎች ሲዲ4 በመባል የሚታወቁት ከ200 ሴሎች/mm3 በታች ይቀንሳሉ፣ እና ኤድስን ያዳብራል። ኤድስ በጣም አሳሳቢው የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ደረጃ ነው። በዚህ ደረጃ, በሽተኛው እንደ ከባድ, ለሕይወት አስጊ የሆኑ ኢንፌክሽኖች ያሉ የኤድስ ምልክቶች ያጋጥሙዋል። ካንሰር እና የኤድስ የነርቭ ችግሮች።

የኤችአይቪ ኢንፌክሽን በበሽተኛው ደም ውስጥ ከኤችአይቪ ጋር ፀረ እንግዳ አካላትን በመመርመር ይመረመራል። የኤድስ ሕክምናን ለመምራት የቫይራል ዲ ኤን ኤ እና የሲዲ4 ሕዋስ ብዛት መኖሩን የሚያውቁ ጥቂት ምርመራዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ።

በዓለም ጤና ድርጅት የታተመው አኃዛዊ መረጃ በ2016 መጨረሻ 36.7 ሚሊዮን ሰዎች በኤች አይ ቪ ተይዘዋል። በተጨማሪም ከኤድስ ጋር በተያያዙ ምክንያቶች 1.6 ሚሊዮን ሰዎች ሞተዋል። በአፍሪካ አህጉር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች የተጎዱ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ኤድስ እንደ ወረርሽኝ ይገለጻል ይህም በሽታ በአህጉራት ተሰራጭቷል። የኤችአይቪ ኢንፌክሽን በመሳሰሉት ኢንፌክሽኖች የመያዝ እድሎችን ስለሚጨምር በማደግ ላይ ባሉ አገሮች ውስጥ ያሉ ሰዎች በጣም የተጠቁ ናቸው። የሳንባ ነቀርሳ እና ከኤድስ ጋር በተያያዙ ችግሮች ምክንያት ይሞታሉ።

ኤድስም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ይነካል ምክንያቱም አብዛኞቹ የተጠቁት ግለሰቦች በአምራች የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ

ናቸው። በኤች አይ ቪ የተያዙ ሰዎች ዘጠና አምስት በመቶ የሚሆኑት በታዳጊ አገሮች እንደሚኖሩ ጥናቶች አመልክተዋል። ድህነት፣ ሌሎች ከባድ ሕመሞች መኖራቸው፣ ተገቢው የሕክምና አገልግሎት አለማግኘትና ድንቁርና በእነዚህ አገሮች የኤድስን ሽክም ያባብሰዋል።

በመተላለፊያ ዘዴዎች ምክንያት፣ ለኤድስ ወይም ለኤችአይቪ ኢንፌክሽን የተጋለጡ ግለሰቦች ናቸው

- ከወንዶች ጋር የ sex ታግኙነት የሚፈጽሙ ወንዶች
- የንግድ ወሲብ ስራተኞች
- ብዙ አጋሮች ያሏቸው እና ጥንቃቄ በሌለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚሳተፉ ግለሰቦች
- መርፌዎችን የሚጋሩ ሕገወጥ የዕፅ ተጠቃሚዎች
- በአንድ ጊዜ በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ያጋጠማቸው

ኤድስ የሚከሰተው በ የሰው ልጅ የበሽታ መከላከያ ቫይረስ (ኤች አይ ቪ). እነዚህ ቫይረሶች ፊትሮቫይረስ ይባላሉ እና ሌንቲ ቫይረስ ከተባለ ጂነስ ናቸው። ሁለት ዓይነት ኤችአይቪ አለ፡ ኤች አይ ቪ-1 እና ኤችአይቪ-2.

ኤችአይቪ -1 በዓለም ላይ በጣም የተለመደ ቫይረስ ነው። ከሁሉም ኢንፌክሽኖች ውስጥ 95 በመቶውን ይይዛል. ኤችአይቪ-1 በርካታ ንዑስ ቡድኖች አሉት፤ M፣ N፣ O እና P. ከእነዚህም መካከል ንኡስ ቡድን M በጣም የተስፋፋው ነው።

ኤችአይቪ-2 በብዛት በብዛት አይታይም። ከምዕራብ አፍሪካ፣ ከአውሮፓ አገሮች እንደ ፖርቱጋል፣ ፈረንሳይ እና ህንድ ተዘግቧል። በኤችአይቪ-1 ምክንያት ከሚመጣው ቀስ በቀስ የሚራመዱ በሽታዎችን ያስከትላል. እነዚህ ቫይረሶች በሚከተሉት መንገዶች ይተላለፋሉ

- ከታመመ ሰው ጋር ጥንቃቄ የነደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት።
- በህገ-ወጥ የመድኃኒት ተጠቃሚዎች መካከል የተበከሉ መርፌዎችን መጋራት።
- የተበከለውን ደም ላልተያዘ ሰው መስጠት
- በእርግዝና ወቅት ወይም ጡት በማጥባት ከእናት ወደ ልጅ.

እነዚህ ቫይረሶች ወደ ሰው አካል ውስጥ ሲገቡ ሲዲ4 ቲ-ሴሎች ተብለው ከሚጠሩ ተከላካይ ሕዋሳት ጋር ይያያዛሉ። ቫይረሱ በሲዲ4 ቲ-ሴሎች ወለል ላይ ከሚገኙ ተቀባዮች ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩ የተወሰኑ ግላይቦፕሮቲኖች የሚባሉ ስፒሎች አሉት። የሲዲ 4 ቲ-ሴሎች የነጭ የደም ሴሎች አይነት ሲሆኑ ይህም በሽታን የመከላከል ስርዓት ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ጎጂ የሆኑ ረቂቅ ተሕዋሲያንን ያጠቃሉ እና ከበሽታ እና ከበሽታ ይጠብቀናል.

የተያያዙት ቫይረሶች ወደ ሲዲ 4 ሴሎች ውስጥ ገብተው በእነዚህ ሴሎች ውስጥ ይባዛሉ። እነዚህ ሴሎች በሚባዛው ቫይረስ ይጎዳሉ። ስለዚህ የሲዲ 4 ቲ-ሴሎች ቁጥር ቀስ በቀስ እያሽቆለቆለ በመሄድ የበሽታ መከላከል ስርዓትን ማዳከም ያስከትላል።

የሰው አካልን ከኢንፌክሽን ለመከላከል ጠንካራ የበሽታ መከላከያ ስርዓት ያስፈልጋል. ኤድስ የሚከሰተው ኤችአይቪ በሰውነት ውስጥ ያለው የበሽታ መከላከያ እጥረት ሲከሰት ነው. ስለሆነም የኤድስ ምልክቶች በጤናማ ሰዎች ላይ የማይገኙ በርካታ ኢንፌክሽኖችን ያጠቃልላል። እነዚህ ኢንፌክሽኖች አፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽኖች ይባላሉ። የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት የሚወድሙበት ደረጃም በአጋጣሚ ኢንፌክሽኖች የመያዝ አደጋን ይወስናል።

የበሽታ ተከላካይ ስርዓቱ ላልተወሰነ ጊዜ ሊራቡ የሚችሉ ሚውቴሽን ሴሎችን በማስወገድ ሰውነታችንን ከካንሰር ይከላከላል። በኤድስም ካንሰርን የመከላከል አቅሙ የተዳከመ ሲሆን በሽተኛው በተለያዩ ካንሰሮች ይሠቃያል።

ቫይረሱ በኢንፌክሽኑ ጊዜ በጣም ቀደም ብሎ ወደ አንጎል ገብቶ በአንጎል ውስጥ ባሉ የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ውስጥ ሊባዛ ይችላል። እነዚህ የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት፣ የአንጎል ማክሮፋጅስ እና ሞኖይቶች ለኤችአይቪ ኢንፌክሽን እንደ ማጠራቀሚያ ሆነው ያገለግላሉ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገት ሊያስከትሉ ይችላሉ። **ከዩሮፖሊኒክ ጉዳት.**

በመጀመሪያዎቹ ደረጃዎች, በኤች አይ ቪ መያዝ ምንም ምልክት ላያሳይ ይችላል. የሰውነት መከላከያው ቀስ በቀስ እየቀነሰ

ሲሄድ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ምልክቶች መታየት ይጀምራሉ። በሽታው ከመጀመሪያው ኢንፌክሽን ወደ ሙሉ ኤድስ እንዲራዘም ብዙ ዓመታት ይወስዳል።

የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ምልክቶች እንደ በሽታው ደረጃ እና የግለሰቦች የሲዲ 4 ብዛት ይወሰናል። የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ሦስት ደረጃዎች አሉ፣ እነሱም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

መድረክ 1

አጣዳፊ የመጀመሪያ ደረጃ ኢንፌክሽን የኤችአይቪ ኢንፌክሽን የመጀመሪያ ደረጃ ነው። ብዙውን ጊዜ ሰውየው በኤች አይ ቪ ከተያዘ በኋላ ከ 2 እስከ 4 ዓመታት ውስጥ ያድጋል። በዚህ ደረጃ ቫይረሱ በፍጥነት ይባዛል እና በሰውነት ውስጥ ይሰራጫል። በዚህ ደረጃ ላይ በሽታውን የማሰራጨት እድሉ ከፍተኛ ነው። ግለሰቦች እንደ ትኩሳት ያሉ የጉንፋን ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ። ራስ ምታት፣ እና በዚህ ደረጃ ላይ ሽፍታ።

መድረክ 2

የከሊኒካዊ መዘግየት ደረጃ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ሁለተኛ ደረጃ ነው። በተጨማሪም እንደ አሲምፕቶማቲክ ኤችአይቪ ኢንፌክሽን ወይም ሥር የሰደደ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ይባላል። በዚህ ደረጃ፣ ቫይረሱ ቀስ በቀስ መጨመሩን ይቀጥላል፣ ነገር ግን በሽተኛው ምንም ልዩ ምልክቶች ወይም ምልክቶች የሉትም። አንዳንድ ግለሰቦች የሊምፍ ፕሮፓቸው የማያቋርጥ እብጠት ሊኖራቸው ይችላል። በዚህ ደረጃ ትክክለኛ ህክምና ካልተደረገ ኢንፌክሽኑ ወደ ኤድስ ሊሄድ ይችላል። ይህ ደረጃ ምንም ዓይነት ሕክምና በማይደረግላቸው ታካሚዎች ላይ እስከ 10 ዓመታት ሊቆይ ይችላል።

መድረክ 3

ኤድስ በጣም የከፋ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ደረጃ ነው። በዚህ ደረጃ የበሽታ መከላከል ስርዓት በጣም ተጎድቷል። ኤች አይ ቪ ኤድስ ያለበት ሰው ኤድስ አለበት የሚባለው ኤድስን የሚገልጽ ሕመም ወይም የሲዲ 4 ሕዋስ ከ200 ሴሎች/mm3 በታች ነው።

ኤድስን የሚገልጽ በሽታ በኤችአይቪ በተያዙ ሰዎች ላይ የሚከሰት ወሳኝ በሽታ ነው። በዚህ ደረጃ ሰውነትን ከኢንፌክሽን እና ከካንሰር የሚከላከለው የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ጉልህ የሆነ ጠብታ ይከሰታል። እነዚህ የበሽታ መከላከያዎች በመቀነሱ ምክንያት የሚከሰቱ አፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽኖች ወይም ካንሰሮች ሊሆኑ ይችላሉ።

አፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽኖች ደካማ የበሽታ መከላከያ ስርዓት ባለባቸው በሽተኞች ውስጥ በከፍተኛ ድግግሞሽ የሚከሰቱ ኢንፌክሽኖች ናቸው።

ምሳሌዎች ያካትታሉ ፡፡

- Candidiasis የአፍ፣ የኢሶፊገስ እና የሴት ብልት
- የሳንባ ነቀርሳ
- የማይክሮባክቴሪያል ኢንፌክሽኖች
- ክሪፕቶኮካል ማጅራት ገትር
- ክሪፕቶስፖሪሲስ
- በደም ውስጥ ያለው የሳልሞኔላ ኢንፌክሽን
- የሳይቶሜጋሎቫይረስ የዓይን ኢንፌክሽን
- ቶክስፕላስሞሲስ
- የፀረ-ተባይ በሽታ የሳምባ ነቀርሳ
- ሂስቶፕላስሞሲስ
- Coccidiomycosis
- የሄሮፒስ ስፕሌክስ ቫይረስ ኢንፌክሽን
- የአፍ ፀጉር ሉኮፕላኪያ

አንዳንድ ካንሰሮችም በኤድስ በተያዙ ግለሰቦች መካከል በከፍተኛ ድግግሞሽ ይከሰታሉ። እነዚህም ያካትታሉ፡፡

- ሊምፎማም
- ካፖሲ ሳርኮማ
- የማላጸን ነቀርሳዎች

ከዚህ በተጨማሪ ኤድስ ማባከን ሲንድሮም ሊያስከትል ይችላል፡፡ ታካሚዎች ረዘም ላለ ጊዜ ያጋጥማቸዋል ተቅማት፣ ትኩሳት እና ከባድ ክብደት መቀነስ፡፡

ኤድስ መዘባረቅ ውስብስብ የኤድስ የነርቭ ችግሮች ቡድን ነው፡፡ እንደ ግራ መጋባት፣ የመርሳት ችግር እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴን የመሳሰሉ የመራመድ አካል ያሉ የአዕምሮ ለውጦችን ያስከትላል፡፡

በዚህ ደረጃ ላይ ትክክለኛ ህክምና ካልተደረገ፣ በሽተኞቹ ከ 3 ዓመት ያልበለጠ ጊዜ ውስጥ ይቆያሉ፡፡

ስለ ኤችአይቪ እና የመተላለፊያ መንገዶች በቂ እውቀት ማግኘት ለኤችአይቪ የመጋለጥ እድልን የሚጨምር ቀዳሚ ምክንያት ነው፡፡ የኤችአይቪ ኢንፌክሽን በማንኛውም ግለሰብ ላይ የግብረ-ሥጋ ዝንባሌያቸው፣ ዘር፣ ጾታ፣ ሥራ ወይም ማህበራዊ ሁኔታ ሳይለይ ሊከሰት ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ አንዳንድ ልምዶች እና የአኗኗር ዘይቤዎች በኤችአይቪ ኢንፌክሽን የመያዝ እድልን ይጨምራሉ፡፡ እነዚህ ልምዶች የኤችአይቪ ኢንፌክሽን አደጋን ስለሚጨምሩ የአደጋ መንስኤዎች ተብለው ይጠራሉ፡፡

ለኤድስ እንድትጋለጥ ከሚያደርጉት አንዳንድ የተለመዱ የአደጋ ምክንያቶች ከዚህ በታች ተብራርተዋል፡፡

ደህንነቱ ያልተጠበቀ ወሲብ

ጥንቃቄ የሳይለው ወይም ጥንቃቄ የሳይለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማለት ኮንዶም ሳይጠቀሙ ማንኛውንም የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማለት ነው፡፡ ደህንነቱ ያልተጠበቀ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ለኤችአይቪ ኢንፌክሽን ቀዳሚ ተጋላጭነት ነው፡፡ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ጥንቃቄ የሳይለው የሴት ብልት፣ የአፍ ወይም የፊንጢጣ ግንኙነት ሲፈጽሙ፣ ኤችአይቪ የያዙ የሰውነት ፈሳሾች መለዋወጥ ይከሰታል፡፡ ቫይረሱ ከወሲብ ፈሳሾች ወደ ሰውነትዎ ይገባል፡፡

በርካታ የወሲብ አጋሮች

ብዙ የጾታ አጋሮች ባለው ግለሰብ ላይ የኤድስ ስጋት በጣም ከፍተኛ ነው ምክንያቱም በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት የመፈጸም እድልን ይጨምራል፡፡ ካልተበከለ ግለሰብ ጋር ነጠላ ግንኙነት ኤችአይቪ ኢንፌክሽን እንዳይይዝ ይጠበቅዎታል፡፡

በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፍ ኢንፌክሽን

እንደ ቂጥኝ፣ ኸርፒስ እና ጨብጥ ያሉ በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች መኖራቸው በኤች አይ ቪ የመያዝ እድልን ይጨምራል ምክንያቱም በብልት ሕብረ ሕዋሳት ላይ ለውጥ ስለሚያመጣ እና የኤችአይቪ ስርጭት ተጋላጭነትን ይጨምራል፡፡ በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ሌሎች በሽታዎች ያጋጠማቸው ሰዎች ጨብጥ በኤች አይ ቪ የመያዝ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው፡፡

ደህንነቱ ያልተጠበቀ የክትባት ልምዶች

ደህንነቱ ያልተጠበቀ የክትባት ልምዶች አንድ አይነት መርፌን ፣ መርፌን ወይም መርፌን ጠርሙስን ለብዙ ግለሰቦች መጠቀም ፣ ነጠላ መርፌዎችን እንደገና መጠቀም እና ያገለገሉ መርፌዎችን እና ሹል መሳሪያዎችን አላግባብ መጣልን ያካትታሉ፡፡ የዓለም ጤና ድርጅት (WHO) እንዳለው ከሆነ ወደ 5% የሚጠጉ የኤችአይቪ ኢንፌክሽኖች የተከሰቱት ደህንነቱ ባልተጠበቀ የክትባት ልምዶች ምክንያት ነው፡፡ የተበከሉ መርፌዎችን እና መርፌዎችን በመጠቀም ኤችአይቪ ከተያዘው ሰው ወደ ጤናማ ሰው የመተላለፍ እድልን ይጨምራል፡፡

የኢደገኛ ዕፅ አጠቃቀም

ሕገወጥ መድኃኒቶችን የሚወጉ ግለሰቦች መርፌዎቻቸውን የመጋራት እድላቸው ሰፊ ነው፡፡ ጥናቶች እንደሚያሳዩት መድኃኒት የሚወጉ ግለሰቦች በኤችአይቪ ኢንፌክሽን የመያዝ እድላቸው በ28 እጥፍ ይበልጣል፡፡ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች የሚጠቀሙባቸው መርፌዎች፣ መድኃኒቶችን ለመወጋት፣ ባዶ እና ከፍተኛ መጠን ያለው የተበከለ ደም ሊሸከሙ ይችላሉ፡፡ ያልተበከለው ግለሰብ ተመሳሳይ መርፌን ሲጠቀም ቫይረሱ ከተበከለው ደም ጋር ወደ ሰውነት ውስጥ ይገባል፡፡

ንጽህና ያልሆነ የሕክምና ልምድ

የግል መከላከያ መሳሪያዎችን ሳይለብሱ የደም እና የሰውነት ፈሳሽ ናሙናዎችን አያያዝ ፣ መርፌዎችን እና መርፌዎችን እንደገና መጠቀም ፣ በቂ ያልሆነ የበሽታ መከላከያ ዘዴዎች እና ተገቢ ያልሆነ የቆሻሻ አያያዝ ያሉ ንጽህና የሳይላቸው የሕክምና ልምዶች በታካሚዎች እና በጤና ባለሙያዎች መካከል የኤችአይቪ ኢንፌክሽን አደጋን ይጨምራሉ ፡፡

በተቃራኒው ኤች አይ ቪ በሚከተሉት ዘዴዎች አይተላለፍም

- ኤችአይቪ ፖዘቲቭ ከሆነ ሰው ጋር በአንድ ቤት ውስጥ መኖር
- መሳም፣ መጨባበጥ እና መተቃቀፍ
- የነፍሳት ንክሻ ፣ የእንስሳት ንክሻ እና የሰዎች ንክሻ
- በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ምግብ መጋራት

- እንደ ዕቃዎች እና ልብሶች ያሉ መጣጥፎችን ማጋራት።

ሴሮሎጂካል ምርመራዎች የኤችአይቪ ኢንፌክሽንን ለመለየት በጣም የተለመዱ ዘዴዎች ናቸው። በዚህ ምርመራ ውስጥ የፓቶሎጂ ባለሙያው በቫይረሱ የተያዙ ፀረ እንግዳ አካላት በተበከለው ሰው ደም ውስጥ መኖሩን ይመለከታል። ለኤችአይቪ ከተጋለጡ ቀደም ብሎ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ ነው።

የኤችአይቪ ፀረ እንግዳ አካላት አብዛኛውን ጊዜ ለቫይረሱ ከተጋለጡ ከ 3 እስከ 12 ሳምንታት ያድጋሉ። ቀደም ብሎ መሞከር የተጎዳው ሰው ተገቢውን ህክምና እንዲያገኝ እና ከፍተኛ ስጋት ያላቸውን ባህሪያት በማስወገድ ኤችአይቪን ወደ ጤናማ ሰዎች የመተላለፍ እድልን ይቀንሳል።

የኤችአይቪ ኢንፌክሽንን ለመመርመር ሴሮሎጂካል ምርመራዎች ናቸው።
የኤችአይቪ-ኤሊጎ ሙከራ

ኢንዛይም-የተገናኘ የበሽታ መከላከያ ምርመራ (HIV-ELISA) የኤችአይቪ ኢንፌክሽንን ለመለየት የሚያገለግል ምርመራ ነው። ኤችአይቪ-ኤሊጎ በደም ውስጥ ለኤች አይ ቪ ፀረ እንግዳ አካላትን ይለያል። የፓቶሎጂ ባለሙያው ከደምም ናሙና ትንሽ ወደ ELISA ሳህን ያስቀምጣል ከዚያም ኢንዛይም ይጨምርበታል። ከዚያም እሱ ወይም እሷ ደምም እና አንቲጂን እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ ይመለከታሉ። ደምም የኤችአይቪ ፀረ እንግዳ አካላት ካለው የ ELISA ጠፍጣፋ ቀለም ይለወጣል። የቀለም ለውጥ ጥንካሬ የሚወሰነው በደም ናሙና ውስጥ በሚገኙ ፀረ እንግዳ አካላት ብዛት ላይ ነው።

ኤችአይቪ-ኤሊጎ በየደረጃው ባለው እድገት መሰረት በ1ኛ፣ 2ኛ፣ 3ኛ እና 4ኛ ትውልዶች ተከፋፍሏል። በአሁኑ ጊዜ፣ 3 ኛ እና 4 ኛ ትውልድ ኤችአይቪ - ELISAs በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ። የአራተኛው ትውልድ ኤችአይቪ-ኤሊጎ ሁለቱንም ፀረ እንግዳ አካላት እና አንቲጂኖች መለየት ይችላል። ስለዚህ፣ ቀደም ባሉት ጊዜያት ኢንፌክሽኑን ሊያውቁ ይችላሉ።
የኤችአይቪ ካርድ ምርመራ

የኤችአይቪ ካርድ ምርመራዎች በደም ውስጥ ያሉ ፀረ እንግዳ አካላትን በፍጥነት ለመለየት ያገለግላሉ። እነዚህ ፈጣን ናቸው እና በ 20 ደቂቃዎች ውስጥ ውጤቶችን ይሰጣሉ። ለማከናወን ቀላል ናቸው እና በመስክ ሁኔታዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

ኤችአይቪ-CLIA

የኤችአይቪ-ኬሚሎሚንሰንት ምርመራ የኤችአይቪ-ኤሊጎ ልዩነት ሲሆን የሚከናወነው አውቶማቲክ መሳሪያዎችን በመጠቀም ነው። እነዚህ ሙከራዎች በጣም ስሜታዊ ናቸው እና የኬሚሊሚኒዝምን መርህ ይጠቀማሉ።

የምዕራባዊ Blot ሙከራ

በደም ውስጥ ያሉ በርካታ የኤችአይቪ ፀረ እንግዳ አካላትን ለመለየት የሚያገለግል የደም ምርመራ ነው። የምዕራባዊው የብሎት ሙከራ ሂደት በልዩ የመጥፋት ወረቀት ላይ ተከታታይ ፕሮቲኖችን የያዘ ንጣፍ ይፈልጋል። የደም ናሙናው ከወረቀት ንጣፍ ጋር ምላሽ እንዲሰጥ ይደረጋል። አንድ ኢንዛይም የቀለም ለውጥ ለማምጣት እና ፀረ እንግዳ አካላትን ለመለየት ጥቅም ላይ ይውላል። ሰውዬው በኤችአይቪ ከተያዘ፣ ብዙ ባለ ቀለም ባንዲራዎች በጭረት ላይ ይታያሉ።

የቫይረስ ጭነት ሙከራ

የሕክምናውን ሂደት ለመከታተል ወይም ቀደምት የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ለመለየት ጥቅም ላይ ይውላል። በደምም ውስጥ ያለውን የኤችአይቪ መጠን ይለካል። የቫይረሱን የጄኔቲክ ቁሳቁሶችን የሚለዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ሊከናወን ይችላል። እነዚህ የተገላቢጠሽ ግልባጭ-ፖሊመራሴ ሰንሰለት ምላሽ (PCR)፣ የቅርንጫፍ ዲ ኤን ኤ ምርመራ (bDNA) እና ኑክሊክ አሲድ ቅደም ተከተል-ተኮር የማጉላት ሙከራዎች (NASBA) ያካትታሉ።

የመስኮት ጊዜ

የኤችአይቪ የመስኮት ጊዜ በኤች አይ ቪ የመጀመሪያ ኢንፌክሽን ወዲያውኑ የሚከተል ሲሆን በዚህ ጊዜ ኢንፌክሽኑ ጥቅም ላይ በሚውሉ ሙከራዎች የማይታወቅ ነው። በመስኮቱ ወቅት፣ በሽተኛው በከፍተኛ ሁኔታ ተይዟል ነገር ግን የኤችአይቪ ምርመራዎች አሉታዊ ናቸው። አብዛኛዎቹ ሰዎች ከ 3 እስከ 12 ሳምንታት በቫይረሱ የተያዙ ፀረ እንግዳ አካላትን ለኤች አይ ቪ ይይዛሉ። ለአራተኛ-ትውልድ ELISA፣ የመስኮቱ ጊዜ ብዙውን ጊዜ 4 ሳምንታት ነው። የቫይረሱ ሎድ ምርመራዎች ኤችአይቪ ኑክሊክ አሲድ በአማካይ በ14 ቀናት ውስጥ ሊያገኙ ይችላሉ። በመስኮቱ ጊዜ ምክንያት የኤችአይቪ ምርመራ ከተጋለጡ በኋላ መጀመሪያ ላይ አሉታዊ ከሆነ፣ ምርመራው ከ2-3 ወራት በኋላ መደገም አለበት።

ለኤድስ/ኤችአይቪ መድሀኒት ባይኖርም መድሃኒቶች የቫይረሱን መባዛት በመቀነስ የኤችአይቪን ውስብስብ ችግሮች ማከም

ይችላሉ። በኤድስ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ መድሃኒቶች የፀረ ኤችአይቪ ሕክምና በመባል ይታወቃሉ። በሰውነት ውስጥ ያለውን የቫይረስ ቁጥር ይቀንሳሉ፣ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ያሻሽላሉ እና ከኤድስ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ያከማሉ።

ሐኪሙ ህክምናውን ከመሾሙ በፊት የቫይረስ ጭነትዎን እና የሲዲ 4 ህዋሶችን ብዛት ይመረምራል። በሕክምናው ወቅት የቫይረስ ሎድ በየ 3 ወሩ እና የሲዲ 4 ቆጠራ በየ 3 እና 6 ወሩ ቁጥጥር ይደረግበታል የሕክምናውን ውጤታማነት ይገመግማል።

ለኤድስ ሕክምና የሚውሉ አንዳንድ መድኃኒቶች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል።

- የተገላቢጦሽ ትራንስክሪፕትሴስ ኢንቶኒክላምሳል ላሚቩዲን፣ ዚዶቩዲን፣ ዲዳኖሲን፣ ኔቪራፒን እና ቴኖፎቪር ያካትታሉ።
- መከላከያዎችን የሚያግድ መከላከያለምሳሌ Indinavir፣ Ritonavir እና Nelfinavir ያካትታሉ
- **Fusion inhibitors**ምሳሌ Enfuvirtide

በኤች አይ ቪ የተያዙ ግለሰቦች በርካታ የፀረ-ኤችአይቪ መድሃኒቶችን ጥምረት መውሰድ አለባቸው። ከተለያዩ ክፍሎች የተውጣጡ ቢያንስ ሦስት መድኃኒቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ። እነዚህ ውህዶች HAART ወይም በጣም ንቁ የሆነ የፀረ-ኤችአይቪ ሕክምና ይባላሉ።

እነዚህ መድሃኒቶች በኤችአይቪ ኢንፌክሽን ከተያዙት ነፍሰ ጡር እናት ወደ ሕፃኑ እንዳይተላለፉ ለመከላከል ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት ሁሉም እርጉዝ ሴቶች የኤችአይቪ ምርመራ እንዲያደርጉ የዓለም ጤና ድርጅት ይመከራል። በተጨማሪም፣ ART በተጨማሪም በጤና አጠባበቅ ሰራተኞች ላይ በኤች አይ ቪ የመያዝ እድልን ለመቀነስ በተበከለ መርፌ በኢጋጣሚ መወጋቱን ያገለግላል።

ጋር የተያያዙ የተለመዱ የጎንዮሽ ጉዳዮች ፀረ-ኤችአይቪ መድሃኒቶች ናቸው

- ድካም
- የማስታወክ ስሜት
- ትኩሳት
- ችፍታ
- ተቅማት
- ማስታወክ
- የማዞር
- እንቅልፍ አለመወሰድ
- በጉንፋን የተዘጋ ጉሮሮ
- ማላጠብ
- ራስ ምታት
- በጌቴሰማኒ
- የሆድ ውስጥ
- የምግብ አለመንሸራሸር
- የሆድ ድርቀት
- የሆድ ህመም
- የምግብ ፍላጎት ማጣት
- የጉሮሮ መበሳጨት
- በጣዕም ስሜት መለወጥ
- በእጆቹ እና በእግሮቹ ላይ የማቃጠል ስሜት

ከባድ ተፅዕኖዎች ያካትታሉ

- በቆሽት ላይ የሚደርስ ጉዳት
- በሰውነት ስብ ውስጥ ለውጦች
- ጅምር ወይም የከፋ የስኳር በሽታ

- በደም ውስጥ ያለው ከፍተኛ የስኳር እና የሰብ መጠን
- ሄሞጊኒን ያለባቸው ታካሚዎች የደም መፍሰስ መጨመር

ከፀረ-ኤችአይቪ መድሃኒቶች ጋር የተያያዙ ሌሎች ችግሮች የመድሃኒት ግንኙነቶች

ፀረ-ኤችአይቪ መድሃኒቶች ከሌሎች ጋር ሊገናኙ ይችላሉ። እነዚህ የመድሃኒት መስተጋብር በሰውነትዎ ላይ የማይፈለጉ ውጤቶችን ሊያስከትሉ ስለሚችሉ ሌሎች መድሃኒቶችን የሚወስዱ ከሆነ ለሐኪምዎ ያሳውቁ።
የአደንዛዥ ዕፅ መከላከያ

አንዳንድ ጊዜ ኤች አይ ቪ በሰውነት ውስጥ በሚራባበት ጊዜ ሚውቴሽን (ሚውቴሽን) ይደርስበታል እና መድሃኒቶቹን የመቋቋም ችሎታ ያዳብራል። በዚህ ሁኔታ ኤችአይቪን ከዚህ ቀደም የተቆጣጠሩት የኤችአይቪ መድሃኒቶች ውጤታማ ላይሆኑ ይችላሉ እናም ግለሰቡ በሰውነት ውስጥ የኤችአይቪ ስርጭትን ለመቆጣጠር አዳዲስ መድሃኒቶችን ሊፈልግ ይችላል። ደካማ ታካሚ ከኤችአይቪ መድሃኒቶች ጋር መጣጣም መድሃኒቱን የመቋቋም እድልን ይጨምራል እናም የሕክምናው ውድቀት ያስከትላል።

በኤችአይቪ ኢንፌክሽን ላይ ምንም አይነት ክትባት የለም። እነዚህን ምክሮች በመከተል በኤችአይቪ ኢንፌክሽን ወይም በኤድስ የመያዝ እድልን መቀነስ ይችላሉ፡-

- **ደህንነቱ ያልተጠበቀ የግብረ ሥጋ ግንኙነትን ያስወግዱ**። ብልት፣ በፊንጢጣ ወይም በአፍ የሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ባደረጉ ቁጥር ኮንዶም ይጠቀሙ።
- **ከበርካታ የወሲብ አጋሮች መራቅ** አይ ቪ የመያዝ እድልን ስለሚጨምር ከአንድ በላይ የግብረ-ሥጋ ግንኙነትን ያስወግዱ።
- **የትዳር ጓደኛዎን የኤችአይቪ ሁኔታ ይወቁ**። ኤችአይቪ ምርመራ ከባልደረባዎ ጋር ይወያዩ እና የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከመፈጸም በፊት እሱን ወይም እሷን የኤችአይቪ ምርመራ ያድርጉ።
- **ዕፅ አላግባብ መጠቀምን ያስወግዱ**። የኤችአይቪ አደጋን ሊጨምር ስለሚችል አደንዛዥ ዕፅን አላግባብ መጠቀምን ያስወግዱ።
- **የጸዳ መርፌዎችን ይጠቀሙ**። ኢንፌክሽንን ስለሚያስተላልፍ የተበከሉ መርፌዎችን ከመጠቀም ይቆጠቡ። የጸዳ መርፌዎችን ተጠቀም እና መሳሪያህን በጭራሽ ከሌሎች ጋር አታጋራ።
- **አፋጣኝ ህክምና ይቀበሉ**። ኤች አይ ቪ የተያዙ ነፍስ ጡር እናቶች ልጃቸውን ከኤችአይቪ ለመጠበቅ ተገቢውን እና አፋጣኝ ህክምና መውሰድ አለባቸው።

ኤችአይቪ/ኤድስ፡- መንስኤዎች፣ ምልክቶች እና ህክምና

ኤች አይ ቪ ኢላማ ያደርጋል እና በሽታ የመከላከል ስርዓትን ያዳከማል። ይህም የሌሎችን ኢንፌክሽኖች እና ነጥቦችን አደጋ እና ክብደት ይጨምራል። ኤች አይ ቪ በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፍ በሽታ (STI) ነው። በተጨማሪም ለተበከለ ደም በመጋለጥ፣ በተበከለ መርፌ ወይም በመርፌ በመጋራት ሊተላለፍ ይችላል። በእርግጥና፣ በወሊድ ወይም በነርሲንግ ከእናት ወደ ልጅ ሊተላለፍ ይችላል። ህክምና ካልተደረገለት ኤችአይቪ በሽታ የመከላከል አቅምን ለማዳከም ኤድስን እስኪያዳከም ድረስ አመታትን ሊወስድ ይችላል።

ኤችአይቪ/ኤድስ መድኃኒት የለውም፤ ይሁን እንጂ መድሃኒቶች ኢንፌክሽኑን ለመቆጣጠር እና በሽታው እንዳይከሰት ይረዳል። እንደ እድል ሆኖ፣ ውጤታማ የኤችአይቪ ሕክምና (የፀረ-ኤችአይቪ ሕክምና ወይም ART በመባል የሚታወቀው) ይገኛል። ኤችአይቪ ያለባቸው ሰዎች የኤችአይቪ መድሃኒቶቻቸውን በታዘዘላቸው መሰረት ወስደው ያልታወቁ የኢንፌክሽን መጠን የሚይዙ እና ረጅም እድሜ ያላቸው እና ኤችአይቪ-አሉታዊ ለሆኑ አጋሮቻቸው በወሲብ አይተላለፉም።

የኤችአይቪ / ኤድስ መንስኤዎች

የሰው ልጅ የበሽታ መከላከያ ቫይረስ የሰው ልጅ ፊትሮቫይረስ ቤተሰብ እና የኤችአይቪ ኤድስ መንስኤ የሆኑትን የሌንስ ቫይረስ ቤተሰብ ነው። ኤች አይ ቪ በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፍ ኢንፌክሽን (STD) ነው። ኤች አይ ቪ ኤድስን ያስከትላል። ኤች አይ ቪ በሽታ የመከላከል ስርዓትን የሚያጠቃ ቫይረስ ነው። ኤች አይ ቪ ቀስ በቀስ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ስለሚጎዳ የሰውነት በሽታ የመከላከል አቅም እየተባባሰ በመምጣቱ ለብዙ አፖርቼኒካዊ ኢንፌክሽኖች ተጋላጭ ያደርገዋል። ኤድስ የላቀ የኤችአይቪ ዓይነት ነው። ኤድስ ለማደግ ብዙ ዓመታት ሊወስድ ይችላል።

ዶክተር መቼ ማየት ነው?

አንድ ሰው ከቫይረሱ ጋር እንደተገናኘ ከጠረጠረ። የበሽታውን ትክክለኛ ምርመራ ለማግኘት ወዲያውኑ ዶክተር ያማክሩ።

የኤችአይቪ/ኤድስ ስጋት ምክንያቶች

- የግብረ-ሥጋ ግንኙነት፡ የቫይረሱ ስርጭት በጣም የተለመደው መንስኤ ጥንቃቄ በሌለው የሴት ብልት ወይም የፈንጢጣ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ነው።
- ደም መስጠት፡- አንድ ሰው በኤች አይ ቪ የተበከለ ደም በመውሰድ ቫይረሱን ሊይዝ ይችላል።
- የተበከሉ መርፌዎችን መጋራት፡ ኤች አይ ቪ የተበከሉ መርፌዎችን እና መርፌዎችን በመጠቀም ሊተላለፍ ይችላል።
- ከእናት ወደ ልጅ፡ ቫይረሱ ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፈው በወሊድ ጊዜ ወይም ከመውለዱ በፊት እና በነርሲንግ ጊዜም ጭምር ነው።
- የሰውነት ፈሳሾች፡- እነዚህ ፈሳሾች እንደ ደም፣ ስፕርም፣ የሴት ብልት ፈሳሽ፣ የጡት ወተት፣ በፅንሱ ዙሪያ ያሉ የአሞኒቲክ ፈሳሾች እና በአንጎል እና በአከርካሪ ገመድ ዙሪያ ያሉ ሴሬብሮስፒናል ፈሳሾች የኤችአይቪ ኢንፌክሽንን እንደሚያስራጭ ታይቷል።
- ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማድረግ፡- አብዛኛው ሰው ኤችአይቪ የሚይዘው ከተጠበቀው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ነው። ቫይረሱ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት በሰው አካል ውስጥ በፊንጢጣ፣ በአፍ እና በጾታ ብልት በኩል ይገባል ። ይህንን ለመከላከል ጥበቃ ዋቅም ላይ መዋል አለበት። የኮንዶም አጠቃቀም በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎችን የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል።
- የመድሃኒት አጠቃቀም፡- ሌሎች የሚጠቀሙባቸውን መርፌዎች መጋራት በኤች አይ ቪ የመያዝ እድልን ይጨምራል። ኤች አይ ቪን ለማስተላለፍ ትንሽ መጠን ያለው ደም በቂ ነው።
- የተወሰኑ የጤና ጉዳዮች፡- በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ነጥቦችን መኖሩ በኤች አይ ቪ የመያዝ እድልን ይጨምራል። [ጨብጥ ኪንታርት](#) ቂጥኝ እና የብልት ሄርፒስ በጣም ብዙ ናቸው።
- የደም ተዋጽኦዎች፡- የደም ባንኮች የኤችአይቪ ምርመራ ባለማድረጋቸው ቫይረሱ ደም ከተሰጠ በኋላ ወደ ጤናማ ሰዎች ሊተላለፍ ይችላል።
- የተወሰኑ መያዎች መኖር፡- ሰዎች ከታካሚ የሰውነት ፈሳሽ ጋር በሚገናኙበት ሁኔታ ውስጥ መሥራት እና የደም ናሙናዎች በኤች አይ ቪ የመያዝ እድልን ይጨምራሉ። እንደ የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች እና በቤተ ሙከራ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች።

የኤችአይቪ / ኤድስ ውስብስቦች

የኤችአይቪ ኢንፌክሽን በሽታን የመከላከል አቅምን ይጎዳል, የኢንፌክሽን እና አንዳንድ የካንሰር ዓይነቶችን ይጨምራል.

ለኤችአይቪ/ኤድስ የተለመዱ ኢንፌክሽኖች

- ካንዲዳይስ፡- ካንዲዳይስ የተለመደ የፈንገስ በሽታ ጨረባና በመባል ይታወቃል። ቀላል የእይታ ምርመራ ከተደረገ በኋላ በፀረ-ፈንገስ መድሃኒቶች ሊታከም ይችላል።
- Coccidioidomycosis፡ ይህ የተለመደ የፈንገስ በሽታ ሊያስከትል ይችላል [የሳምባ ነቀርሳ](#) ካልታከመ።
- ክሪፕቶኮክስ፡- ይህ የፈንገስ ኢንፌክሽን ብዙውን ጊዜ ወደ ሳንባ ውስጥ በመግባት በፍጥነት ወደ አንጎል በመተላለፉ ክሪፕቶኮካል ገትር ገትር በሽታ ያስከትላል። ይህ የፈንገስ ኢንፌክሽን ብዙ ጊዜ ካልታከመ ገዳይ ነው።
- ክሪፕቶስፖሪዲዮሲስ፡ ክሪፕቶስፖሪዲዮሲስ የተቅማጥ በሽታ ሲሆን በተደጋጋሚ ወደ ሥር የሰደደ በሽታ ይለወጣል። በከባድ ተቅማጥ እና [የሆድ ቁርጠት](#)።
- ሳይቲሚጋሎቫይረስ፡- ይህ የተለመደ ቫይረስ በአብዛኛዎቹ ሰዎች በሕይወታቸው ውስጥ በሆነ ወቅት ላይ የሚያጠቃ ሲሆን ብዙ ጊዜ እንደ ዓይን ወይም የጨጓራና ትራክት በሽታ ይታያል።
- የሳንባ ነቀርሳ (ቲቢ)፣ [የሳንባ ነቀርሳ \(ቲቢ\)](#) ቲዩበርክሎዝስ ከኤችአይቪ ጋር የተያያዘ ተደጋጋሚ የአጋጣሚ በሽታ ነው።
- Toxoplasmosis፡ ድመቶች በዋነኝነት የሚዛመቱት ቶክሶፕላስማ ጎንዲ በተሰኘው ጥገኛ ተውሳክ ነው። የተበከሉ ድመቶች ተውሳኮችን ያስወጣሉ, ይህም ሰዎችን ጨምሮ ወደ ሌሎች እንስሳት ሊተላለፉ ይችላሉ። Toxoplasmosis ወደ አንጎል ሲሰራጭ የልብ ሕመም እና የሚጥል በሽታ ሊያስከትል ይችላል።

ለኤችአይቪ/ኤድስ የተለመዱ ካንሰሮች

- ሊምፎማ፡ ይህ ካንሰር የሚጀምረው በነጭ የደም ሴሎች ውስጥ ነው። የመጀመሪያው ምልክቱ ህመም የሌለባቸው የሊምፍ ኖዶች በአንገትዎ፣ በብብትዎ ወይም በብሽቱ ላይ መኖሩ ነው።
- የካፖዚስ ሳርኮማ፡- የካፖዚስ ሳርኮማ የደም ቧንቧ ግድግዳዎች እጢ ሲሆን በቆዳ እና በአፍ ላይ እንደ ሮዝ፣ ቀይ ወይም ወይን ጠጅ ቁስሎች በብዛት ይበቅላል። Kaposi's sarcoma እንደ የምግብ መፍጫ ቱቦ እና ሳንባ ያሉ የውስጥ አካላትን ሊጎዳ ይችላል።
- ከ HPV ጋር የተያያዙ ካንሰሮች፡ በሰው ፓፒሎማ ቫይረስ (HPV) ኢንፌክሽን ምክንያት የሚመጡ ካንሰሮች ከ HPV ጋር የተያያዙ ካንሰሮች ተብለው ይጠራሉ። የፊንጢጣ፣ የአፍ እና የማህፀን በር ካንሰሮች ይገኙበታል።

ሌሎች ችግሮች

- ማባከን ሲንድሮም፡ ኤች አይ ቪ / ኤድስ ከፍተኛ ከብደት መቀነስ ሊያስከትል ይችላል፣ ብዙ ጊዜ ተቅማጥ ጋር አብሮ፣ [የማያቋርጥ ድካም](#) እና ትኩሳት.
- ኒውሮሎጂካል ችግሮች፡ ኤችአይቪ እንደ ግራ መጋባት፣ የመርሳት ችግር፣ ሜላሮሲያ፣ ጭንቀት እና የመራመድ ችግር ያሉ የነርቭ ችግሮች ሊያዳብር ይችላል። ከኤችአይቪ ጋር የተገናኙ የኒውሮኮሚኒቲቭ መዛባቶች (HAND) ከጥቃቅን የባህሪ ለውጦች እና የተዳከመ የአእምሮ ስራ ወደ ከባድ ይለያያሉ [የአእምሮ ህመም](#) ድካም እና የመሥራት ችግርን የሚያስከትል.
- የኩላሊት በሽታ፣ [የኩላሊት በሽታ](#)፣ ከኤችአይቪ ጋር የተገናኙ ኔፍሮፓቲ (ኤችአይቪን) በኩላሊቶች ውስጥ ባሉ ትናንሽ ማጣሪያዎች ላይ የሚከሰት እብጠት በሽታ ሲሆን ከመጠን በላይ ፈሳሽ እና መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ከደም ውስጥ ያስወግዱ እና ወደ ሽንት ይላካሉ።
- የጉበት በሽታ፡- የጉበት በሽታ ሌላው ትልቅ ችግር ነው፣በተለይ ሄፓታይቲስ ቢ ወይም ሲ ባለባቸው ሰዎች ላይ።

የኤችአይቪ / ኤድስ መከላከያ

ለኤችአይቪ ተጋላጭነትዎን ለመቀነስ በጣም ጥሩው መንገድ እንዴት እንደሚሰራጭ መረዳት እና በአንዳንድ እንቅስቃሴዎች እራስዎን መጠበቅ ነው። ያለኮንዶም የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸም እና መድኃኒቶችን ለመውሰድ መርፌ መጋራት የኤችአይቪ ስርጭት በጣም የተለመዱ መንገዶች ናቸው። አደጋን ለመቀነስ አንዳንድ መንገዶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- ከእንስሳት ውጤቶች የተሠሩ ኮንዶምን ከመጠቀም ይቆጠቡ።
- እራስዎን ከኤችአይቪ ለመከላከል፣ ኮንዶም በትክክል መልበስ አስፈላጊ ነው.
- በውሃ ላይ የተመሰረቱ ቅባቶች ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው.
- መድኃኒቶችን ሲጠቀሙ መርፌዎችን በጭራሽ አያካፍሉ.
- ሌሎች የአባላዘር በሽታዎች ለኤችአይቪ የመጋለጥ እድልን ስለሚያሳድጉ መመርመር እና መታከም አለባቸው።
- ላለመስከር ወይም ላለመጨመር ይሞክሩ.
- ለኤችአይቪ የመያዝ እድሉ ከፍተኛ ነው፣ ስለ ቅድመ-መጋለጥ ፕሮፊላክሲስ (PrEP) ሐኪምዎን ያማከሩ።
- ለኤችአይቪ ከተጋለጡ፣ ከድህረ-የተጋለጡ ፕሮፊላክሲስ (PEP) ያስፈልግዎት እንደሆነ ለማወቅ ዶክተርዎን በተቻለ ፍጥነት ይደውሉ።
- ኤችአይቪን ለሌሎች ማስተላለፍ ይችላሉ እንደሆነ ለማወቅ መሞከርን ያስቡበት።

የኤችአይቪ / ኤድስ ምርመራ

አብዛኛዎቹ የኤችአይቪ ኤድስ ያለባቸው ሰዎች ምንም ምልክት የላቸውም እና መያዛቸውን አያውቁም። የኤችአይቪ ኢንፌክሽንን ለማረጋገጥ ብቸኛው ዘዴ ምርመራ ነው. ከኤችአይቪ ከተጋለጡ በኋላ የጉንፋን አይነት ምልክቶች ካጋጠሙዎት እንበል። የኤችአይቪ ምርመራ ቶሎ ቶሎ እንዲታከም እና የበሽታውን ስርጭት ይቀንሳል።

- የፀረ-ሰው ምርመራ፡- ይህ ምርመራ የኤችአይቪ ፀረ እንግዳ አካላትን በደም ወይም በአፍ የሚወሰድ ፈሳሾችን ይፈልጋል እና ኤችአይቪን ከማንኛውም ምርመራ በበለጠ ፍጥነት ያሳያል። ይሁን እንጂ እነዚህ ፀረ እንግዳ አካላት ሊመረቱ የሚችሉት ከበሽታው በኋላ ከሶስት እስከ አስራ ሁለት ሳምንታት ብቻ ነው.
- ጥምር (አንቲጅን/አንቲቦዲ)፡ ጥምር (አንቲጅን/አንቲቦዲ) ምርመራ ደሙን ለኤችአይቪ አንቲጂኖች እና ፀረ እንግዳ አካላት ይገመግማል። አንቲጂኖች የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን የሚቀሰቅሱ የውጭ ኬሚካሎች ናቸው፣ እና ለበሽታው ምላሽ፣ የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት ፀረ እንግዳ አካላትን ያመነጫል. በኤች አይ ቪ ሲያዙ ፀረ እንግዳ አካላት ከመመረታቸው በፊት p-24 የሚባል አንቲጂን ተዘጋጅቷል። ጥምር ምርመራ ኤችአይቪ ኢንፌክሽንን ለመለየት ከ2 እስከ 6 ሳምንታት ይወስዳል።

- የኩዝክ አሲድ ምርመራዎች፡ ኤች አይ ቪ በደም ውስጥ የኩዝክ አሲድ ምርመራዎችን በመጠቀም ተገኝቷል። ይህ ምርመራ አንድ ሰው ከተያዘ ከ 7-28 ቀናት ውስጥ የኤችአይቪ ኢንፌክሽንን መለየት ይችላል። ነገር ግን ይህ ምርመራ ለኤችአይቪ ምርመራ ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ አይውልም።

የኤችአይቪ / ኤድስ ሕክምና

ምንም እንኳን ለኤች አይ ቪ መድሃኒት ባይኖርም፣ ለመቆጣጠር የሚረዱ ብዙ መድሃኒቶች ይገኛሉ። እነዚህ መድሃኒቶች (የፀረ-ኤችአይቪ ሕክምና ወይም ART በመባል የሚታወቁት) ኤች አይ ቪ ኤድስ እንዳይፈጠር በተደጋጋሚ ይከላከላል። ኤች አይ ቪ ወደ ኤድስ ሲቀየር እንኳን የፀረ-ኤችአይቪ መድሃኒት ብዙ ጊዜ ውጤታማ ይሆናል፤ ይሁን እንጂ ቀደም ብሎ ሲጀመር በጣም ውጤታማ ይሆናል።

የኤችአይቪ መድሃኒቶችን ወስደህ ጥሩ ስሜት ቢሰማህም፣ ደህንነቱ ባልተጠበቀ የግብረ ሥጋ ግንኙነት (ያለ ኮንዶም) ወይም በደም ልውውጥ ኢንፌክሽኑን ወደ ሌሎች ማስረጨት ትችላለህ። መድሃኒቶቹ ቫይረሱን አያጠፉም፤ ይልቁንም የኤድስን ስርጭት ለመከላከል ወይም ለመግታት የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን በበቂ ሁኔታ ይይዛሉ። ኤች አይ ቪ ቀደም ብሎ ከታከመ ከፍተኛ የመዳን ደረጃ አለው። ቀደም ብለው የታወቁ ሰዎች ኤች አይ ቪ እስካልያዘ ድረስ በሕይወት ይኖራሉ ብለው ሊጠበቁ ይችላሉ።

መስራት እና ማጣት

ከኤችአይቪ ጋር በሚኖሩበት ጊዜ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን መጠበቅ አጠቃላይ ጤናን ለመጠበቅ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ አስፈላጊ ነው። ሰውነትን በተቻለ መጠን ጤናማ ማድረግ ቫይረሶችን እና ሌሎች ነጥቦችን የመዋጋት ችሎታውን ያሻሽላል። እነዚህ ማድረግ እና አለማድረግ ምልክቶቹን ለመቆጣጠር እና የበሽታውን ጎጂ ውጤቶች ለመከላከል ይረዳዎታል።

አድርግ	አትስሩ
የተጣራ መርፌዎችን ይጠቀሙ	መከላከያ ሳይጠቀሙ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ያድርጉ።
ጤናማ የአኗኗር ዘይቤን ይጠብቁ።	ብዙ የወሲብ አጋሮች ይኑርዎት
ምልክቶቹን ከተጠራጠሩ ለ STD ምርመራ ያድርጉ።	አስቀድመው በሌሎች ጥቅም ላይ የዋሉ መርፌዎችን ይጠቀሙ
ደህንነቱ የተጠበቀ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ያድርጉ - ኮንዶም ይጠቀሙ	ዶክተርዎን ሳያማክሩ መድሃኒቶችን ይጀምሩ
ሐኪምዎን በመደበኛነት ይመልከቱ	የታቀዱትን ዶክተር ቀጠሮ ይዝለሉ

የተለያዩ የኤችአይቪ/ኤድስ ዓይነቶች በዋነኛነት ኤችአይቪ-1 እና ኤችአይቪ-2 አሉ፤ ኤችአይቪ-1 በጣም የተለመደ ነው። የኤችአይቪ/ኤድስ መንስኤዎች በአብዛኛው ጥንቃቄ በሌለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት፣ መርፌ በመጋራት፣ ወይም ከእናት ወደ ልጅ በወሊድ ወይም ጡት በማጥባት ነው። እንደ እድል ሆኖ፣ የኤችአይቪ ኤድስ ሕክምናዎች፣ በዋነኛነት በፀረ-ኤችአይቪ ሕክምና (ART) ቫይረሱን መቆጣጠር፣ ጉዳቱን መቀነስ እና ግለሰቦች ጤናማ ሕይወት እንዲመሩ ያስችላቸዋል።