Norme per la conduzione di un Castagneto da frutto

Allegato "A"

Mantenimento del sottobosco

RIPULITURA ANNUALE DEL SOTTOBOSCO

Andrebbe effettuata almeno due volte l'anno nei mesi di luglio e settembre. La ripulitura consiste in uno sfalcio delle erbe e dei piccoli arbusti cresciuti all'interno del castagneto nella primavera precedente e nella "scacchiatura" (eliminazione) dei riscoppi sviluppatisi alla base del tronco e sul tronco stesso (rami epicormici). Lo scopo è quello di facilitare la raccolta del frutto, favorire l'inerbimento naturale, ridurre la competizione idrica con altre specie e far convergere le risorse nutritive alla chioma.

La ripulitura deve essere effettuata con decespugliatori, falci, roncole, pennati e asce.

Notevole importanza assume il trattamento dei materiali di risulta che vanno eliminati nei seguenti modi: per le erbe falciate si consiglia di lasciarle in loco per non sottrarre massa organica al soprassuolo; per gli arbusti sarebbe auspicabile una cippatura (sminuzzatura del legno asportato in scaglie di dimensioni ridotte, max 3 cm, da effettuare con una cippatrice) seguita dalla distribuzione del cippato al piede delle piante (concimazione). È importante che il cippato non sia composto da residui di castagni infetti che dovranno essere allontanati dal bosco e bruciati

CONCIMAZIONI

In un impianto di castagno, come per tutti i frutteti, è indispensabile effettuare concimazioni.
Per organizzare un piano di concimazioni è necessario conoscere il grado di fertilità del terreno, riscontrabile con le analisi chimiche da richiedere presso enti pubblici e privati (Università, Istituti tecnici agrari, Istituti professionali agrari, ecc).
La concimazione con letame è molto importante per il castagno: si consiglia di effettuarla ogni 2 anni, in ragione di 300-400 q/ha, da distribuire possibilmente in autunno. In mancanza di disponibilità di letame si consiglia di provvedere alla concimazione utilizzando la "pollina" che assicura un corretto apporto di azoto, fosforo e potassio. La concimazione con pollina (ammessa in culture biologiche) è da effettuare ogni anno in ragione di un sacco (25kg) ogni 2/3 piante in base alla dimensione delle piante stesse. La pollina va distribuita in modo uniforme nell'area corrispondente alla proiezione della chioma della pianta stessa.
Sarebbe buona norma, ai fini di un corretto apporto nutrizionale per le piante, la conservazione e utilizzazione in loco delle foglie e dei ricci che annualmente vengono prodotti dalle piante stesse. Foglie e ricci dovrebbero essere sminuzzati (con trincia) o in alternativa accumulati al piede delle piante dove con l'umidità autunno invernale si decomporranno per ritornare al terreno sotto forma di sostanza organica. Per ovviare al problema della dispersione effettuata dal vento si puo' procedere con un modesto interramento delle fogli e dei ricci.

IRRIGAZIONI

I castagni adulti necessitano di apporto idrico durante il periodo dell'ingrossamento dei frutti e dei ricci in corrispondenza dei mesi estivi di luglio - settembre, notoriamente poco piovosi

Mantenimento delle piante

INTERVENTI DI POTATURA

POTATURE DI PULIZIA

Per le piante con numerose branche secche si procede a drastici tagli per rimuoverle. Nel caso di piante di particolare pregio si consiglia di procedere prima ad una concimazione organica in modo da rivitalizzare gli apparati radicali e dopo aver verificato la reazione degli alberi al trattamento, in caso positivo, si potrà procedere alle successive potature per equilibrare le chiome e formarle in modo che siano ben distribuite nello spazio.

POTATURE DI MANTENIMENTO

Sono necessarie potature di rimonda e di regolazione dell'equilibrio vegeto–produttivo per formare una chioma armoniosa. Il rinnovo graduale e leggero consiste nell'eliminare le parti secche e senescenti, le branche che si sovrappongono e quelle che tendono ad andare in alto. L'alleggerimento della chioma consente una migliore penetrazione della luce e uno sviluppo più equilibrato della chioma stessa.

POTATURE DI RINGIOVANIMENTO

E' l'intervento straordinario effettuato su soggetti che mostrano chiome irregolari, senescenti, eccessivamente elevate o espanse che tendono a filare verso l'alto, specialmente se i castagneti sono invasi dalla vegetazione spontanea o i polloni formatisi alla base di tronchi si sono sviluppati in modo rigoglioso. L'eliminazione dei rami distali, ed in parte di quelli laterali, contribuisce a ringiovanire la chioma e a migliorare la sua illuminazione. Si effettua di norma contestualmente alla rimonda del secco. Gli effetti pratici di questo trattamento sono un aumento qualitativo e quantitativo della fruttificazione ed un miglioramento della sicurezza della chioma con indubbi benefici per i successivi interventi colturali in 'tree climbing'. La potatura può essere più o meno intensa. A seconda dei casi si cercherà di preservare quanto più possibile la struttura dell'albero, evitando di intervenire sulle branche più grandi (primo e secondo ordine), se non danneggiate, abbassando la chioma, valorizzando le impalcature più basse e favorendo lo sviluppo di tutti i rami per migliorare l'illuminazione.

Nel caso di piante filate con le branche più basse secche o scarsamente vigorose, l'accorciamento della chioma contribuirà a riformare nuove ramificazioni nella parte inferiore; la luce non costituirà più un fattore limitante e le chiome torneranno ad essere maestose. Se invece le ramificazioni presenti nella parte bassa della chioma sono ben vigorose e ben disposte spazialmente è buona norma lasciarle sulla pianta od eventualmente raccorciarle, affinché la forte vigoria venga indirizzata su questi getti giovani già presenti.

SPOLLONATURA

Alla base dei vecchi castagni spesso si formano nuovi ricacci che sottraggono sostanze nutritive ai rami produttivi. Si deve percio' procedere alla loro eliminazione con tagli decisi.