CORRECTION EXERCICES CHAPITRE N° 1

Description et évolution d'un système vers un état final lors d'une transformation chimique

Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 7 q1 (simplification du volume : solutés et non gaz), ex. 7 q4 (rôle cinétique de l'enzyme).

Exercice n°1 : DENSITÉ D'UN GAZ PARFAIT

correction en ligne

① Pour un gaz parfait de masse molaire M, l'équation d'état s'écrit $PV = nRT$, soit $\frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$. Comme $\rho = \frac{m}{V} = \frac{nM}{V}$, on obtient :

$$\boxed{\rho = \frac{PM}{RT}}$$

② La densité est le rapport $d = \frac{\rho}{\rho_{air}}$ dans les mêmes conditions de P et T. Les facteurs $\frac{P}{RT}$ se simplifient :

$$\boxed{d = \frac{M}{M_{air}}}$$

③ L'air étant assimilé à un mélange de gaz parfaits, sa masse molaire moyenne est la moyenne des masses molaires pondérée par les fractions molaires :

$$M_{air} = 0{,}80\,M_{N_2} + 0{,}20\,M_{O_2} = 0{,}80 \times 28{,}0 + 0{,}20 \times 32{,}0$$

$$\boxed{M_{air} \approx 28{,}8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

④ Avec $M_{CH_4} = 16{,}0$ g·mol^{-1} :

$$d_{CH_4} = \frac{M_{CH_4}}{M_{air}} = \frac{16{,}0}{28{,}8}$$

$$\boxed{d_{CH_4} \approx 0{,}556}$$

Exercice n°2 : DÉCOMPOSITION DE $COBr_2$

correction en ligne

① On dresse le tableau d'avancement (en mol) : $n(COBr_2) = n_0 - \xi$, $n(CO) = n(Br_2) = \xi$, avec $n_0 = 0{,}500$ mol. Les pressions partielles s'écrivent $P_i = \frac{n_i RT}{V_0}$, d'où, en posant $k = \frac{RT}{V_0 P^\circ} = 14{,}38$ mol^{-1} :

$$K^\circ = \frac{(P_{CO}/P^\circ)(P_{Br_2}/P^\circ)}{P_{COBr_2}/P^\circ} = \frac{k\,\xi^2}{n_0 - \xi} = 5{,}46$$

On résout l'équation du second degré $\xi^2 + 0{,}380\,\xi - 0{,}190 = 0$, dont la racine positive physiquement acceptable ($\xi \leq n_0$) donne $\xi_{eq} = 0{,}285$ mol.

$$n(COBr_2) = 0{,}215 \text{ mol} \quad ; \quad n(CO) = n(Br_2) = 0{,}285 \text{ mol}$$

② Le taux de décomposition est $\tau = \xi_{eq}/n_0$:

$$\tau \approx 57{,}1\,\%$$

③ Juste après l'ajout : $n(COBr_2) = 0{,}215$; $n(CO) = 0{,}285 + 2{,}00 = 2{,}285$; $n(Br_2) = 0{,}285$ mol.

$$Q_r = \frac{k\, n(CO)\, n(Br_2)}{n(COBr_2)} \approx 43{,}7$$

$Q_r \approx 43{,}7 \gg K^\circ = 5{,}46 \Rightarrow$ évolution en sens indirect (rétro-réaction, formation de $COBr_2$)

④ En posant x l'avancement algébrique supplémentaire à partir de l'état précédent ($x < 0$), on résout $x^2 + 2{,}95\,x + 0{,}571 = 0$, qui donne $x = -0{,}208$ mol.

$$n(COBr_2) \approx 0{,}423 \text{ mol} \ ; \ n(CO) \approx 2{,}077 \text{ mol} \ ; \ n(Br_2) \approx 7{,}7 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Exercice n°3 : Chlorure d'ammonium

correction en ligne

On pose $[NH_4^+] = C_0 - x$, $[NH_3] = [H_3O^+] = x$. Comme $K^\circ = 10^{-9{,}8}$ est très faible, on peut supposer $x \ll C_0$, donc $x^2 \approx K^\circ C_0$:

$$x = \sqrt{K^\circ\, C_0} = \sqrt{10^{-9{,}8} \times 2{,}0 \cdot 10^{-3}}$$

On vérifie a posteriori $x/C_0 \approx 3 \cdot 10^{-4} \ll 1$: l'approximation est validée.

$$[NH_3] = [H_3O^+] \approx 5{,}6 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad ; \quad [NH_4^+] \approx C_0 = 2{,}0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$
Oui, c'est un véritable état d'équilibre (réactif et produits coexistent, K° fini)

Exercice n°4 : Dissolution de la silice

correction en ligne

Tant que du solide $SiO_2(s)$ subsiste, son activité vaut 1 et la concentration d'équilibre en H_4SiO_4 dissous est fixée uniquement par K° : $[H_4SiO_4]_{eq} = K^\circ\, C^\circ = 10^{-2{,}7}\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, indépendamment de la quantité de solide, *à condition* que cette concentration soit atteignable.
① Si tout le solide se dissolvait, on obtiendrait au maximum $[H_4SiO_4] = n_1/V = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}, valeur supérieure à $K^\circ = 2{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1} : le solide ne peut donc pas se dissoudre entièrement, il en reste à l'équilibre.

$$[H_4SiO_4]_{eq} \approx 2{,}0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \ ; \ n_{SiO_2,restant} = n_1 - 2{,}0 \cdot 10^{-3} \approx 8{,}0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$
État d'équilibre (solide + solution coexistent)

② Si tout le solide se dissolvait, on obtiendrait $[H_4SiO_4] = n_2/V = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1} $< K^\circ$: le quotient de réaction n'atteint jamais K° car le réactif solide est épuisé avant. La dissolution est donc totale.

$[H_4SiO_4] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1} ; $n_{SiO_2,restant} = 0$
Ce n'est PAS un état d'équilibre (transformation totale, réactif limitant)

Exercice n°5 : Fluoration du dioxyde d'uranium

correction en ligne

Seuls HF et H_2O sont gazeux et $P = P_{HF} + P_{H_2O} = 1$ bar est maintenue constante ; UO_2 et UF_4 sont des phases solides pures (activité 1) tant qu'elles subsistent.
① Avec 1,0 mol de UO_2 et 1,0 mol de HF, HF est le réactif limitant ($4 \times 1{,}0 > 1{,}0$) : $\xi_{max} = 0{,}25$ mol. K° étant très grand ($6{,}8 \cdot 10^4$), la réaction est très avancée ; en résolvant $K^\circ = x_{H_2O}^2 / x_{HF}^4$ au voisinage de ξ_{max}, on trouve $\xi_{eq} \approx 0{,}242$ mol (il reste un peu de HF).

$n(UO_2) \approx 0{,}758$ mol (s) ; $n(HF) \approx 3{,}1 \times 10^{-2}$ mol (g)
$n(UF_4) \approx 0{,}242$ mol (s) ; $n(H_2O) \approx 0{,}485$ mol (g)

② Avec 0,10 mol de UO_2, c'est désormais UO_2 le réactif limitant : $\xi_{max} = 0{,}10$ mol. En calculant Q_r pour $\xi = \xi_{max}$ (tout UO_2 consommé) : $Q_r \approx 0{,}20 \ll K^\circ = 6{,}8 \cdot 10^4$. Le quotient de réaction n'atteint jamais K° : $UO_2(s)$ disparaît totalement avant que l'équilibre ne puisse s'établir.

$n(UO_2) = 0$; $n(HF) = 0{,}60$ mol ; $n(UF_4) = 0{,}10$ mol ; $n(H_2O) = 0{,}20$ mol
Remarque : transformation TOTALE (rupture d'équilibre), UO_2 solide entièrement consommé

Exercice n°6 : Dimérisation du trichlorure de fer

correction en ligne

① Mélange initial équimolaire ($x_{FeCl_3} = x_{Fe_2Cl_6} = 0{,}5$), donc $P_{FeCl_3} = P_{Fe_2Cl_6} = 1{,}00$ bar :

$$Q_{r,0} = \frac{P_{Fe_2Cl_6}/P^\circ}{(P_{FeCl_3}/P^\circ)^2} = \frac{1{,}00}{1{,}00^2} = 1{,}00$$

$Q_{r,0} = 1{,}00 < K^\circ = 20{,}8 \Rightarrow$ évolution en sens direct (dimérisation)

② En introduisant l'avancement ξ (base $n_0 = 1$ mol de chaque espèce), $P_{tot} = 2{,}00$ bar constante, on obtient l'équation $167{,}4\,\xi^2 - 167{,}4\,\xi + 39{,}6 = 0$, dont la racine physique est $\xi_{eq} \approx 0{,}384$.

$P_{FeCl_3} \approx 0{,}287$ bar ; $P_{Fe_2Cl_6} \approx 1{,}713$ bar

③ En partant de $FeCl_3$ pur, on pose $\tau_d = 2\xi/n_0$. La même démarche conduit à $167{,}4\,\xi^2 - 167{,}4\,\xi + 41{,}6 = 0$, soit $\xi_{eq} \approx 0{,}461$.

$\tau_d \approx 92{,}3\,\%$

Remarque : on retrouve, comme attendu, les mêmes pressions partielles d'équilibre qu'à la question précédente (l'état d'équilibre à T et P fixées ne dépend pas de la composition initiale).
④ Pour $\tau_d = 50\,\%$, soit $\xi = 0{,}25$, la relation générale $K^\circ = \dfrac{\xi(1-\xi)}{P'(1-2\xi)^2}$ (avec P' en bar) donne :

$$P' = \frac{\xi(1-\xi)}{K^\circ(1-2\xi)^2} = \frac{0{,}25 \times 0{,}75}{20{,}8 \times 0{,}25}$$

$$P' \approx 3{,}6 \times 10^{-2} \text{ bar}$$

Exercice n°7 : Transformation de l'adénosine diphosphate

correction en ligne

① À partir de $n_0 = 1{,}0$ mol d'ADP^{3-}, il en reste 0,10 mol à l'équilibre, donc l'avancement est $\xi = (1{,}0 - 0{,}10)/2 = 0{,}45$ mol, avec $n(ATP^{4-}) = n(AMP^{2-}) = 0{,}45$ mol.
Toutes les espèces sont des solutés (activité $[X]/C^\circ$) et la somme algébrique de leurs coefficients stœchiométriques est nulle ($1 + 1 - 2 = 0$) : le volume V (et C°) se simplifient dans l'expression de K° :

$$K^\circ = \frac{n(ATP^{4-})\, n(AMP^{2-})}{n(ADP^{3-})^2} = \frac{0{,}45 \times 0{,}45}{0{,}10^2}$$

$$K^\circ \approx 20{,}3$$

② Si l'ATP^{4-} est consommé au fur et à mesure de sa formation, Q_r reste toujours inférieur à K° : d'après la loi de modération, l'équilibre est sans cesse déplacé dans le sens direct, ce qui entraîne une consommation plus complète de l'ADP^{3-} (le système ne peut alors jamais atteindre son état d'équilibre initial).

Déplacement continu de l'équilibre dans le sens direct

③ $Q_{r,0} = \dfrac{[ATP^{4-}]_0[AMP^{2-}]_0}{[ADP^{3-}]_0^2} = 1 < K^\circ = 20{,}3$: évolution en sens direct. En posant y l'avancement volumique, $[ADP^{3-}] = 4{,}0.10^{-3} - 2y$, $[ATP^{4-}] = [AMP^{2-}] = 4{,}0.10^{-3} + y$, la relation $\sqrt{K^\circ} = \dfrac{4{,}0.10^{-3} + y}{4{,}0.10^{-3} - 2y} = 4{,}5$ donne $y = 1{,}4 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

$$[ADP^{3-}]_{eq} = 1{,}2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \; ; \; [ATP^{4-}]_{eq} = [AMP^{2-}]_{eq} = 5{,}4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$
$$\tau_{final} = \frac{\xi_{eq}}{\xi_{max}} = \frac{1{,}4 \cdot 10^{-3}}{2{,}0 \cdot 10^{-3}} \approx 70\,\%$$

④
L'enzyme est un catalyseur : elle accélère la réaction mais ne modifie pas la valeur de K°, donc l'état d'équilibre (taux d'avancement de 70 %) serait le même s'il était atteint. Mais sans enzyme, la réaction est extrêmement lente (bloquée cinétiquement) : à l'échelle de temps biologique, l'équilibre n'est pas atteint et le taux d'avancement final observé reste quasi nul.

Thermodynamiquement : taux à l'équilibre inchangé (70 %)
En pratique, sans enzyme : réaction bloquée cinétiquement, taux final quasi nul

Exercice n°8 : Breaking bad (résolution de problème)

correction en ligne

① La masse de solution prélevée est $m = V_{\text{prélevé}} \times d \times \rho_{eau} = 3785 \times 0{,}897 \times 1{,}00 \approx 3395$ kg. Pour ne pas modifier la masse totale du wagon (donc ne pas être repéré à la pesée), il faut ajouter une masse d'eau identique, soit un volume :

$$V_{eau} = \frac{m}{\rho_{eau}} \approx 3395 \text{ L}$$

$V_{eau,calc} \approx 3{,}40 \times 10^3$ L, en accord avec les 3408 L annoncés

② Le volume prélevé représente une fraction du volume total du wagon :

$$\frac{V_{\text{prélevé}}}{V_{total}} = \frac{3785}{91000}$$

$\frac{V_{\text{prélevé}}}{V_{total}} \approx 4{,}16\,\% \approx 4\,\%$: l'affirmation de Walter est vérifiée

Exercice n°9 : Odorat et monoxyde d'azote (résolution de problème)

correction en ligne

On assimile l'air ambiant à $x_{N_2} \approx 0{,}78$ et $x_{O_2} \approx 0{,}21$ sous $P \approx 1$ bar, et on calcule la pression partielle de NO que donnerait l'équilibre thermodynamique :

$$\left(\frac{P_{NO}}{P^\circ}\right)^2 = K^\circ \times \frac{P_{O_2}}{P^\circ} \times \frac{P_{N_2}}{P^\circ} = 4{,}60 \cdot 10^{-31} \times 0{,}21 \times 0{,}78$$

On en déduit $P_{NO} \approx 2{,}7 \times 10^{-16}$ bar, soit une fraction molaire (en ppm) :

$$x_{NO} = \frac{P_{NO}}{P_{tot}} \approx 2{,}7 \times 10^{-16} \mathrel{\widehat{=}} 2{,}7 \times 10^{-10} \text{ ppm}$$

$x_{NO} \approx 2{,}7 \times 10^{-10}$ ppm $\ll 0{,}29$ ppm $\Rightarrow$ le monoxyde d'azote n'est PAS perceptible

Exercice n°10 : Formation de dichlore d'après Mines-Télécom 2009

correction en ligne

① Pour équilibrer avec un coefficient -1 devant O_2 (2 atomes d'oxygène $\rightarrow$ 2 H_2O, donc 4 H, donc 4 HCl, donc 2 Cl_2) :

$$O_2(g) + 4\,HCl(g) = 2\,Cl_2(g) + 2\,H_2O(g)$$

② Pour 1,0 mol de O_2 en proportions stœchiométriques (4,0 mol de HCl), le réactif limitant disparaît pour ξ_{max} tel que $n(O_2) = 1{,}0 - \xi_{max} = 0$:

$$\xi_{max} = 1{,}0 \text{ mol}$$

③ 75 % de HCl a disparu, soit $n(HCl)_{\text{consommé}} = 0{,}75 \times 4{,}0 = 3{,}0 \text{ mol} = 4\,\xi_{eq}$:

$$\xi_{eq} = 0{,}75 \text{ mol}$$

④ Avec $\xi_{eq} = 0{,}75$ mol : $n(O_2) = 0{,}25$; $n(HCl) = 1{,}0$; $n(Cl_2) = n(H_2O) = 1{,}5$ mol, soit $n_{tot} = 4{,}25$ mol, et $P_i = x_i \times 1$ bar :

$$\boxed{P_{O_2} \approx 0{,}0588 \text{ bar} \ ; \ P_{HCl} \approx 0{,}235 \text{ bar} \ ; \ P_{Cl_2} = P_{H_2O} \approx 0{,}353 \text{ bar}}$$

⑤

$$K^\circ = \frac{(P_{Cl_2}/P^\circ)^2 (P_{H_2O}/P^\circ)^2}{(P_{O_2}/P^\circ)(P_{HCl}/P^\circ)^4} = \frac{6^4 \times 17}{4^4}$$

$$\boxed{K^\circ \approx 86{,}1}$$

⑥ On introduit désormais de l'air (assimilé à $\frac{1}{5}O_2 + \frac{4}{5}N_2$, soit 4,0 mol de N_2 inerte pour 1,0 mol de O_2). Avec $n_{tot} = 9{,}0 - \xi$ et $\Delta\nu_{gaz} = -1$, la loi d'action de masse devient :

$$K^{\circ\prime} = \frac{(9{,}0 - \xi)\,\xi^4}{16\,(1-\xi)^5} = 10^{-6}$$

La résolution numérique (par approximations successives, $K^{\circ\prime}$ étant très petit) conduit à $\xi_{eq} \ll 1$ mol :

$$\boxed{\xi_{eq} \approx 3{,}5 \times 10^{-2} \text{ mol}}$$