现存等翅下目 Extant Isoptera

（白蚁领科）拉丁学名—中文正名对照名录

Bilibili:班奈特格林 编

2026 年 10 月 17 日

现存等翅下目 Extant Isoptera

（白蚁领科）拉丁学名—中文正名对照名录

2026 年 10 月 17 日正式版

共收录 323 属、3008 种、63 亚种

译名优先采用国内中文名录已记录的译名，*为模式种，本文件非专业学术著作仅供参考

名录部分主要参考：《白蚁学》、《世界白蚁中文名录》、《中国动物志》、https://www.termitologia.net/、http://organismnames.com/query.htm、https://www.gbif.org/

简介部分参考文献见文末

图片如有侵权告知后将立即删除

bilibili: 班奈特格林，个人制作，免费发布，注明作者可随意参考使用

目录

澳白蚁科 MASTOTERMITIDAE····· 1

澳白蚁属 Mastotermes····· 2

真等翅类 Euisoptera····· 2

远等翅类 Teletisoptera····· 2

古白蚁科 ARCHOTERMOPSIDAE····· 2

古白蚁属 Archotermopsis····· 2

动白蚁属 Zootermopsis····· 2

草白蚁科 HODOTERMITIDAE····· 3

无刺白蚁属 Anacanthotermes····· 3

草白蚁属 Hodotermes····· 4

小草白蚁属 Microhodotermes····· 4

原白蚁科 HODOTERMOPSIDAE····· 4

原白蚁属 Hodotermopsis····· 5

胄白蚁科 STOLOTERMITIDAE····· 5

洞白蚁属 Porotermes····· 5

胄白蚁属 Stolotermes····· 6

近等翅类 Icoisoptera····· 6

木白蚁科 KALOTERMITIDAE····· 6

奇白蚁属 Allotermes····· 7

双角白蚁属 Bicornitermes····· 7

双裂白蚁属 Bifiditermes····· 7

距白蚁属 Calcaritermes····· 7

角木白蚁属 Ceratokalotermes····· 8

毛白蚁属 Comatermes····· 8

堆砂白蚁属 Cryptotermes····· 8

上木白蚁属 Epicalotermes····· 10

真砂白蚁属 Eucryptotermes····· 10

树白蚁属 Glyptotermes····· 10

楹白蚁属 Incisitermes····· 14

木白蚁属 Kalotermes····· 15

头长白蚁属 Longicaputermes····· 15

边白蚁属 Marginitermes····· 15

新白蚁属 Neotermes····· 16

近新白蚁属 Paraneotermes····· 19

后琥珀白蚁属 Postelectrotermes……19
前砂白蚁属 Procryptotermes……19
前新白蚁属 Proneotermes……20
翅白蚁属 Pterotermes……20
罗伊辛白蚁属 Roisinitermes……20
皱白蚁属 Rugitermes……20
牛白蚁属 Tauritermes……20
新等翅类 Neoisoptera……20
沙白蚁科 PSAMMOTERMITIDAE……20
原鼻白蚁属 Prorhinotermes……21
沙白蚁属 Psammotermes……22
鼻白蚁科 RHINOTERMITIDAE……22
尖鼻白蚁属 Acorhinotermes……23
狭鼻白蚁属 Dolichorhinotermes……23
棒鼻白蚁属 Parrhinotermes……23
鼻白蚁属 Rhinotermes……24
长鼻白蚁属 Schedorhinotermes……24
齿白蚁科 SERRITERMITIDAE……25
舌白蚁属 Glossotermes……26
齿白蚁属 Serritermes……26
杆白蚁科 STYLOTERMITIDAE……26
杆白蚁属 Stylotermes……27
寡脉白蚁科 TERMITOGETONIDAE……28
寡脉白蚁属 Termitogeton……29
土栖等翅类 Geoisoptera……29
异白蚁科 HETEROTERMITIDAE……29
乳白蚁属 Coptotermes……30
异白蚁属 Heterotermes……32
散白蚁属 Reticulitermes……33
白蚁科 TERMITIDAE……37
弓白蚁亚科 Amitermitinae……37
无钩白蚁属 Ahamitermes……38
弓白蚁属 Amitermes……38
齿尖白蚁属 Dentispicotermes……41
镰白蚁属 Drepanotermes……41
漠白蚁属 Eremotermes……42
球白蚁属 Globitermes……42

颚钩白蚁属 Gnathamitermes……43
武白蚁属 Hoplotermes……43
子民白蚁属 Incolitermes……43
闯白蚁属 Invasitermes……43
直颚白蚁属 Orthognathotermes……43
前钩白蚁属 Prohamitermes……43
伪钩白蚁属 Pseudhamitermes……43
同钩白蚁属 Synhamitermes……43
尖白蚁亚科 Apicotermitinae……44
顺白蚁属 Acholotermes……44
虚白蚁属 Acidnotermes……45
尖齿白蚁属 Acutidentitermes……45
和白蚁属 Adaiphrotermes……45
谐白蚁属 Aderitotermes……45
弱白蚁属 Adynatotermes……45
雅白蚁属 Aganotermes……45
异颚白蚁属 Allognathotermes……45
逃白蚁属 Alyscotermes……45
软白蚁属 Amalotermes……45
善白蚁属 Amicotermes……45
大腿白蚁属 Amplucrutermes……46
无戟白蚁属 Anaorotermes……46
无甲白蚁属 Anenteotermes……46
解甲白蚁属 Anoplotermes……46
疲白蚁属 Apagotermes……47
弯肠白蚁属 Aparatermes……47
尖白蚁属 Apicotermes……47
和平白蚁属 Apolemotermes……47
无剑白蚁属 Asagarotermes……47
无利器白蚁属 Astalotermes……47
无刃白蚁属 Astratotermes……48
无锐白蚁属 Ateuchotermes……48
首白蚁属 Caputitermes……48
蔡斯白蚁属 Chasitermes……48
肠刺白蚁属 Compositermes……48
基白蚁属 Coxotermes……48
间断白蚁属 Disjunctitermes……48
隐藏白蚁属 Dissimulitermes……49

双齿白蚁属 Duplidentitermes……49
埃博戈白蚁属 Ebogotermes……49
象牙白蚁属 Eburnitermes……49
多刺白蚁属 Echinotermes……49
亮白蚁属 Euhamitermes……49
宽白蚁属 Eurytermes……49
坚白蚁属 Firmitermes……50
胃白蚁属 Gastrotermes……50
灰白蚁属 Grigiotermes……50
埃姆白蚁属 Heimitermes……50
毛糙白蚁属 Hirsutitermes……50
锐颚白蚁属 Hoplognathotermes……50
腐殖白蚁属 Humutermes……50
海德瑞克白蚁属 Hydrecotermes……50
印白蚁属 Indotermes……50
岗白蚁属 Jugositermes……51
库塔巴白蚁属 Koutabatermes……51
克雷切克白蚁属 Krecekitermes……51
钳白蚁属 Labidotermes……51
长工白蚁属 Longustitermes……51
剑白蚁属 Machadotermes……51
曼戈尔德白蚁属 Mangolditermes……51
海胆白蚁属 Ourissotermes……51
帕塔瓦白蚁属 Patawatermes……51
锐白蚁属 Phoxotermes……51
突吻白蚁属 Rostrotermes……51
变红白蚁属 Rubeotermes……51
腹爆白蚁属 Ruptitermes……51
拉斯特白蚁属 Rustitermes……52
洁白蚁属 Skatitermes……52
稀白蚁属 Speculitermes……52
足白蚁属 Tetimatermes……52
奇囟白蚁属 Tonsuritermes……52
发白蚁属 Trichotermes……53
三棒白蚁属 Triclavitermes……53
黄汁白蚁属 Tucupitermes……53
响白蚁亚科 Crepititermitinae……53
响白蚁属 Crepititermes……54

方白蚁亚科 Cubitermitinae····· 54
无毛白蚁属 Apilitermes····· 54
基齿白蚁属 Basidentitermes····· 54
铲白蚁属 Batillitermes····· 55
刻痕白蚁属 Crenetermes····· 55
方白蚁属 Cubitermes····· 55
真唇白蚁属 Euchilotermes····· 55
峰白蚁属 Fastigitermes····· 56
叉白蚁属 Furculitermes····· 56
等颚白蚁属 Isognathotermes····· 56
鳞白蚁属 Lepidotermes····· 56
大颚白蚁属 Megagnathotermes····· 57
锐尖白蚁属 Mucrotermes····· 57
净白蚁属 Nitiditermes····· 57
节白蚁属 Noditermes····· 57
奥卡万戈白蚁属 Okavangotermes····· 57
蛇白蚁属 Ophiotermes····· 58
直白蚁属 Orthotermes····· 58
奥万博兰白蚁属 Ovambotermes····· 58
棘白蚁属 Pilotermes····· 58
多铲白蚁属 Polyspathotermes····· 58
象鼻白蚁属 Proboscitermes····· 58
原方白蚁属 Procubitermes····· 58
前峰白蚁属 Profastigitermes····· 59
三方白蚁属 Ternicubitermes····· 59
胸白蚁属 Thoracotermes····· 59
菱角白蚁属 Trapellitermes····· 59
爪白蚁属 Unguitermes····· 59
独角白蚁属 Unicornitermes····· 59
圆筒白蚁亚科 Cylindrotermitinae····· 59
头白蚁属 Cephalotermes····· 60
圆筒白蚁属 Cylindrotermes····· 60
恩格尔白蚁亚科 Engelitermitinae····· 60
恩格尔白蚁属 Engelitermes····· 61
孔白蚁亚科 Foraminitermitinae····· 61
孔白蚁属 Foraminitermes····· 62
唇白蚁属 Labritermes····· 62
伪小白蚁属 Pseudomicrotermes····· 62

剪白蚁亚科 Forficulitermitinae····· 62
剪白蚁属 Forficulitermes····· 63
大白蚁亚科 Macrotermitinae····· 63
刺白蚁属 Acanthotermes····· 64
奇齿白蚁属 Allodontermes····· 64
钩白蚁属 Ancistrotermes····· 65
左转白蚁属 Euscaiotermes····· 65
地白蚁属 Hypotermes····· 65
大白蚁属 Macrotermes····· 66
大前白蚁属 Megaprotermes····· 68
小白蚁属 Microtermes····· 68
土白蚁属 Odontotermes····· 70
前白蚁属 Protermes····· 75
伪刺白蚁属 Pseudacanthotermes····· 75
聚刺白蚁属 Synacanthotermes····· 76
锯白蚁亚科 Microcerotermitinae····· 76
锯白蚁属 Microcerotermes····· 76
倒钩白蚁属 Onkotermes····· 81
瘤白蚁亚科 Mirocapritermitinae····· 81
突扭白蚁属 Dicuspiditermes····· 82
平白蚁属 Homallotermes····· 82
印扭白蚁属 Indocapritermes····· 82
凯姆勒白蚁属 Kemneritermes····· 82
克里希纳扭白蚁属 Krishnacapritermes····· 82
唇扭白蚁属 Labiocapritermes····· 82
瘤白蚁属 Mirocapritermes····· 83
东扭白蚁属 Oriencapritermes····· 83
近扭白蚁属 Pericapritermes····· 83
前扭白蚁属 Procapritermes····· 84
伪扭白蚁属 Pseudocapritermes····· 84
丽娜扭白蚁属 Rinacapritermes····· 85
华扭白蚁属 Sinocapritermes····· 85
聚扭白蚁属 Syncapritermes····· 85
象白蚁亚科 Nasutitermitinae····· 85
针白蚁属 Aciculitermes····· 86
非锥白蚁属 Afrosubulitermes····· 87
无颚白蚁属 Agnathotermes····· 87
钝颚白蚁属 Ahmaditermes····· 87

安瓿白蚁属 Ampoulitermes……87
棱角白蚁属 Angularitermes……87
魔白蚁属 Anhangatermes……88
安的列斯白蚁属 Antillitermes……88
阿劳若白蚁属 Araujotermes……88
弧白蚁属 Arcotermes……88
阿特拉斯白蚁属 Atlantitermes……88
澳大利亚白蚁属 Australitermes……88
细颈白蚁属 Baucaliotermes……88
瓢白蚁属 Bulbitermes……88
林白蚁属 Caetetermes……89
加勒比白蚁属 Caribitermes……89
小锡兰白蚁属 Ceylonitermellus……89
锡兰白蚁属 Ceylonitermes……90
缩狭白蚁属 Coarctotermes……90
凸鼻白蚁属 Coatitermes……90
箭猪白蚁属 Coendutermes……90
缩白蚁属 Constrictotermes……90
凸白蚁属 Convexitermes……90
利颚白蚁属 Cortaritermes……90
葫白蚁属 Cucurbitermes……91
巨鼻白蚁属 Cyranotermes……91
歧白蚁属 Diversitermes……91
木象白蚁属 Diwaitermes……91
埃莉诺白蚁属 Eleanoritermes……91
埃默森白蚁属 Emersonitermes……91
针筒白蚁属 Enetotermes……91
无名白蚁属 Ereymatermes……91
小真白蚁属 Eutermellus……91
富勒白蚁属 Fulleritermes……91
高跷白蚁属 Grallatotermes……92
多毛白蚁属 Hirtitermes……92
须白蚁属 Hospitalitermes……92
森林白蚁属 Hyleotermes……93
考登白蚁属 Kaudernitermes……93
怒白蚁属 Lacessititermes……93
薄喙白蚁属 Leptomyxotermes……94
白脸白蚁属 Leucopitermes……94

长足白蚁属 Longipeditermes……94
大锥白蚁属 Macrosubulitermes……94
马尔加什白蚁属 Malagasitermes……94
马来白蚁属 Malaysiotermes……94
仿白蚁属 Mimeutermes……94
米勒白蚁属 Muelleritermes……94
鸟嘴白蚁属 Mycterotermes……94
棘象白蚁属 Nasopilotermes……94
象白蚁属 Nasutitermes……94
凋落白蚁属 Ngauratermes……102
新几内亚白蚁属 Niuginitermes……102
钝白蚁属 Obtusitermes……102
西部白蚁属 Occasitermes……102
隐白蚁属 Occultitermes……102
东锥白蚁属 Oriensubulitermes……102
近凸白蚁属 Paraconvexitermes……102
微白蚁属 Parvitermes……102
近针白蚁属 Periaciculitermes……102
后锥白蚁属 Postsubulitermes……102
锥形白蚁属 Rhadinotermes……103
鲁恩沃白蚁属 Roonwalitermes……103
圆白蚁属 Rotunditermes……103
胖白蚁属 Rounditermes……103
沙巴白蚁属 Sabahitermes……103
桑兹白蚁属 Sandsitermes……103
华象白蚁属 Sinonasutitermes……103
鼻大白蚁属 Sinqasapatermes……103
匙白蚁属 Spatulitermes……103
似锥白蚁属 Subulioiditermes……103
锥白蚁属 Subulitermes……103
慢白蚁属 Tarditermes……104
薄嘴白蚁属 Tenuirostritermes……104
暗鼻白蚁属 Tiunatermes……104
三角白蚁属 Triangularitermes……104
三脉白蚁属 Trinervitermes……104
冢白蚁属 Tumulitermes……105
快白蚁属 Velocitermes……105
疣白蚁属 Verrucositermes……106

夏氏白蚁属 Xiaitermes……106
新扭白蚁亚科 Neocapritermitinae……106
新扭白蚁属 Neocapritermes……106
平扭白蚁属 Planicapritermes……107
不对称白蚁属 Schievitermes……107
前奇白蚁亚科 Promirotermitinae……107
角白蚁属 Angulitermes……108
前奇白蚁属 Promirotermes……109
始钩白蚁亚科 Protohamitermitinae……109
东方白蚁属 Orientotermes……110
始钩白蚁属 Protohamitermes……110
圆球白蚁亚科 Sphaerotermitinae……110
圆球白蚁属 Sphaerotermes……111
聚白蚁亚科 Syntermitinae……111
漏斗白蚁属 Acangaobitermes……112
戟白蚁属 Armitermes……112
班代拉白蚁属 Bandeiratermes……112
拜拉白蚁属 Biratermes……113
弃白蚁属 Cahuallitermes……113
角象白蚁属 Cornitermes……113
曲白蚁属 Curvitermes……113
壶头白蚁属 Cyrilliotermes……113
生白蚁属 Embiratermes……113
膝白蚁属 Genuotermes……114
地球白蚁属 Ibitermes……114
厚唇白蚁属 Labiotermes……114
马库希白蚁属 Macuxitermes……114
红懒白蚁属 Mapinguaritermes……114
努瓦罗白蚁属 Noirotitermes……114
近曲白蚁属 Paracurvitermes……114
前角白蚁属 Procornitermes……114
喙白蚁属 Rhynchotermes……114
西尔韦斯特里白蚁属 Silvestritermes……115
聚白蚁属 Syntermes……115
弯钩白蚁属 Uncitermes……116
瓦宁白蚁属 Vaninitermes……116
白蚁亚科 Termitinae……116
后肠白蚁属 Apsenterotermes……117

扭白蚁属 Capritermes……117
腔白蚁属 Cavitermes……117
角扭白蚁属 Cornicapritermes……117
脊突白蚁属 Cristatitermes……117
双戟白蚁属 Dihoplotermes……118
迪维努白蚁属 Divinotermes……118
瘤突白蚁属 Ekphysotermes……118
棒颚白蚁属 Ephelotermes……118
络白蚁属 Hapsidotermes……118
西澳白蚁属 Hesperotermes……118
客白蚁属 Inquilinitermes……118
小脊突白蚁属 Lophotermes……118
长颚白蚁属 Macrognathotermes……119
棕榈白蚁属 Palmitermes……119
旁扭白蚁属 Paracapritermes……119
始扭白蚁属 Protocapritermes……119
相似白蚁属 Quasitermes……119
石白蚁属 Saxatilitermes……119
针刺白蚁属 Spinitermes……119
白蚁属 Termes……119
小瘤白蚁属 Tuberculitermes……120
木堆白蚁属 Xylochomitermes……120
参考文献……121

(2026.10.13 正式版) 现存等翅下目 Extant Isoptera

现存等翅下目 Extant Isoptera

澳白蚁科 MASTOTERMITIDAE

澳白蚁科由 Desneux 于 1904 年建立（Desneux, 1904: 284）[1]。模式属为澳白蚁属 *Mastotermes* Froggatt, 1897（模式种达尔文澳白蚁 *Mastotermes darwiniensis* Froggatt, 1897，原始指定单模式）。科名由模式属名加科级后缀 -idae 构成；*Mastotermes* 一般释为希腊文 mastos（乳房状突起）与 termes 组合，指蚁后腹部的乳突状构造。本科兵蚁与工蚁外形相近、分化程度低，上颚具端齿与多个缘齿；有翅生殖蚁翅脉呈网状并具发达的臀脉区，是现生白蚁中保留原始特征较多的类群。本科兵蚁头壳圆形、淡红棕色，上颚短粗而端齿长；右上颚缘齿 2 枚均发达，左上颚仅第 1 缘齿明显、余者退化（齿式为本科鉴别点，仅见于本科）；兵蚁与工蚁前足基节各具瓣状突起，股节与胫节腹面具成列对生小齿，为本科独有的附肢特征。本名录收录 1 属 1 种。

现生种分布于澳大利亚北部热带地区（北领地、昆士兰北部、西澳金伯利一带），并已传入巴布亚新几内亚。本科是现生白蚁最早分化的支系[2]，后翅具宽大臀域[3]、跗节 5 节、产卵如蜚蠊般形成卵鞘，这些特征也可在近缘的食木蜚蠊类群（如 *Cryptocercus*）中找到。巢筑于地下、倒木与树木根颈处，无外露垄巢；自然条件下群体中等，在人居环境可扩展至十万级甚至更大规模，并能以补充繁殖蚁分巢扩散。经济上，达尔文澳白蚁是澳大利亚北部危害建筑木材与活立木的重要害虫[4]。入侵种群约于 20 世纪 50 年代（1959 年前后）随运输物资传入巴布亚新几内亚莱城（Lae）；1962—1973 年曾实施除治并一度以为根除，1990 年代初复现，2002 年再发现新的侵害点，现已扩散至当地 42 种本地与外来树木，受害面积较 1973 年扩大约 6 倍。该种另在澳大利亚境内向南扩展至黄金海岸（Gold Coast，约在本土分布南界以南 800 km），属本土范围内的扩散。



Mastotermes darwiniensis 达尔文澳白蚁（https://www.inaturalist.org/observations/203451137）

澳白蚁属 *Mastotermes*

**Mastotermes darwiniensis* 达尔文澳白蚁（澳大利亚北部、热带北部地区、引入：巴布亚新几内亚）

真等翅类 Euisoptera

远等翅类 Teletisoptera

古白蚁科 ARCHOTERMOPSIDAE

古白蚁科由 Engel、Grimaldi 与 Krishna 于 2009 年建立（Engel, Grimaldi & Krishna, 2009: 11）[5]，模式属为古白蚁属 *Archotermopsis* Desneux, 1904。科名词出模式属：*Archotermopsis* 由希腊文 archaios（古老的）与 *Termopsis*（元白蚁属名）组合而成。本科是俗称“湿木白蚁”（dampwood termites）之一支；兵蚁上颚粗壮、具明显的端齿与缘齿，头部扁平、无囟门，个体大型。兵蚁头背可见 Y 形缝，眼退化，触角 19—27 节，左上颚缘齿 3 枚、右上颚 2 枚，前胸背板扁平、狭于头，跗节 5 节；有翅成虫具明显单眼，体大型。本名录收录 2 属 5 种。

本科分布呈间断的北温带格局：动白蚁属限于北美西部（自西海岸至西南部），古白蚁属分布于中国、越南、南亚及其邻近区域。两属均栖息于高湿环境中的腐朽倒木与树桩内，营单块木巢，巢群终生不离食源，由拟工蚁行使劳动。*Zootermopsis angusticollis* 于 1999 年前后在夏威夷（毛伊岛高海拔）定殖，*Zootermopsis nevadensis* 于 2000 年首见于日本川西（Kawanishi）[4]。本科对干燥环境适应力弱，一般不危害干燥建筑木材，但动白蚁属 *Zootermopsis* 在北美太平洋沿岸为害潮湿木构件，是当地重要的湿木白蚁类建筑害虫[6]



Archotermopsis kuznetsovi 库兹涅佐夫古白蚁

古白蚁属 *Archotermopsis*

Archotermopsis kuznetsovi 库兹涅佐夫古白蚁（中国、越南）

**Archotermopsis wroughtoni* 罗夫顿古白蚁（南亚、中国）

动白蚁属 *Zootermopsis*

**Zootermopsis angusticollis* 狭颈动白蚁（北美西海岸、美国、加拿大不列颠哥伦比亚、墨西哥；引入：夏威夷（美国））

Zootermopsis laticeps 宽头动白蚁（北美西南部、美国、墨西哥）

Zootermopsis nevadensis 内华达动白蚁（北美西部、美国西部、加拿大西部、墨西哥、引入：日本)

nevadensis 指名亚种

nuttingi 纳丁亚种

草白蚁科 HODOTERMITIDAE

草白蚁科由 Desneux 于 1904 年建立（Desneux, 1904: 284）[1]，模式属为草白蚁属 *Hodotermes* Hagen, 1853。科名词出模式属：*Hodotermes* 由希腊文 hodos（道路、游走）与 termes 组合，指其外出地面觅食的习性。本名录收录 3 属 21 种。

本科为旧热带界—古北界干旱地带特有的“收获型”白蚁，三属大致分区：草白蚁属 *Hodotermes* Hagen, 1853 分布于非洲南部及东部；小草白蚁属 *Microhodotermes* Sjöstedt, 1926 跨南非、纳米比亚与北非；无刺白蚁属 *Anacanthotermes* Jacobson, 1905 分布于北非、阿拉伯半岛、中东至中亚及南亚的荒漠[7]、半荒漠区。与多数白蚁不同，本科工蚁和成虫均具发达复眼，夜间或晨昏在地面开放觅食，以禾草、枯草及植物茎叶为食，锯齿状内缘大颚适于切割草茎；巢居地下，由复杂隧道网络连接，部分种类筑低矮垅巢。本科兵蚁无囟门，头壳近圆形至卵形、骨化强而色深，上颚短粗、端半部强烈内弯；大型工蚁头极大而扁平（仅见于 *Hodotermes*）；有翅成虫具单眼。经济上，草白蚁在非洲牧场消耗牧草、垅巢干扰农机作业[8]，个别种类在农区取食作物。其中突厥斯坦无刺白蚁 *Anacanthotermes turkestanicus* 是中亚危害民居与历史建筑木构件的严重害虫[9]，小草白蚁属 *Microhodotermes viator* 在南非卡鲁危害牧场牧草[10]。



Microhodotermes viator 旅游小草白蚁（https://www.inaturalist.org/observations/401934726）

无刺白蚁属 *Anacanthotermes*

Anacanthotermes ahngerianus 安格无刺白蚁（中东、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗、土库曼斯坦)

Anacanthotermes baeckmannianus 贝克曼无刺白蚁（哈萨克斯坦)

Anacanthotermes baluchistanicus 俾路支无刺白蚁（巴基斯坦)

Anacanthotermes esmailii 艾斯梅尔无刺白蚁（伊朗)

Anacanthotermes gurganiensis 戈尔甘无刺白蚁（伊朗)

Anacanthotermes iranicus 伊朗无刺白蚁（伊朗)

Anacanthotermes macrocephalus 大头无刺白蚁（印度、阿富汗、伊朗、巴基斯坦）
Anacanthotermes murgabicus 穆尔加布无刺白蚁（土库曼斯坦）
**Anacanthotermes ochraceus* 黄赭无刺白蚁（北非至中东、苏丹、埃及、摩洛哥、以色列等、阿尔及利亚、科威特、利比亚、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、突尼斯、西撒哈拉、也门）
Anacanthotermes saudiensis 沙特无刺白蚁（沙特阿拉伯）
Anacanthotermes sawensis 塞瓦无刺白蚁（伊拉克）
Anacanthotermes septentrionalis 北方无刺白蚁（中东、伊朗、阿富汗、土库曼斯坦）
Anacanthotermes turkestanicus 土耳其斯坦无刺白蚁（中东、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、伊朗、塔吉克斯坦、土库曼斯坦）
Anacanthotermes ubachi 乌巴齐无刺白蚁（中东、以色列、约旦、巴勒斯坦、伊拉克、沙特阿拉伯、土耳其）
Anacanthotermes vagans 游荡无刺白蚁（中东、伊朗、阿富汗、伊拉克、科威特、巴基斯坦、沙特阿拉伯）
Anacanthotermes viarum 小径无刺白蚁（印度、斯里兰卡）

草白蚁属 *Hodotermes*

Hodotermes erithreensis 厄立特里亚草白蚁（厄立特里亚、埃塞俄比亚、索马里）
**Hodotermes mossambicus* 莫桑比克草白蚁（非洲南部及东部）

小草白蚁属 *Microhodotermes*

Microhodotermes maroccanus 摩洛哥小草白蚁（摩洛哥、阿尔及利亚）
**Microhodotermes viator* 旅游小草白蚁（南非、纳米比亚）
Microhodotermes wasmanni 沃斯曼小草白蚁（利比亚、埃及、以色列、突尼斯）

原白蚁科 HODOTERMOPSIDAE

原白蚁科由 Engel 于 2021 年提出[11]。模式属为原白蚁属 *Hodotermopsis* Holmgren, 1911。科名词出模式属：*Hodotermopsis* 意为“似草白蚁的”，由 *Hodotermes* 加希腊文 opsis（外观）构成。本名录收录 1 属 1 种。

现生种山林原白蚁分布于日本、中国台湾、中国南部及越南[12]。与近缘类群一致，原白蚁栖息于湿润腐木之中，巢群筑于倒木内部，营单块木巢生活，由拟工蚁执行巢内劳动。兵蚁头近方卵形、扁平，头前半部色深，头顶中央具一凹坑，单眼明显、呈肾形，上颚粗壮对称，左上颚具 4 枚、右上颚具 2 枚大型缘齿，触角 22—24 节，前胸背板半月形、略狭于头；有翅成虫体长 12—13.5 mm，触角 21—26 节，前翅鳞略大于后翅鳞。经济上，山林原白蚁 *Hodotermopsis sjostedti* 在中国南方危害活树与伐倒木，是蛀干害虫[13]



Hodotermopsis sjostedti 山林原白蚁

原白蚁属 *Hodotermopsis*

**Hodotermopsis sjostedti* 山林原白蚁（日本、中国台湾、中国南部、越南）

胄白蚁科 STOLOTERMITIDAE

胄白蚁科由 Holmgren 于 1910 年建立（Holmgren, 1910a: 285）[14]，模式属为胄白蚁属 *Stolotermes* Hagen, 1858。科名词出模式属 *Stolotermes*（希腊文 stolos，列队/远征，通俗解释指其列队活动）。本科兵蚁头壳骨化、色素深，上颚长大，跗节 4 节。本名录收录 2 属 10 种。

本科为典型冈瓦纳间断分布的“湿木白蚁”：洞白蚁属分布于澳大利亚、南非、智利及南美南部；胄白蚁属分布于澳大利亚、新西兰以及南非。两属均栖息于湿润腐朽倒木、枯立木树皮下，巢群筑于木段内部，营单块木巢。本科历史生物地理格局可能同时受到早期陆地连接与后续跨海扩散等过程影响，不能仅以冈瓦纳大陆裂解解释现生属的分布。经济上，方颈洞白蚁在智利偶危害潮湿木构件[15]。据 Evans et al. (2013)[4]，亚当森洞白蚁 *Porotermes adamsoni* 随 1941 年输入新西兰的铁路木质枕木传入，现分布于北岛 5 处、南岛 1 处，发生于进口锯材与树木中。



Stolotermes victoriensis 维多利亚胄白蚁（https://www.inaturalist.org/photos/109922908）

洞白蚁属 *Porotermes*

Porotermes adamsoni 亚当森洞白蚁（澳大利亚；引入：新西兰）

Porotermes planiceps 扁头洞白蚁（南非）

**Porotermes quadricollis* 方颈洞白蚁（智利及南美南部）

胄白蚁属 *Stolotermes*

Stolotermes africanus 非洲胄白蚁（南非）
Stolotermes australicus 澳大利亚胄白蚁（澳大利亚）
**Stolotermes brunneicornis* 棕角胄白蚁（澳大利亚）
Stolotermes inopinus 未料胄白蚁（新西兰）
Stolotermes queenslandicus 昆士兰胄白蚁（澳大利亚）
Stolotermes ruficeps 红头胄白蚁（新西兰）
Stolotermes victoriensis 维多利亚胄白蚁（澳大利亚）

近等翅类 Icoisoptera

木白蚁科 KALOTERMITIDAE

木白蚁科由 Froggatt 于 1897 年建立[16]，模式属为 *Kalotermes* Hagen, 1853。科名源自模式属，由希腊语 *kalos*（美丽的）与 *termes* 组合而成。本名录收录 23 属 479 种。

本科俗称“干木白蚁”。大多物种在干燥木材中筑巢和摄食，不依赖土壤，巢即食源，个体不外出远距离觅食。本科无真正的工蚁品级，由拟工蚁承担巢内劳动。兵蚁为大颚型，头部近长方形、无凶门；有翅生殖蚁具单眼，可与具凶门的鼻白蚁科、白蚁科等类群相区分。分布上为泛热带—亚热带分布，延及地中海型气候等暖温带区域，在热带林冠层的枯枝断木中多样性尤高。系统发育上，本科是现生白蚁中较早分化的支系之一[17]，为新等翅类（Neoisoptera）的姐妹群，对理解白蚁真社会性的早期演化有重要意义。入侵与扩散方面，本科干木白蚁是世界热带、亚热带最常见的随木材传播类群：小楹白蚁 *Incisitermes minor*（原生美国西部与墨西哥北部，已传入加拿大、中国、日本、意大利及夏威夷（美国））；麻头堆砂白蚁 *Cryptotermes brevis* 原生南美太平洋沿岸荒漠区，随海运木材散布至美国东南部、夏威夷、加勒比诸岛、南非、马达加斯加与澳大利亚等地，是分布最广的干木白蚁入侵种[18]；家堆砂白蚁 *Cryptotermes domesticus* 原生东南亚，已传入中国华南沿海、台湾、日本、澳大利亚及太平洋诸岛；*Cryptotermes dudleyi* 原产东洋界，已在新热带界的巴拿马、哥斯达黎加、哥伦比亚、巴西及西印度群岛建立种群；*Cryptotermes havilandi* 原产热带非洲，亦已在苏里南、圭亚那、巴西及西印度群岛建立种群。此外，*Cryptotermes cynocephalus* Light 原产菲律宾及东南亚，已传入斯里兰卡、澳大利亚约克角半岛以北、巴布亚新几内亚拉包尔及夏威夷（首次记录于瓦胡岛）；树白蚁属的 *Glyptotermes breviconis* 原产澳大利亚东南沿海，已在新西兰与斐济的天然树木中建立局地种群。斯里兰卡茶园受 *Postelectrotermes militaris* 与 *Glyptotermes dilatatus* 危害茶树[19]；另有 *Bifiditermes*、*Eucryptotermes*、*Marginitermes*、*Paraneotermes*、*Procryptotermes*、*Rugitermes* 等属为次要木材害虫[20]。



新白蚁 *Neotermes sp.*

奇白蚁属 *Allotermes*

Allotermes denticulatus 小齿奇白蚁（马达加斯加）

Allotermes papillifer 乳突奇白蚁（马达加斯加）

**Allotermes paradoxus* 奇异奇白蚁（印度洋岛屿留尼汪、马达加斯加）

双角白蚁属 *Bicornitermes*

**Bicornitermes bicornis* 双角双角白蚁（中非、刚果民主共和国、乌干达）

Bicornitermes emersoni 埃默森双角白蚁（刚果民主共和国）

Bicornitermes exsertifrons 突额双角白蚁（尼日利亚）

Bicornitermes spinicollis 刺颈双角白蚁（喀麦隆、加纳、尼日利亚、坦桑尼亚）

双裂白蚁属 *Bifiditermes*

Bifiditermes angulatus 角状双裂白蚁（东非）

Bifiditermes beesoni 比森双裂白蚁（印度、巴基斯坦）

Bifiditermes durbanensis 德班双裂白蚁（南非、肯尼亚、坦桑尼亚）

Bifiditermes improbus 不诚双裂白蚁（澳大利亚、新西兰）

Bifiditermes indicus 印度双裂白蚁（印度、印度尼西亚、泰国）

Bifiditermes jeannelanus 让内尔双裂白蚁（非洲）

**Bifiditermes madagascariensis* 马达加斯加双裂白蚁（马达加斯加、科摩罗）

Bifiditermes mutubae 榕树双裂白蚁（肯尼亚、刚果民主共和国、苏丹、坦桑尼亚、乌干达）

Bifiditermes pintoi 平托双裂白蚁（斯里兰卡、印度）

Bifiditermes rogierae 罗吉尔双裂白蚁（西班牙）

Bifiditermes sibayiensis 斯巴艺双裂白蚁（纳米比亚、南非、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦）

Bifiditermes sylvaticus 森林双裂白蚁（肯尼亚、乌干达）

距白蚁属 *Calcaritermes*

Calcaritermes brevicollis 短颈距白蚁（巴拿马、伯利兹、哥伦比亚、哥斯达黎加、尼加拉瓜）

Calcaritermes colei 科尔距白蚁（墨西哥、伯利兹、危地马拉、洪都拉斯）

Calcaritermes emarginicollis 刻颈距白蚁（中美洲、哥斯达黎加、巴拿马、洪都拉斯、伯利兹）

Calcaritermes guatemalae 危地马拉距白蚁（中美洲、伯利兹、危地马拉、墨西哥、洪都拉斯）

*_Calcaritermes imminens_ 悬垂距白蚁（哥伦比亚）
Calcaritermes krishnai 克里希纳距白蚁（印度尼科巴群岛）
Calcaritermes nearcticus 新北距白蚁（美国）
Calcaritermes nigriceps 黑头距白蚁（南美洲、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴西、加勒比、格林纳达、特立尼达和多巴哥、圭亚那、巴拿马、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、委内瑞拉）
Calcaritermes parvinotus 小背距白蚁（墨西哥）
Calcaritermes rioensis 里约距白蚁（南美洲、巴西、厄瓜多尔、秘鲁、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）
Calcaritermes snyderi 斯奈德距白蚁（萨尔瓦多、巴拿马、伯利兹、危地马拉、洪都拉斯）
Calcaritermes temnocephalus 切头距白蚁（南美洲、秘鲁、苏里南、哥伦比亚、中美洲、巴拿马、哥斯达黎加、加勒比、马提尼克、特立尼达和多巴哥、伯利兹、多米尼克、厄瓜多尔、瓜德罗普（法）、危地马拉、洪都拉斯、马提尼克（法）、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、委内瑞拉）

角木白蚁属 *Ceratokalotermes*

*_Ceratokalotermes spoliator_ 掠夺角木白蚁（澳大利亚）

毛白蚁属 *Comatermes*

*_Comatermes perfectus_ 完美毛白蚁（中美洲、哥斯达黎加、巴拿马、洪都拉斯、尼加拉瓜、南美洲、委内瑞拉、玻利维亚、哥伦比亚、秘鲁、加勒比、多米尼克、格林纳达、瓜德罗普、马提尼克、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、安圭拉、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥）

堆砂白蚁属 *Cryptotermes*

Cryptotermes abruptus 陡额堆砂白蚁（墨西哥）
Cryptotermes aequacornis 等角堆砂白蚁（特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）
Cryptotermes albipes 白足堆砂白蚁（新喀里多尼亚、瓦努阿图）
Cryptotermes angustinotus 狭背堆砂白蚁（四川（江安））
Cryptotermes austrinus 澳大利亚堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes bengalensis 孟加拉堆砂白蚁（南亚、印度、斯里兰卡、中国、泰国）
Cryptotermes bracketti 布拉克特堆砂白蚁（巴哈马、圣萨尔瓦多岛）
Cryptotermes brevis 麻头堆砂白蚁（原产秘鲁智利沿海，现泛热带广布、加拿大、加那利群岛（西班牙）、埃及、以色列、意大利、马德拉群岛（葡萄牙）、葡萄牙、西班牙、美国）
Cryptotermes camelus 骆驼堆砂白蚁（玻利维亚）
Cryptotermes canalensis 卡纳拉堆砂白蚁（新喀里多尼亚）
*_Cryptotermes cavifrons_ 凹额堆砂白蚁（北美、美国、墨西哥、巴哈马、伯利兹、开曼群岛、哥斯达黎加、古巴、多米尼加、危地马拉、海地、牙买加、巴拿马、特克斯和凯科斯群岛）
Cryptotermes ceylonicus 锡兰堆砂白蚁（斯里兰卡）
Cryptotermes chacoensis 查科堆砂白蚁（巴拉圭、阿根廷、玻利维亚）
Cryptotermes chasei 蔡斯堆砂白蚁（多米尼加）
Cryptotermes colombianus 哥伦比亚堆砂白蚁（哥伦比亚）
Cryptotermes contognathus 短颚堆砂白蚁（巴西）
Cryptotermes crassicornis 粗角堆砂白蚁（南非）
Cryptotermes cristatus 高额堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes cryptognathus 隐颚堆砂白蚁（牙买加）

Cryptotermes cubicoceps 方头堆砂白蚁（圭亚那、特立尼达和多巴哥）
Cryptotermes cylindroceps 筒头堆砂白蚁（南美洲、委内瑞拉、哥伦比亚、阿鲁巴、博奈尔、库拉索）
Cryptotermes cymatofrons 波额堆砂白蚁（古巴、巴哈马）
Cryptotermes cynocephalus 犬头堆砂白蚁（菲律宾至澳大利亚、热带、印度尼西亚、马来西亚、夏威夷（美国）、巴布亚新几内亚、斯里兰卡）
Cryptotermes darlingtonae 达林顿堆砂白蚁（加勒比、瓜德罗普、圣卢西亚）
Cryptotermes darwini 达尔文堆砂白蚁（厄瓜多尔）
Cryptotermes daulti 道尔特堆砂白蚁（印度）
Cryptotermes declivis 铲头堆砂白蚁（中国）
Cryptotermes dolei 多尔堆砂白蚁（法属波利尼西亚）
Cryptotermes domesticus 截头堆砂白蚁（东洋界至澳洲界、东南亚、中国南部至太平洋岛屿、厄瓜多尔、加拿大、哥斯达黎加、巴拿马、星期四岛（澳大利亚）、特立尼达和多巴哥、特罗梅林岛（法国））
Cryptotermes dudleyi 长颚堆砂白蚁（澳大利亚、南亚、斯里兰卡、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴西、加拿大、中国、科科斯岛（哥斯达黎加）、哥伦比亚、哥斯达黎加、斐济、关岛、牙买加、肯尼亚、基里巴斯、马达加斯加、马绍尔群岛、毛里求斯、尼加拉瓜、尼日利亚、阿曼、巴拿马、巴布亚新几内亚、菲律宾、萨摩亚、所罗门群岛、索马里、坦桑尼亚、特立尼达和多巴哥、乌干达）
Cryptotermes fatulus 简单堆砂白蚁（厄瓜多尔、墨西哥）
Cryptotermes garifunae 加利福尼亚堆砂白蚁（洪都拉斯）
Cryptotermes gearyi 吉尔里堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes hainanensis 海南堆砂白蚁（中国海南）
Cryptotermes havilandi 叶额堆砂白蚁（非洲南部、南非、莫桑比克、西非、喀麦隆、尼日利亚、南美、巴西、安提瓜和巴布达、孟加拉国、巴巴多斯、欧罗巴岛（法国）、瓜德罗普、圭亚那、印度、秘鲁、圣基茨和尼维斯、安圭拉、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、美属维尔京群岛）
Cryptotermes hemicyclius 半圆堆砂白蚁（牙买加）
Cryptotermes hilli 希尔堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes juliani 胡利安堆砂白蚁（多米尼加）
Cryptotermes karachiensis 卡拉奇堆砂白蚁（巴基斯坦、卡拉奇）
Cryptotermes kirbyi 柯比堆砂白蚁（马达加斯加）
Cryptotermes kororensis 科罗尔堆砂白蚁（帕劳）
Cryptotermes longicollis 长颈堆砂白蚁（中美洲、巴拿马、洪都拉斯、墨西哥、多米尼加、海地、蒙特塞拉特、波多黎各、特立尼达和多巴哥）
Cryptotermes luodianis 罗甸堆砂白蚁（中国贵州）
Cryptotermes mangoldi 曼戈尔德堆砂白蚁（多米尼加、哥伦比亚）
Cryptotermes merwei 默维堆砂白蚁（南非）
Cryptotermes mobydicki 莫比迪克堆砂白蚁（法属圭亚那）
Cryptotermes naudei 诺代堆砂白蚁（南非）
Cryptotermes nitens 光亮堆砂白蚁（开曼群岛、古巴、牙买加）

Cryptotermes nitidus 亮头堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes pallidus 苍白堆砂白蚁（留尼汪、毛里求斯）
Cryptotermes papulosus 丘翅堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes parvifrons 小额堆砂白蚁（格林纳达、特立尼达和多巴哥）
Cryptotermes penaoru 佩奥鲁堆砂白蚁（瓦努阿图）
Cryptotermes perforans 穿孔堆砂白蚁（斯里兰卡）
Cryptotermes pingyangensis 平阳堆砂白蚁（浙江（平阳））
Cryptotermes primus 第一堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes pugnus 拳头堆砂白蚁（巴西）
Cryptotermes pyrodomus 锅房堆砂白蚁（巴巴多斯、圣文森特和格林纳丁斯）
Cryptotermes queenslandis 昆士兰堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes rhicnocephalus 噱头堆砂白蚁（特立尼达和多巴哥）
Cryptotermes riverinae 里弗赖纳堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes roonwali 鲁恩沃堆砂白蚁（印度南部、喀拉拉、卡纳塔克）
Cryptotermes rotundiceps 圆头堆砂白蚁（加勒比、多米尼加、波多黎各）
Cryptotermes secundus 第二堆砂白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Cryptotermes silvestrii 西尔韦斯特里堆砂白蚁（刚果、刚果民主共和国、尼日利亚）
Cryptotermes simulatus 似昆士兰堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes spathifrons 剑额堆砂白蚁（开曼群岛、古巴、多米尼加）
Cryptotermes sukauensis 苏高堆砂白蚁（马来西亚沙巴）
Cryptotermes sumatrensis 苏门答腊堆砂白蚁（印尼）
Cryptotermes thailandis 泰国堆砂白蚁（泰国、马来西亚）
Cryptotermes tropicalis 热带堆砂白蚁（澳大利亚）
Cryptotermes undulans 纹头堆砂白蚁（波多黎各、美属维尔京群岛）
Cryptotermes venezolanus 委内瑞拉堆砂白蚁（委内瑞拉）
Cryptotermes verruculosus 多疣堆砂白蚁（南美洲、玻利维亚、圭亚那）

上木白蚁属 *Epicalotermes*

**Epicalotermes aethiopicus* 埃塞俄比亚上木白蚁（肯尼亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、沙特阿拉伯、也门）
Epicalotermes kempae 肯帕上木白蚁（肯尼亚、坦桑尼亚）
Epicalotermes mkuzii 摩库兹上木白蚁（南非、斯威士兰、坦桑尼亚）
Epicalotermes munroi 芒罗上木白蚁（南非）
Epicalotermes pakistanicus 巴基斯坦上木白蚁（巴基斯坦）
Epicalotermes planifrons 扁额上木白蚁（马达加斯加）

真砂白蚁属 *Eucryptotermes*

Eucryptotermes breviceps 短头真砂白蚁（南美洲、巴西、法属圭亚那）
**Eucryptotermes hagenii* 哈根真砂白蚁（南美洲、巴西、阿根廷）

树白蚁属 *Glyptotermes*

Glyptotermes adamsoni 亚当森树白蚁（格林纳达、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）
Glyptotermes albofemoralis 白足树白蚁（中国台湾）

Glyptotermes almorensis 阿尔莫拉树白蚁（印度）
Glyptotermes amplus 大型树白蚁（圣卢西亚、马提尼克）
Glyptotermes angustithorax 狭胸树白蚁（中国海南）
Glyptotermes angustus 变狭树白蚁（哥斯达黎加、伯利兹、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马）
Glyptotermes arshadi 阿沙德树白蚁（孟加拉国）
Glyptotermes asperatus 粗糙树白蚁（哥斯达黎加）
Glyptotermes baliochilus 花唇树白蚁（中国海南）
Glyptotermes barretti 巴雷特树白蚁（澳大利亚）
Glyptotermes besarensis 贝萨树白蚁（印度尼西亚）
Glyptotermes bilobatus 双裂树白蚁（巴拿马、哥斯达黎加）
Glyptotermes bimaculifrons 双斑树白蚁（中国四川）
Glyptotermes borneensis 婆罗树白蚁（马来西亚）
Glyptotermes brachythorax 短胸树白蚁（中国海南）
Glyptotermes brevicaudatus 短尾树白蚁（马来西亚、印度、印度尼西亚、泰国）
Glyptotermes brevicornis 短角树白蚁（澳大利亚、斐济、新西兰）
Glyptotermes buttelreepeni 巴特里彭树白蚁（马来西亚）
Glyptotermes canellae 卡内尔树白蚁（巴西、巴拉圭、阿根廷）
Glyptotermes caudomunitus 具尾树白蚁（印度尼西亚、印度、马来西亚）
Glyptotermes ceylonicus 锡兰树白蚁（斯里兰卡）
Glyptotermes chapmani 查普曼树白蚁（菲律宾）
Glyptotermes chatterjii 查特杰树白蚁（马来西亚）
Glyptotermes chinpingensis 金平树白蚁（中国云南）
Glyptotermes chiraharitae 常绿树白蚁（印度）
Glyptotermes concavifrons 凹额树白蚁（印度尼西亚）
Glyptotermes contracticornis 缩角树白蚁（哥斯达黎加、危地马拉、尼加拉瓜、巴拿马）
Glyptotermes coorgensis 古尔格树白蚁（印度）
Glyptotermes curticeps 短头树白蚁（中国福建）
Glyptotermes daiyunensis 戴云树白蚁（中国福建）
Glyptotermes daweishanensis 大围山树白蚁（中国云南）
Glyptotermes dentatus 具齿树白蚁（马来西亚）
Glyptotermes dilatatus 延伸树白蚁（斯里兰卡）
Glyptotermes emei 峨嵋树白蚁（中国四川）
Glyptotermes eucalypti 桉树树白蚁（澳大利亚）
Glyptotermes euryceps 宽头树白蚁（中国四川）
Glyptotermes ficus 榕树白蚁（中国贵州）
Glyptotermes finniganensis 菲尼根树白蚁（澳大利亚）
Glyptotermes franciae 弗朗西亚树白蚁（菲律宾）
Glyptotermes fujianensis 福建树白蚁（中国福建、日本、中国台湾）
Glyptotermes fuscus 黑树白蚁（日本、中国台湾）
Glyptotermes guamensis 关岛树白蚁（关岛）

Glyptotermes guianaensis 圭亚那树白蚁（圭亚那、法属圭亚那）
Glyptotermes guizhouensis 贵州树白蚁（中国贵州）
Glyptotermes hejiangensis 合江树白蚁（中国四川）
Glyptotermes hendrickxi 亨德里克斯树白蚁（刚果民主共和国）
Glyptotermes hesperus 川西树白蚁（中国四川）
Glyptotermes hickmani 希克曼树白蚁（巴拉圭）
Glyptotermes hospitalis 客居树白蚁（圭亚那）
Glyptotermes ignotus 忽视树白蚁（乌干达）
Glyptotermes insulanus 岛栖树白蚁（圣多美和普林西比）
Glyptotermes iridipennis 虹翅树白蚁（澳大利亚）
Glyptotermes jinyunensis 缙云树白蚁（中国四川）
Glyptotermes jurioni 朱里翁树白蚁（刚果民主共和国）
Glyptotermes kachongensis 卡冲树白蚁（泰国、马来西亚）
Glyptotermes kawandae 卡旺达树白蚁（乌干达）
Glyptotermes kirbyi 柯比树白蚁（印度尼西亚）
Glyptotermes kunakensis 库纳克树白蚁（马来西亚）
Glyptotermes laticaudomunitus 宽尾树白蚁（马来西亚）
Glyptotermes latignathus 阔颚树白蚁（中国四川）
Glyptotermes latithorax 宽胸树白蚁（中国广东）
Glyptotermes liangshanensis 凉山树白蚁（中国四川）
Glyptotermes liberatus 自由树白蚁（加勒比、危地马拉）
Glyptotermes lighti 莱特树白蚁（马绍尔群岛、所罗门群岛）
Glyptotermes limulingensis 黎母岭树白蚁（中国海南）
Glyptotermes longipennis 长翅树白蚁（哥伦比亚）
Glyptotermes longnanensis 陇南树白蚁（中国甘肃）
Glyptotermes longuisculus 稍长树白蚁（刚果民主共和国）
Glyptotermes luteus 蜡黄树白蚁（印度尼西亚）
Glyptotermes maculifrons 麻额树白蚁（中国福建）
Glyptotermes magnioculus 大眼树白蚁（中国四川）
Glyptotermes magsaysayi 麦格赛赛树白蚁（菲律宾）
Glyptotermes mandibulicinus 翘颚树白蚁（中国海南）
Glyptotermes marlatti 马拉特树白蚁（哥斯达黎加）
Glyptotermes matsuurai 松浦树白蚁（澳大利亚）
Glyptotermes minutus 较小树白蚁（斯里兰卡）
Glyptotermes montanus 高山树白蚁（印度尼西亚）
Glyptotermes nadaensis 那大树白蚁（中国广东）
Glyptotermes nakajimai 中岛树白蚁（日本、韩国）
Glyptotermes neoborneensis 新婆罗树白蚁（马来西亚）
Glyptotermes nevermani 内韦曼树白蚁（哥斯达黎加）
Glyptotermes nicobarensis 尼科巴树白蚁（印度）

Glyptotermes niger 黑色树白蚁（印度尼西亚）
Glyptotermes nissanensis 尼桑树白蚁（巴布亚新几内亚）
Glyptotermes orthognathus 直颚树白蚁（中国四川）
Glyptotermes palauensis 帕劳树白蚁（帕劳、密克罗尼西亚）
Glyptotermes panaitanensis 巴拉依丹树白蚁（印度尼西亚）
Glyptotermes paracaudomunitus 似具尾树白蚁（马来西亚）
Glyptotermes paratuberculatus 似具瘤树白蚁（马来西亚）
Glyptotermes parki 帕克树白蚁（卢旺达、喀麦隆、刚果民主共和国、乌干达）
Glyptotermes parvoculatus 小眼树白蚁（加勒比、委内瑞拉）
Glyptotermes parvulus 细小树白蚁（刚果民主共和国、加纳、科特迪瓦、乌干达）
Glyptotermes parvus 小树白蚁（中国云南）
Glyptotermes pellucidus 清晰树白蚁（圭亚那、委内瑞拉）
Glyptotermes perparvus 极小树白蚁（圭亚那、巴西、法属圭亚那）
Glyptotermes pinangae 槟榔树白蚁（马来西亚、泰国）
Glyptotermes planus 平扁树白蚁（哥斯达黎加）
Glyptotermes posticus 后部树白蚁（古巴、海地、牙买加、美属维尔京群岛）
Glyptotermes pubescens 柔毛树白蚁（加勒比）
Glyptotermes reticulatus 似网树白蚁（坦桑尼亚）
Glyptotermes rotundifrons 圆额树白蚁（巴拿马）
Glyptotermes satsumensis 赤树白蚁（日本、中国台湾）
Glyptotermes schmidti 施密德树白蚁（瓦努阿图）
Glyptotermes scotti 斯科特树白蚁（塞舌尔）
Glyptotermes seeversi 西弗斯树白蚁（洪都拉斯、墨西哥）
Glyptotermes sensarmai 森萨尔马树白蚁（印度、孟加拉国）
Glyptotermes sepilokensis 西比洛克树白蚁（马来西亚、印度尼西亚）
Glyptotermes shaanxiensis 陕西树白蚁（中国陕西）
Glyptotermes sicki 西克树白蚁（巴西）
Glyptotermes simaoensis 思茅树白蚁（中国云南）
Glyptotermes sinomalatus 弯翅树白蚁（刚果民主共和国）
Glyptotermes succineus 琥珀树白蚁（中国贵州）
Glyptotermes suturis 缝合树白蚁（哥斯达黎加）
Glyptotermes taruni 塔鲁恩树白蚁（印度）
Glyptotermes taveuniensis 塔韦乌尼树白蚁（斐济）
Glyptotermes teknafensis 代格纳夫树白蚁（孟加拉国、印度）
Glyptotermes thailandis 泰国树白蚁（泰国）
Glyptotermes tikaderi 铁卡德树白蚁（印度）
Glyptotermes tripurensis 特里普拉树白蚁（印度）
Glyptotermes truncatus 伤残树白蚁（哥伦比亚）
Glyptotermes tsaii 蔡氏树白蚁（中国云南）
**Glyptotermes tuberculatus* 具瘤树白蚁（澳大利亚、新西兰）

Glyptotermes tuberifer 具疣树白蚁（加勒比、危地马拉）
Glyptotermes ueleensis 韦莱树白蚁（刚果民主共和国、肯尼亚、乌干达）
Glyptotermes ukhiaensis 乌吉亚树白蚁（孟加拉国、印度）
Glyptotermes verrucosus 疣多树白蚁（哥斯达黎加）
Glyptotermes xantholabrum 黄唇树白蚁（萨摩亚、巴布亚新几内亚、法属波利尼西亚、瓦努阿图）
Glyptotermes xiamenensis 厦门树白蚁（中国福建）
Glyptotermes yingdeensis 英德树白蚁（中国广东）
Glyptotermes yui 尤氏树白蚁（中国海南）
Glyptotermes zhaoi 赵氏树白蚁（中国福建）

楹白蚁属 *Incisitermes*

Incisitermes banksi 班克斯楹白蚁（美国、墨西哥）
Incisitermes barretti 巴雷特楹白蚁（澳大利亚）
Incisitermes bequaerti 贝奎特楹白蚁（巴哈马、波多黎各、古巴、百慕大、库拉索、多米尼加、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、美属维尔京群岛）
Incisitermes didwanaensis 迪德瓦纳楹白蚁（印度）
Incisitermes emersoni 埃默森楹白蚁（墨西哥）
Incisitermes fruticavus 蛀果楹白蚁（美国）
Incisitermes furvus 暗黑楹白蚁（波多黎各）
Incisitermes galapagoensis 加拉帕戈斯楹白蚁（厄瓜多尔）
Incisitermes immigrans 移境楹白蚁（中美洲至波利尼西亚）
Incisitermes inamurai 稻村楹白蚁（中国台湾）
Incisitermes incisus 切割楹白蚁（瓜德罗普、巴巴多斯、蒙特塞拉特、安提瓜和巴布达、巴哈马、哥伦比亚、古巴、多米尼克、荷属安的列斯、波多黎各、圣基茨和尼维斯及安圭拉、圣卢西亚、法属圣马丁、特克斯和凯科斯群岛、委内瑞拉、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛）
Incisitermes laterangularis 侧角楹白蚁（中国）
Incisitermes lisae 莉萨楹白蚁（伯利兹、危地马拉、墨西哥）
Incisitermes marginipennis 缘翅楹白蚁（墨西哥、危地马拉、巴拿马）
Incisitermes mariae 玛丽亚楹白蚁（哥伦比亚、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）
Incisitermes marianus 马里亚纳楹白蚁（北马里亚纳群岛）
Incisitermes mcgregori 麦格雷戈楹白蚁（菲律宾）
Incisitermes milleri 米勒楹白蚁（美国、多米尼加、巴哈马、开曼群岛、古巴、牙买加、特克斯和凯科斯群岛）
Incisitermes minor 小楹白蚁（美国西部、墨西哥北部；引入：加拿大、中国、夏威夷（美国）、意大利、日本）
Incisitermes nishimurai 西村楹白蚁（中美洲）
Incisitermes pacificus 太平洋楹白蚁（厄瓜多尔）
Incisitermes platycephalus 宽头楹白蚁（墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜）
Incisitermes repandus 转变楹白蚁（瓦努阿图、澳大利亚、斐济、马绍尔群岛、萨摩亚）
Incisitermes rhyzophorae 红树楹白蚁（古巴、巴哈马）

*_Incisitermes schwarzi_ 施瓦茨楹白蚁（墨西哥、美国、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、伯利兹、博奈尔、开曼群岛、哥伦比亚、古巴、库拉索、多米尼克、多米尼加、格林纳达、法属瓜德罗普、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、法属马提尼克、尼加拉瓜、巴拿马、波多黎各、圣基茨和尼维斯及安圭拉、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、委内瑞拉）
Incisitermes seeversi 西弗斯楹白蚁（墨西哥、危地马拉）
Incisitermes semilunaris 半月楹白蚁（新喀里多尼亚）
Incisitermes snyderi 斯奈德楹白蚁（美国、墨西哥、巴哈马、百慕大、哥斯达黎加、古巴、巴拿马、波多黎各、特克斯和凯科斯群岛、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛）
Incisitermes solidus 坚硬楹白蚁（不明）
Incisitermes taylori 泰勒楹白蚁（菲律宾）

木白蚁属 *Kalotermes*

Kalotermes aemulus 竞争木白蚁（澳大利亚）
Kalotermes approximatus 邻近木白蚁（美国、百慕大）
Kalotermes atratus 黑色木白蚁（澳大利亚）
Kalotermes banksiae 山龙眼木白蚁（澳大利亚/新西兰、澳大利亚、诺福克岛、新西兰）
Kalotermes brouni 布龙木白蚁（新西兰）
Kalotermes capicola 开普敦木白蚁（南非）
Kalotermes cognatus 共生木白蚁（新西兰、澳大利亚）
Kalotermes convexus 凸木白蚁（澳大利亚）
Kalotermes dispar 不同木白蚁（西班牙）
*_Kalotermes flavicollis_ 黄颈木白蚁（地中海区、南欧、北非、西亚）
Kalotermes gracilignathus 细颚木白蚁（智利、胡安费尔南德斯群岛、秘鲁）
Kalotermes hilli 希尔木白蚁（澳大利亚）
Kalotermes isaloensis 伊萨卢木白蚁（马达加斯加、科摩罗）
Kalotermes italicus 意大利木白蚁（意大利中部、托斯卡纳、美国）
Kalotermes jepsoni 杰普森木白蚁（斯里兰卡）
Kalotermes monticola 山栖木白蚁（阿尔及利亚、北非）
brachycephala 短头亚种
monticola 指名亚种
Kalotermes pallidinotum 白背木白蚁（澳大利亚）
Kalotermes phoeniciae 腓尼基木白蚁（地中海东岸、黎凡特）
Kalotermes rufinotum 红背木白蚁（澳大利亚）
Kalotermes serrulatus 细锯齿木白蚁（澳大利亚）
Kalotermes umtatae 乌姆塔塔木白蚁（南非）

头长白蚁属 *Longicaputermes*

*_Longicaputermes sinaicus_ 西奈头长白蚁（埃及西奈半岛、以色列）

边白蚁属 *Marginitermes*

Marginitermes absitus 遥远边白蚁（澳大利亚）
Marginitermes cactiphagus 食刺边白蚁（墨西哥、洪都拉斯、危地马拉、尼加拉瓜）
*_Marginitermes hubbardi_ 哈伯德边白蚁（北美、美国、墨西哥）

新白蚁属 *Neotermes*

Neotermes aburiensis 阿布里新白蚁（西非、尼日利亚、加纳、科特迪瓦、刚果民主共和国）
Neotermes acceptus 宜人新白蚁（巴西）
Neotermes adampurensis 阿达姆普尔新白蚁（孟加拉国）
Neotermes agilis 轻快新白蚁（喀麦隆、加纳、尼日利亚）
Neotermes amplilabralis 宽唇新白蚁（云南（河口））
Neotermes andamanensis 安达曼新白蚁（印度）
Neotermes angustigulus 细颏新白蚁（中国、云南）
Neotermes araguaensis 阿拉瓜新白蚁（委内瑞拉）
Neotermes aridus 干新白蚁（埃塞俄比亚、肯尼亚）
Neotermes arthurimuelleri 阿图尔米勒新白蚁（巴西）
Neotermes artocarpi 阿托卡尔佩新白蚁（马来西亚、沙捞越、印度尼西亚、缅甸）
Neotermes assamensis 阿萨姆新白蚁（印度、阿萨姆）
Neotermes assmuthi 阿斯穆斯新白蚁（印度、卡纳塔克）
Neotermes binovatus 双凹新白蚁（海南（乐会））
Neotermes blairi 布莱尔新白蚁（印度）
Neotermes bosei 鲍斯新白蚁（印度、不丹）
Neotermes brachynotum 扁胸新白蚁（中国、云南）
Neotermes brevinotus 短背新白蚁（哥斯达黎加、洪都拉斯）
Neotermes buxensis 布克萨新白蚁（印度）
Neotermes camerunensis 喀麦隆新白蚁（塞内加尔、喀麦隆、尼日利亚、圣多美和普林西比）
**Neotermes castaneus* 栗色新白蚁（中美洲（巴拿马、哥斯达黎加、伯利兹、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜）、加勒比海地区（巴哈马、古巴、巴巴多斯、百慕大、开曼群岛、多米尼克、多米尼加、海地、牙买加、蒙特塞拉特、波多黎各、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛）、美国、南美洲（巴西、智利、哥伦比亚、法属圭亚那、委内瑞拉））
Neotermes chilensis 智利新白蚁（智利）
Neotermes collarti 科勒特新白蚁（刚果民主共和国）
Neotermes connexus 连接新白蚁（美国、关岛、北马里亚纳群岛）
Neotermes costaseca 干海岸新白蚁（秘鲁）
Neotermes cryptops 隐秘新白蚁（坦桑尼亚、乌干达）
Neotermes cubanus 古巴新白蚁（古巴）
Neotermes dalbergiae 黄檀新白蚁（印度尼西亚）
Neotermes desneuxi 德纳新白蚁（马达加斯加、坦桑尼亚）
Neotermes dhirendrai 迪伦德拉新白蚁（印度、泰米尔纳德）
Neotermes dolichognathus 长颚新白蚁（广东（紫金））
Neotermes dubiocalcaratus 异距新白蚁（云南（芒市））
Neotermes eleanorae 埃莉诺新白蚁（印度、卡纳塔克）
Neotermes erythraeus 微红新白蚁（厄立特里亚、埃塞俄比亚）
Neotermes europae 欧罗巴新白蚁（欧罗巴岛、马达加斯加、留尼汪）
Neotermes ferrugineus 锈色新白蚁（巴布亚新几内亚）

Neotermes firmus 坚固新白蚁（肯尼亚）
Neotermes fletcheri 弗莱彻新白蚁（印度、孟加拉国、斯里兰卡）
Neotermes fovefrons 洼额新白蚁（中国、云南）
Neotermes fujianensis 福建新白蚁（中国、福建、广东、广西）
Neotermes fulvescens 金黄新白蚁（巴西、阿根廷、玻利维亚、巴拉圭）
Neotermes gestri 盖斯特新白蚁（赤道几内亚、喀麦隆、尼日利亚、圣多美和普林西比）
Neotermes glabriusculus 光滑新白蚁（巴西）
Neotermes gnathoferrum 铁颚新白蚁（斐济）
Neotermes gracilidens 细齿新白蚁（马达加斯加）
Neotermes grandis 大新白蚁（菲律宾）
Neotermes greeni 格林新白蚁（斯里兰卡）
Neotermes hirtellus 粗毛新白蚁（南美洲、巴西、阿根廷）
Neotermes holmgreni 霍姆格伦新白蚁（中美洲、巴拿马、哥斯达黎加、危地马拉、墨西哥、南美洲、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、加勒比、格林纳达、马提尼克、特立尼达和多巴哥）
Neotermes humilis 小新白蚁（中国）
Neotermes insularis 岛生新白蚁（澳大利亚、新西兰）
Neotermes intracaulis 茎内新白蚁（加勒比、圣巴泰勒米、瓜德罗普、阿鲁巴、巴巴多斯、博奈尔、法属圣马丁、美属维尔京群岛、哥伦比亚、委内瑞拉）
Neotermes jouteli 茹泰尔新白蚁（北美、美国、墨西哥、加勒比、巴哈马、古巴、多米尼加、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、澳大利亚）
Neotermes kalimpongensis 噶伦堡新白蚁（印度、西孟加拉）
Neotermes kanehirai 凯恩希拉新白蚁（台湾、帕劳）
Neotermes kartaboensis 卡尔塔波新白蚁（法属圭亚那、圭亚那）
Neotermes kemneri 凯姆勒新白蚁（南亚、印度、斯里兰卡）
Neotermes keralai 喀拉拉新白蚁（印度、喀拉拉）
Neotermes ketelensis 凯特拉新白蚁（印尼）
Neotermes koshunensis 恒春新白蚁（东亚、台湾、日本）
Neotermes krishnai 克里希纳新白蚁（印度）
Neotermes lagunensis 内湖新白蚁（菲律宾）
Neotermes larseni 拉森新白蚁（哥斯达黎加、墨西哥）
Neotermes laticollis 宽颈新白蚁（塞舌尔）
Neotermes lepersonneae 勒佩索纳新白蚁（刚果民主共和国）
Neotermes longiceps 长头新白蚁（中国、海南、香港）
Neotermes longipennis 长翅新白蚁（印尼）
Neotermes ludaoensis 绿岛新白蚁（台湾、绿岛）
Neotermes luykxi 卢伊克斯新白蚁（加勒比、巴哈马、特克斯和凯科斯群岛、美国）
Neotermes magnoculus 大眼新白蚁（玻利维亚、巴西）
Neotermes malatensis 马拉蒂新白蚁（菲律宾）
Neotermes mangiferae 芒果新白蚁（印度）
Neotermes medius 中部新白蚁（印度尼西亚）

Neotermes megaoculatus 巨眼新白蚁（印度）
lakhimpuri 勒金布尔亚种
megaoculatus 指名亚种
Neotermes meruensis 梅鲁新白蚁（东非/中非、肯尼亚、坦桑尼亚）
Neotermes microculatus 小眼新白蚁（印度）
Neotermes microphthalmus 小眸新白蚁（菲律宾）
Neotermes minutus 微小新白蚁（马来西亚）
Neotermes miracapitalis 奇头新白蚁（云南（金平））
Neotermes modestus 适度新白蚁（阿根廷）
Neotermes mona 莫纳新白蚁（加勒比、波多黎各、巴哈马、特克斯和凯科斯群岛、多米尼加、海地、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、墨西哥）
Neotermes nigeriensis 尼日利亚新白蚁（尼日利亚）
Neotermes nilamburensis 尼伦布尔新白蚁（印度）
Neotermes ovatus 卵形新白蚁（印尼）
Neotermes pallidicollis 灰颈新白蚁（喀麦隆、尼日利亚、圣多美和普林西比）
Neotermes papua 巴布亚新白蚁（巴布亚新几内亚）
Neotermes paraensis 帕拉新白蚁（巴西）
Neotermes paratensis 帕拉蒂新白蚁（印度）
Neotermes parviscutatus 小盾新白蚁（菲律宾）
Neotermes phragmosus 护穴新白蚁（墨西哥、古巴）
Neotermes pingshanensis 屏山新白蚁（中国）
Neotermes platyfrons 宽额新白蚁（多米尼加）
Neotermes prosonneratiae 前海桑新白蚁（孟加拉国）
Neotermes rainbowi 雷恩鲍新白蚁（库克群岛、关岛、基里巴斯、马绍尔群岛、图瓦卢）
Neotermes rhizophorae 红树新白蚁（印度）
Neotermes rouxi 鲁新白蚁（新喀里多尼亚）
Neotermes saleierensis 萨莱尔新白蚁（印尼）
Neotermes samoanus 萨摩亚新白蚁（萨摩亚）
Neotermes sanctaecrucis 圣克鲁斯新白蚁（所罗门群岛、瓦努阿图）
Neotermes sarasini 萨拉赞新白蚁（新喀里多尼亚、萨摩亚）
Neotermes schultzei 舒尔茨新白蚁（巴布亚新几内亚）
Neotermes sepulvillus 缺附垫新白蚁（刚果民主共和国）
Neotermes setifer 刚毛新白蚁（巴拿马）
Neotermes shimogensis 希莫加新白蚁（印度、卡纳塔克）
Neotermes sinensis 中华新白蚁（中国、广东）
Neotermes sjostedti 舍斯泰特新白蚁（瓦努阿图）
Neotermes sonneratiae 海桑新白蚁（印尼）
Neotermes sphenocephalus 楔头新白蚁（中国、云南）
Neotermes sugioi 杉尾新白蚁（东亚、日本、台湾）
Neotermes superans 充裕新白蚁（埃塞俄比亚）

Neotermes taishanensis 台山新白蚁（中国、广东）
Neotermes tectonae 柚木新白蚁（印尼、马来西亚）
Neotermes tuberogulus 丘颏新白蚁（中国、云南）
Neotermes undulatus 波颚新白蚁（中国、云南）
Neotermes venkateshwara 文卡特斯沃拉新白蚁（印度、泰米尔纳德）
Neotermes viraktamathi 维拉格塔马蒂新白蚁（印度、卡纳塔克）
Neotermes voeltzkowi 弗尔特科新白蚁（马达加斯加）
Neotermes wagneri 瓦格纳新白蚁（巴西、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥）
Neotermes yunnanensis 云南新白蚁（中国、云南）
Neotermes zanclus 镰刀新白蚁（巴西）
Neotermes zuluensis 祖鲁新白蚁（南非）

近新白蚁属 *Paraneotermes*

**Paraneotermes simplicicornis* 简角近新白蚁（北美、美国、墨西哥）

后琥珀白蚁属 *Postelectrotermes*

Postelectrotermes amplus 大后琥珀白蚁（马达加斯加）
Postelectrotermes bhimi 比姆后琥珀白蚁（南亚、印度）
Postelectrotermes bidentatus 二齿后琥珀白蚁（伊朗）
Postelectrotermes castaneiceps 栗头后琥珀白蚁（马达加斯加）
Postelectrotermes howa 合华后琥珀白蚁（印度洋岛屿、马达加斯加、留尼汪、科摩罗、毛里求斯、留尼汪（法））
Postelectrotermes longiceps 长头后琥珀白蚁（马达加斯加）
Postelectrotermes longus 长后琥珀白蚁（科摩罗、马达加斯加、塞舌尔）
Postelectrotermes militaris 好斗后琥珀白蚁（斯里兰卡）
Postelectrotermes nayari 纳亚尔后琥珀白蚁（印度）
Postelectrotermes pasniensis 伯斯尼后琥珀白蚁（南亚、巴基斯坦、伊朗）
Postelectrotermes pishinensis 比欣后琥珀白蚁（南亚、巴基斯坦俾路支）
**Postelectrotermes praecox* 早熟后琥珀白蚁（马德拉群岛（葡））
Postelectrotermes sordwanae 索瓦德纳后琥珀白蚁（西非、科特迪瓦、南非）
Postelectrotermes tongyaii 同艾后琥珀白蚁（泰国）
Postelectrotermes zabuliensis 扎布尔后琥珀白蚁（西亚、伊朗）

前砂白蚁属 *Procryptotermes*

Procryptotermes australiensis 澳大利亚前砂白蚁（澳大利亚）
Procryptotermes corniceps 角头前砂白蚁（加勒比）
Procryptotermes dhari 达尔前砂白蚁（印度）
Procryptotermes dioscurae 迪奥斯屈阿前砂白蚁（索科特拉岛、也门）
Procryptotermes edwardsi 爱德华兹前砂白蚁（加勒比）
Procryptotermes falcifer 具镰前砂白蚁（留尼汪、毛里求斯、法属留尼汪）
**Procryptotermes fryeri* 弗赖尔前砂白蚁（塞舌尔）
Procryptotermes hesperus 西部前砂白蚁（巴哈马、古巴、墨西哥）
Procryptotermes hunsurensis 洪苏尔前砂白蚁（印度）

Procryptotermes krishnai 克里希纳前砂白蚁（新喀里多尼亚、法属新喀里多尼亚）
Procryptotermes leewardensis 背风群岛前砂白蚁（加勒比）
Procryptotermes rapae 拉帕前砂白蚁（法属波利尼西亚）
Procryptotermes speiseri 斯派泽前砂白蚁（瓦努阿图）
Procryptotermes valeriae 瓦莱里前砂白蚁（印度）

前新白蚁属 *Proneotermes*

Proneotermes latifrons 宽额前新白蚁（委内瑞拉）
Proneotermes macondianus 马康多前新白蚁（哥伦比亚）
**Proneotermes perezi* 佩雷斯前新白蚁（哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、巴拿马）

翅白蚁属 *Pterotermes*

**Pterotermes occidentis* 西部翅白蚁（北美、美国、墨西哥）

罗伊辛白蚁属 *Roisinitermes*

**Roisinitermes ebogoensis* 埃博戈罗伊辛白蚁（喀麦隆）

皱白蚁属 *Rugitermes*

Rugitermes aridus 干皱白蚁（秘鲁）
Rugitermes athertoni 阿瑟顿皱白蚁（法属波利尼西亚）
Rugitermes bicolor 双色皱白蚁（委内瑞拉、圭亚那、特立尼达和多巴哥）
Rugitermes costaricensis 哥斯达黎加皱白蚁（哥斯达黎加）
Rugitermes flavicinctus 金黄皱白蚁（巴西、圭亚那、特立尼达和多巴哥）
Rugitermes kirbyi 柯比皱白蚁（哥斯达黎加、巴拿马）
Rugitermes laticollis 宽颈皱白蚁（厄瓜多尔、玻利维亚）
Rugitermes magninotus 大背皱白蚁（厄瓜多尔、圭亚那、秘鲁、巴西）
Rugitermes niger 黑色皱白蚁（巴西、阿根廷）
**Rugitermes nodulosus* 结节皱白蚁（巴西）
Rugitermes occidentalis 西部皱白蚁（巴西、阿根廷、乌拉圭）
Rugitermes panamae 巴拿马皱白蚁（巴拿马）
Rugitermes rufus 红色皱白蚁（玻利维亚）
Rugitermes rugosus 皱纹皱白蚁（巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭）
Rugitermes tinto 咖啡皱白蚁（哥伦比亚）
Rugitermes unicolor 单色皱白蚁（哥斯达黎加、危地马拉、伯利兹、洪都拉斯、墨西哥）
Rugitermes ursulae 小熊皱白蚁（哥伦比亚）
Rugitermes volcanensis 火山皱白蚁（玻利维亚）

牛白蚁属 *Tauritermes*

Tauritermes bandeirai 班代拉牛白蚁（巴西）
**Tauritermes taurocephalus* 牛头牛白蚁（巴西、阿根廷、玻利维亚）
Tauritermes triceromegas 三混气牛白蚁（巴拉圭、阿根廷、巴西）
Tauritermes vitulus 公犊牛白蚁（巴西）

新等翅类 Neoisoptera

沙白蚁科 PSAMMOTERMITIDAE

沙白蚁亚科（Psammotermitinae）由 Holmgren 于 1911 年建立，2024 年系统发育研究将其提升为科（Psammotermitidae）[21]。模式属为 *Psammotermes* Desneux, 1902；科名由希腊语 *psammos*（沙）与 *termes* 组合，指其栖居沙质土壤的习性。本名录收录 2 属 18 种。

本科仅含 2 个现生属，且两属生态习性反差很大。二者都无真正的工蚁品级（以拟工蚁 pseudergate 承担巢内劳动）。本科兵蚁为大颚型，头壳骨化、卵圆形至前端略收窄，额面具囟门，由囟门向后唇基延伸出或明显或隐微的纵沟，兵蚁前、中、后足胫节端距式为 3:2:2；有翅蚁前胸背板扁平，跗节 4 节，囟门位于头中部，单眼存在，触角 15–22 节。*Psammotermes* 为典型荒漠白蚁，广布非洲南部至西非、东北非与北非，经阿拉伯半岛、伊朗至印度西北部，并见于马达加斯加；其在沙质土壤中自行挖掘巢室与隧道，也占用其他白蚁废弃巢穴，食性极广，取食干草、枯落物、兽粪乃至风吹堆积的有机碎屑。*Prorhinotermes* 为岛屿海岸型，广布印度洋岛屿、南亚、东南亚、中国南部与台湾、澳大利亚北部及西太平洋岛屿，并见于中美洲及加勒比，推测其群体可借漂木随洋流扩散，多栖于潮间带附近潮湿腐木，如红树林生境[22]。*Psammotermes* 个别种类在干旱区危害作物与土工结构。如 *Psammotermes hypostoma* 在北非与中东危害木构件与作物[23]，*Prorhinotermes simplex* 在美国佛罗里达危害木结构建筑[24]。



沙白蚁 *Psammotermes sp.*(https://www.inaturalist.org/observations/338446969)

原鼻白蚁属 *Prorhinotermes*

Prorhinotermes canalifrons 沟额原鼻白蚁（印度洋岛屿、留尼汪、马达加斯加、法国、可可斯（基林）群岛、科摩罗、毛里求斯、留尼汪（法）、塞舌尔）

Prorhinotermes cotym 科廷原鼻白蚁（印度）

Prorhinotermes flavus 黄色原鼻白蚁（东南亚、菲律宾、新加坡、泰国、南亚、印度、斯里兰卡、孟加拉国、中国、印度尼西亚、马来西亚、台湾）

Prorhinotermes hainanensis 海南原鼻白蚁（中国、海南）

**Prorhinotermes inopinatus* 意外原鼻白蚁（澳洲界、澳大利亚北部、西太平洋岛屿、斐济、关岛（美）、印度尼西亚、基里巴斯、马绍尔群岛、新喀里多尼亚（法）、北马里亚纳群岛、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、瓦努阿图、瓦利斯和富图纳群岛）

Prorhinotermes molinoi 莫利诺原鼻白蚁（巴拿马、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯）

Prorhinotermes oceanicus 海洋原鼻白蚁（哥斯达黎加、哥斯达黎加可可斯岛）

Prorhinotermes ponapensis 波纳佩原鼻白蚁（密克罗尼西亚、波纳佩岛）

Prorhinotermes rugifer 具皱原鼻白蚁（印尼、印度尼西亚）

Prorhinotermes simplex 简单原鼻白蚁（美国、中美洲、伯利兹、哥斯达黎加、加勒比、古巴、巴哈马、牙买加、波多黎各）

Prorhinotermes spectabilis 奇丽原鼻白蚁（中国、云南）

Prorhinotermes xishaensis 西沙原鼻白蚁（中国、西沙群岛）

沙白蚁属 *Psammotermes*

Psammotermes allocerus 奇白沙白蚁（非洲南部、纳米比亚、南非、安哥拉、博茨瓦纳、埃及）

**Psammotermes hybostoma* 弯嘴沙白蚁（西非、塞内加尔至东北非、阿尔及利亚、巴林、埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚、以色列、科威特、利比亚、毛里塔尼亚、尼日尔、阿曼、沙特阿拉伯、南非、苏丹、也门）

Psammotermes prohybostoma 似弯嘴沙白蚁（伊朗）

Psammotermes rajasthanicus 拉贾斯坦沙白蚁（印度西北部、巴基斯坦、伊朗）

Psammotermes senegalensis 塞内加尔沙白蚁（尼日利亚、塞内加尔）

Psammotermes voeltzkowi 弗尔特科沙白蚁（马达加斯加）

鼻白蚁科 RHINOTERMITIDAE

鼻白蚁亚科（Rhinotermitinae）由 Froggatt 于 1897 年建立；此处采用 2024 年系统发育研究重新界定后的狭义鼻白蚁科（Rhinotermitidae sensu novo）[21]，含 5 属。模式属为 *Rhinotermes* Hagen, 1858；科名由希腊语 rhis/rhinos（鼻）与 termes 组合，指其成虫唇基隆起、形似鼻状并由囟门至唇基具窄沟的特征。本名录收录 5 属 61 种。

尖鼻白蚁属、狭鼻白蚁属与鼻白蚁属主产新热带（南美北部至加勒比），棒鼻白蚁属主产东南亚，西至印度东北部，北达中国西藏与云南，东至巴布亚新几内亚、所罗门群岛与澳大利亚昆士兰；长鼻白蚁属广布旧热带界、东洋界、澳大利亚及西太平洋岛屿。本科具真工蚁品级，往往巢居土中或与土壤接触的木材内，工蚁经隧道外出取食木材；兵蚁多呈大小二态（少数三态），上唇须状延长、顶端刷状、中央有沟，额腺分泌物沿沟流出御敌，是本科区别于近缘科的重要鉴别特征。本科工蚁与有翅成虫左上颚端齿之后具 3 枚明显而大小不等的缘齿，有翅成虫、工蚁与兵蚁的后唇基前缘均明显拱凸，兵蚁囟门周缘不生长毛。经济上，长鼻白蚁属在分布区内常见为害建筑木材，如澳大利亚东部的中间长鼻白蚁 *Schedorhinotermes intermedius*[25]；长喙长鼻白蚁 *Schedorhinotermes longirostris*（原生印度、印度尼西亚、马来西亚、帕劳、巴布亚新几内亚，引入美国关岛），该种 2011 年传入关岛、为害当地特有苏铁。



长鼻白蚁 *Schedorhinotermes sp.*(https://www.inaturalist.org/observations/339086630)

尖鼻白蚁属 *Acorhinotermes*

Acorhinotermes claritae 克拉丽塔尖鼻白蚁（哥伦比亚、巴西、委内瑞拉）

**Acorhinotermes subfusciceps* 棕头尖鼻白蚁（南美洲、法属圭亚那、圭亚那、哥伦比亚、巴西、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉）

狭鼻白蚁属 *Dolichorhinotermes*

Dolichorhinotermes japuraensis 雅普拉狭鼻白蚁（巴西、圭亚那）

Dolichorhinotermes lanciarius 矛唇狭鼻白蚁（玻利维亚、厄瓜多尔、秘鲁）

Dolichorhinotermes latilabrum 宽唇狭鼻白蚁（南美洲、巴西、法属圭亚那、玻利维亚）

Dolichorhinotermes longidens 长齿狭鼻白蚁（巴拿马、哥伦比亚）

**Dolichorhinotermes longilabius* 长唇狭鼻白蚁（南美洲、巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、厄瓜多尔、圭亚那、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）

Dolichorhinotermes neli 内尔狭鼻白蚁（法属圭亚那）

Dolichorhinotermes tenebrosus 暗色狭鼻白蚁（南美洲、圭亚那、玻利维亚、厄瓜多尔、委内瑞拉）

棒鼻白蚁属 *Parrhinotermes*

**Parrhinotermes aequalis* 相等棒鼻白蚁（马来西亚、沙捞越、印度尼西亚）

Parrhinotermes barbatus 毛颏棒鼻白蚁（印度尼西亚、巴布亚新几内亚）

Parrhinotermes browni 布朗棒鼻白蚁（印度尼西亚、巴布亚新几内亚、所罗门群岛）

Parrhinotermes buttelreepeni 巴特里彭棒鼻白蚁（东南亚、印尼苏门答腊、马来西亚）

Parrhinotermes inaequalis 不等棒鼻白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Parrhinotermes khasii 卡西棒鼻白蚁（西藏（墨脱：背崩 800m、亚让 1000m）；印度（阿萨姆：卡西山 366m））

Parrhinotermes microdentiformis 小齿棒鼻白蚁（泰国、马来西亚）
Parrhinotermes microdentiformisoides 似小齿棒鼻白蚁（泰国、马来西亚）
Parrhinotermes minor 小棒鼻白蚁（泰国、印度尼西亚、马来西亚）
Parrhinotermes pygmaeus 侏儒棒鼻白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Parrhinotermes queenslandicus 昆士兰棒鼻白蚁（澳大利亚）
Parrhinotermes ruiliensis 瑞丽棒鼻白蚁（中国、云南）
Parrhinotermes shamimi 沙明棒鼻白蚁（印度）

鼻白蚁属 *Rhinotermes*

Rhinotermes hispidus 多毛鼻白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、玻利维亚、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉）
Rhinotermes manni 曼鼻白蚁（玻利维亚）
Rhinotermes marginalis 微小鼻白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、加勒比、玻利维亚、厄瓜多尔、秘鲁、苏里南、委内瑞拉）
**Rhinotermes nasutus* 大鼻鼻白蚁（法属圭亚那、巴西、圭亚那、巴巴多斯、玻利维亚、多米尼加、海地、马提尼克、秘鲁、苏里南）

长鼻白蚁属 *Schedorhinotermes*

Schedorhinotermes actuosus 活跃长鼻白蚁（澳大利亚）
Schedorhinotermes bidentatus 双齿长鼻白蚁（菲律宾）
Schedorhinotermes brachyceps 短头长鼻白蚁（印尼）
Schedorhinotermes breinli 布赖内尔长鼻白蚁（澳大利亚）
Schedorhinotermes brevialatus 短翅长鼻白蚁（马来西亚沙捞越、印度尼西亚）
Schedorhinotermes butteli 巴特尔长鼻白蚁（马来西亚）
Schedorhinotermes derosus 流浪长鼻白蚁（澳大利亚）
Schedorhinotermes eleanorae 埃莉诺长鼻白蚁（印度）
Schedorhinotermes fortignathus 强颚长鼻白蚁（云南（思茅）。）
Schedorhinotermes ganlanbaensis 橄榄坝长鼻白蚁（中国云南）
Schedorhinotermes holmgreni 霍姆格伦长鼻白蚁（印度尼西亚）
Schedorhinotermes insolitus 异盟长鼻白蚁（中国云南）
**Schedorhinotermes intermedius* 中间长鼻白蚁（澳大利亚东部）
Schedorhinotermes lamanianus 拉曼长鼻白蚁（西非、科特迪瓦、加纳、几内亚、尼日利亚、塞拉利昂、非洲南部、南非、莫桑比克、安哥拉、刚果（布）、刚果民主共和国、肯尼亚、马拉维、纳米比亚、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达、津巴布韦）
Schedorhinotermes leopoldi 利奥波德长鼻白蚁（印尼）
Schedorhinotermes longirostris 长喙长鼻白蚁（印度、印度尼西亚、马来西亚、帕劳、巴布亚新几内亚；引入：关岛（美国））
Schedorhinotermes magnus 大长鼻白蚁（中国云南）
Schedorhinotermes makassarensis 望加锡长鼻白蚁（印尼、印度、尼科巴群岛）
Schedorhinotermes makilingensis 马吉岭长鼻白蚁（菲律宾）
Schedorhinotermes malaccensis 马六甲长鼻白蚁（东南亚、泰国、马来西亚、柬埔寨、印度尼西亚、缅甸、新加坡、越南、印度）

Schedorhinotermes maximus 最大长鼻白蚁（分布待核）
Schedorhinotermes medioobscurus 中暗长鼻白蚁（东南亚、印度尼西亚、泰国、马来西亚、柬埔寨、新加坡、越南、菲律宾、中国、印度）
Schedorhinotermes nancowriensis 楠考里长鼻白蚁（印度、尼科巴群岛）
Schedorhinotermes putorius 臭鼬长鼻白蚁（西非、喀麦隆、加蓬、赤道几内亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦、尼日利亚、圣多美和普林西比、塞拉利昂、安哥拉、中非共和国、刚果民主共和国、乌干达）
Schedorhinotermes pyricephalus 梨头长鼻白蚁（中国云南）
Schedorhinotermes rectangularis 直角长鼻白蚁（泰国）
Schedorhinotermes reticulatus 网状长鼻白蚁（澳大利亚）
Schedorhinotermes robustior 强壮长鼻白蚁（巴布亚新几内亚）
Schedorhinotermes sanctaecrucis 圣克鲁斯长鼻白蚁（所罗门群岛）
Schedorhinotermes seclusus 隐遁长鼻白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Schedorhinotermes solomonensis 所罗门长鼻白蚁（所罗门群岛）
Schedorhinotermes tenuis 细瘦长鼻白蚁（印度尼西亚）
Schedorhinotermes tiwarii 蒂瓦里长鼻白蚁（印度）
Schedorhinotermes translucens 透明长鼻白蚁（所罗门群岛、孟加拉国、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚）
Schedorhinotermes umbraticus 隐蔽长鼻白蚁（巴布亚新几内亚）

齿白蚁科 SERRITERMITIDAE

齿白蚁科由 Holmgren 于 1910 年建立（*Serritermitidae* Holmgren, 1910）[14]，模式属为 *Serritermes* Wasmann, 1897。科名词自模式属名，由拉丁语 serra（锯）与 termes 拼合，指本科兵蚁与繁殖蚁上颚具明显的锯状多齿缘。本名录收录 2 属 3 种。

本科为新热带界特有小科，产南美北部（圭亚那地盾）至巴西。本科无真工蚁品级。两属生活方式迥异：*Glossotermes* 为木栖白蚁，栖于干腐倒木内；*S. serrifer* 则是白蚁中罕见的专性寄居者，终生寄居于白蚁科 *Cornitermes cumulans* 的地表垅巢内，不自筑巢，兵蚁上颚镰刀状、内缘具锯齿。本科兵蚁头长、侧缘呈弧形，头前具一小而呈盲端的囟门，不与额腺相通，触角 12–15 节（*Serritermes* 属 12–13 节，*Glossotermes* 属 13–15 节）；本科兵蚁额腺极为发达，自头部延伸至胸腹前半部，御敌时以自体爆裂方式经颈背释放分泌物 [26]。



Serritermes serrifer 锯齿白蚁（https://termiti.czu.cz/en/r-12998-galleries/r-13066-serritermitidae）

舌白蚁属 *Glossotermes*

**Glossotermes oculatus* 眼显舌白蚁（法属圭亚那、圭亚那）

Glossotermes sulcatus 具纹舌白蚁（巴西）

齿白蚁属 *Serritermes*

**Serritermes serrifer* 锯齿白蚁（巴西）

杆白蚁科 STYLOTERMITIDAE

杆白蚁科为现生单型科，唯含杆白蚁属 *Stylotermes* Holmgren & Holmgren, 1917。该类群由 Holmgren 与 Holmgren 于 1917 年建立，模式属即 *Stylotermes*。科名源自模式属，希腊语 stylos（柱）加 termes。[3] 本名录收录 1 属 45 种。

本科为东洋界（亚洲南部与东南部）特有，约 35 种为中国南方山地所特有，西至印度、孟加拉国，东达中国台湾，南及文莱、马来西亚，中国为本科现代分化中心，印度东北部山地亦有采集记录。与多数栖于枯倒木的木栖白蚁不同，*Stylotermes* 栖于活树或刚死树木的木材内部，为隐蔽的木栖白蚁；无真工蚁品级，由拟工蚁承担劳作，兵蚁头壳狭长、上颚呈弯刀状。本科有翅蚁头近圆形，囟门极小、有时外观不可见，单眼细小，触角 16–22 节，前胸背板扁平；本科各品级跗节均为 3 节、胫距式 3:2:2，为现生白蚁中少见的原始特征。本科兵蚁与工蚁具小而活跃的额腺，分泌单萜类化合物御敌（以 *S. faveolus*、*S. halumicus* 为材料研究），踪迹跟踪信息素亦在该二种中有专文报道 [27]。系统发育上，本科为所有其余新等翅类（Neoisoptera）的姐妹群，是新等翅类最早分化的现生支系，对理解额腺与品级演化有重要意义。经济上，本科栖于活树并于活立木内营巢，是白蚁中少见的活树栖居类群，可致活树衰弱乃至死亡 [28]。



杆白蚁 *Stylotermes sp.*

杆白蚁属 *Stylotermes*

Stylotermes acrofrons 丘额杆白蚁（中国）
Stylotermes ahmadi 阿哈默德杆白蚁（中国、孟加拉国）
Stylotermes alpinus 高山杆白蚁（中国）
Stylotermes angustignathus 细颚杆白蚁（中国）
Stylotermes beesoni 比森杆白蚁（印度）
Stylotermes bengalensis 西孟加拉杆白蚁（印度）
Stylotermes chakratensis 杰格拉达杆白蚁（中国、印度）
Stylotermes changtingensis 长汀杆白蚁（中国）
Stylotermes chengduensis 成都杆白蚁（中国）
Stylotermes chongqingensis 重庆杆白蚁（中国）
Stylotermes choui 周氏杆白蚁（中国）
Stylotermes crinis 多毛杆白蚁（中国）
Stylotermes curvatus 弯颚杆白蚁（中国）
Stylotermes dunensis 德拉敦杆白蚁（中国、印度）
Stylotermes faveolus 凹胸杆白蚁（印度）
**Stylotermes fletcheri* 弗莱彻杆白蚁（印度）
Stylotermes fontanellus 长囟杆白蚁（中国）
Stylotermes guiyangensis 贵阳杆白蚁（中国）
Stylotermes halumicus 穿山甲杆白蚁（中国台湾）
Stylotermes hanyuanicus 汉源杆白蚁（中国）
Stylotermes inclinatus 倾头杆白蚁（中国）
Stylotermes jinyunicus 缙云杆白蚁（中国）
Stylotermes labralis 圆唇杆白蚁（中国）
Stylotermes laticrus 阔腿杆白蚁（中国）
Stylotermes latilabrum 宽唇杆白蚁（中国）

Stylotermes latipedunculus 阔颏杆白蚁（中国）
Stylotermes lianpingensis 连平杆白蚁（中国）
Stylotermes longignathus 长颚杆白蚁（中国）
Stylotermes mecocephalus 长头杆白蚁（中国）
Stylotermes minutus 侏儒杆白蚁（中国）
Stylotermes mirabilis 颏奇杆白蚁（中国）
Stylotermes orthognathus 直颚杆白蚁（中国）
Stylotermes parabengalensis 似西孟加拉杆白蚁（中国、印度）
Stylotermes planifrons 平额杆白蚁（中国）
Stylotermes robustus 宏壮杆白蚁（中国）
Stylotermes roonwali 鲁恩沃杆白蚁（印度、文莱、马来西亚）
Stylotermes setosus 刚毛杆白蚁（中国）
Stylotermes sinensis 中华杆白蚁（中国）
Stylotermes sui 苏氏杆白蚁（中国）
Stylotermes triplanus 三平杆白蚁（中国）
Stylotermes tsaii 蔡氏杆白蚁（中国）
Stylotermes undulatus 波颚杆白蚁（中国）
Stylotermes valvules 短盖杆白蚁（中国）
Stylotermes wuyinicus 武夷杆白蚁（中国）
Stylotermes xichangensis 西昌杆白蚁（中国）

寡脉白蚁科 TERMITOGETONIDAE

寡脉白蚁亚科（Termitogetoninae）由 Holmgren 于 1910 年建立（1910a:286）[14]，2024 年基因组系统发育研究将其由亚科提升为科（Termitogetonidae）[21]。寡脉白蚁科单型，仅含寡脉白蚁属 Termitogeton Desneux, 1904；科名词根为 Termitogeton，由 termes 与希腊语 geiton（邻居）构成，意为"近于白蚁属者"。本名录收录 1 属 2 种。

分布上，本科为东洋界小科，分布于东南亚（印度尼西亚、马来西亚）与斯里兰卡，栖于热带雨林内枯死或腐朽木材中。该科无真工蚁，承担劳作的为拟工蚁。兵蚁具额腺，能分泌含单萜等成分的防御与报警物质[29]；各品级性比接近 1:1，唯兵蚁中雌性偏多[30]。发育路线为 2 个幼龄期、4 个拟工蚁龄期[30]、1 个若虫龄期而至成虫；翅芽于 2 龄出现、在后续蜕皮中退化、至若虫期重新出现，成熟群落仅约千头个体。全品级体躯背腹扁平，是对树皮下栖境的适应；有翅蚁头近三角形、复眼小而单眼存在，触角 15 节，全身密被毛，前胸背板窄于头、前缘中央呈叶状突出，翅面密被细毛，前翅鳞不覆盖后翅鳞；拟工蚁左上颚具端齿与 3 枚缘齿，第二缘齿长于端齿及第一缘齿，各足胫节端距式 2:2:2；兵蚁头呈三角形、后缘强波曲并中央突出，上颚细长、无缘齿（仅基部具细齿列），触角 13–15 节，后足基节膨大。



Termitogeton umbilicatus 中凹寡脉白蚁（https://www.inaturalist.org/observations/254743733）

寡脉白蚁属 *Termitogeton*

* *Termitogeton planus* 平坦寡脉白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Termitogeton umbilicatus 中凹寡脉白蚁（斯里兰卡）

土栖等翅类 Geoisoptera

异白蚁科 HETEROTERMITIDAE

异白蚁亚科（Heterotermitinae）由 Froggatt 于 1897 年建立，长期隶属鼻白蚁科；2024 年系统发育研究将其提升为科（Heterotermitidae）[21]，并纳入乳白蚁属 *Coptotermes* 与散白蚁属 *Reticulitermes*，现含 3 属。模式属为 *Heterotermes* Froggatt, 1897，科名由希腊语 heteros（不同的）与 termes 组合。本名录收录 3 属 230 种。

本科为泛热带至北温带广布的类群，三属分布格局差异明显：乳白蚁属泛热带分布，以东洋界与澳大利亚为多样性中心，并见于非洲热带、新热带及印度—太平洋诸岛；异白蚁属主产新热带界，并见于澳大利亚、南亚、中东至东北非及西印度洋岛屿；散白蚁属专营北半球温带，以中国为多样性中心，其中国特有种逾百，并广布日本、朝鲜半岛、台湾、印度、地中海欧洲与北美。本科及其他 Geoisoptera 染色体数稳定为 2n=42，具真正的工蚁品级、群体庞大，大多种成熟群体生态上已高度依赖土壤，巢居土中或木屑、唾液与粪便筑成的盒状巢内，工蚁构筑隧道与泥被外出取食木材，巢与食源分离，但往往仍然可以在木材中筑巢生存。*Coptotermes* 兵蚁头呈卵形、囟门大而朝前[31]，受扰时泌出乳状液；*Heterotermes* 与 *Reticulitermes* 兵蚁头近长方形、囟门小而不显著。本科三属兵蚁共同鉴别特征为上颚呈长刀状、内缘无明显缘齿（仅基部具细锯齿），囟门周缘环生刚毛，前足胫节端距多于 3 枚；工蚁与有翅成虫后唇基前缘平或微凹，有翅成虫具囟门与单眼，前胸背板扁平、窄于头，跗节 4 节，爪间无中垫，工蚁后肠无混合节。

本科是世界上经济意义最大的白蚁类群：台湾乳白蚁 *Coptotermes formosanus* 与格斯特乳白蚁 *C. gestroi* 并称世界上为害最烈的两种建筑白蚁，合计占全球白蚁年经济损失的一半以上，前者被 ISSG 列入“世界 100 种最具危害性入侵种”[32]，后者在新加坡、马来西亚造成当地人造建筑虫损的 80%–90%；曲颚乳白蚁 *C. curvignathus* 是东南亚橡胶、椰子与油棕林的危险性害虫，亦为中国进境检疫对象[33]。短刀乳白蚁 *C. acinaciformis* 与弗伦奇乳白蚁 *C. frenchi* 自澳大利亚引入新西兰；曲颚

乳白蚁自东南亚引入中国、菲律宾、南非；格斯特乳白蚁自东南亚原产扩散至热带数十个国家和地区；舍斯泰特乳白蚁 *C. sjostedti* 自西非引入瓜德罗普（法国）；伤残乳白蚁 *C. truncatus* 自马达加斯加引入塞舌尔；北美散白蚁 *R. flavipes* 自北美东部随贸易引入欧洲（法国、德国、奥地利）、智利、乌拉圭、巴哈马与危地马拉。新热带界的异白蚁属 *Heterotermes tenuis* 在巴西为害甘蔗与桉树苗木[34]。



Coptotermes formosanus 台湾乳白蚁

乳白蚁属 *Coptotermes*

Coptotermes acinaciformis 短刀乳白蚁（澳大利亚、引入：新西兰）

acinaciformis 指名亚种

raffrayi 拉夫雷亚种

Coptotermes amanii 阿马尼乳白蚁（坦桑尼亚、莫桑比克、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、肯尼亚、马拉维、索马里、南非、赞比亚、津巴布韦）

Coptotermes amboinensis 安汶乳白蚁（印尼马鲁古群岛）

Coptotermes bannaensis 版纳乳白蚁（中国云南）

Coptotermes beckeri 贝克乳白蚁（印度南部）

Coptotermes bentongensis 文冬乳白蚁（马来西亚）

Coptotermes boetonensis 博顿乳白蚁（印尼爪哇）

Coptotermes brunneus 深棕乳白蚁（澳大利亚西部）

Coptotermes ceylonicus 锡兰乳白蚁（印度南部、斯里兰卡、中国）

Coptotermes chaoxianensis 巢县乳白蚁（中国安徽）

Coptotermes cooloola 库鲁拉乳白蚁（澳大利亚昆士兰东南部）

Coptotermes curvignathus 曲颚乳白蚁（东南亚、马来西亚、泰国、印度尼西亚、缅甸、新加坡、越南；引入：中国、菲律宾、南非）

Coptotermes cyclocoryphus 圆头乳白蚁（中国广东）

Coptotermes dimorphus 二型乳白蚁（中国云南）

Coptotermes dobonicus 多波乳白蚁（巴布亚新几内亚）
Coptotermes dreghorni 雷德霍恩乳白蚁（澳大利亚昆士兰）
Coptotermes elisae 瑞明乳白蚁（印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚）
Coptotermes emersoni 埃默森乳白蚁（印度、中国、斯里兰卡）
Coptotermes formosanus 台湾乳白蚁（中国南部及台湾、原产、随木材广布热带亚热带）
Coptotermes frenchi 弗伦奇乳白蚁（澳大利亚；引入：新西兰）
Coptotermes fumipennis 烟翅乳白蚁（澳大利亚）
Coptotermes gambrinus 甘布里努斯乳白蚁（巴布亚新几内亚）
Coptotermes gaurii 高瑞乳白蚁（斯里兰卡、尼科巴群岛（印度））
**Coptotermes gestroi* 格斯特乳白蚁（东南亚（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾原产）、孟加拉国、不丹、柬埔寨、东帝汶、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、新加坡、斯里兰卡、泰国、越南；热带区广布，引入安提瓜和巴布达、澳大利亚、巴哈马、巴巴多斯、巴西、开曼群岛、中国、科摩罗、古巴、埃及、格林纳达、关岛（美国）、海地、夏威夷（美国）、印度、牙买加、马达加斯加、毛里求斯、墨西哥、密克罗尼西亚、蒙特塞拉特、新喀里多尼亚（法国）、北马里亚纳群岛、巴拉圭、法属波利尼西亚、波多黎各、留尼汪（法国）、圣基茨和尼维斯及安圭拉、圣卢西亚、台湾、特克斯和凯科斯群岛、阿拉伯联合酋长国、美国、英属维尔京群岛）
Coptotermes grandiceps 庞头乳白蚁（所罗门群岛、巴布亚新几内亚、印度尼西亚）
Coptotermes grandis 大头乳白蚁（中国福建）
Coptotermes guangdongensis 广东乳白蚁（中国广东）
Coptotermes guizhouensis 贵州乳白蚁（中国贵州）
Coptotermes gulangyuensis 鼓浪屿乳白蚁（中国福建）
Coptotermes hainanensis 海南乳白蚁（中国海南）
Coptotermes intermedius 中间乳白蚁（西非、科特迪瓦、塞内加尔、塞拉利昂、布基纳法索、加纳、几内亚比绍、尼日利亚、阿曼）
Coptotermes kalshoveni 卡尔斯霍芬乳白蚁（印度尼西亚、马来西亚、泰国）
Coptotermes kishori 基绍乳白蚁（印度）
Coptotermes lacteus 乳色乳白蚁（澳大利亚东部）
Coptotermes longignathus 长颚乳白蚁（中国云南）
Coptotermes longistriatus 长带乳白蚁（中国广东）
Coptotermes mauricianus 毛里求斯乳白蚁（毛里求斯）
Coptotermes melanoistriatus 黑带乳白蚁（中国香港）
Coptotermes menadoae 万鸦东乳白蚁（印尼苏拉威西）
Coptotermes michaelseni 米夏埃尔森乳白蚁（澳大利亚西部）
Coptotermes minutissimus 最小乳白蚁（印尼苏拉威西）
Coptotermes monosetosus 单毛乳白蚁（中国云南）
Coptotermes nanus 侏儒乳白蚁（澳大利亚西部）
Coptotermes ochraceus 黄赭乳白蚁（中国贵州）
Coptotermes oshimai 大岛乳白蚁（印尼苏拉威西）
Coptotermes pamuae 帕穆亚乳白蚁（所罗门群岛、巴布亚新几内亚）
Coptotermes paradoxus 奇异乳白蚁（旧热带界）

Coptotermes peregrinator 陌生乳白蚁（印尼苏拉威西）
Coptotermes premrasmii 普雷姆阿斯米乳白蚁（泰国、尼科巴群岛（印度））
Coptotermes remotus 远方乳白蚁（巴布亚新几内亚、帕劳）
Coptotermes sepangensis 赛庞乳白蚁（马来西亚、印度尼西亚）
Coptotermes shanghaiensis 上海乳白蚁（中国上海）
Coptotermes silvaticus 森林乳白蚁（旧热带界）
Coptotermes sinabangensis 锡纳邦乳白蚁（印尼苏门答腊、马来西亚）
Coptotermes sjostedti 舍斯泰特乳白蚁（西非、科特迪瓦、尼日利亚、塞内加尔、安哥拉、布基纳法索、喀麦隆、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、冈比亚、加纳、几内亚、莫桑比克、圣多美和普林西比、塞拉利昂、索马里、苏丹、坦桑尼亚、多哥、乌干达；引入：瓜德罗普（法国））
Coptotermes testaceus 厚壳乳白蚁（新热带界、中美洲至南美北部）
Coptotermes travians 南亚乳白蚁（印度尼西亚苏门答腊、马来西亚、新加坡）
Coptotermes truncatus 伤残乳白蚁（马达加斯加、塞舌尔（引入））
Coptotermes varicapitatus 异头乳白蚁（中国广东）

异白蚁属 *Heterotermes*

Heterotermes aethiopicus 埃塞俄比亚异白蚁（埃塞俄比亚、阿曼、沙特阿拉伯、苏丹、阿联酋、也门）
Heterotermes assu 大异白蚁（巴西）
Heterotermes aureus 金黄异白蚁（北美西南部、美国西南部、墨西哥）
Heterotermes balwanti 巴尔万特异白蚁（印度）
Heterotermes brevicatena 短链异白蚁（澳大利亚）
Heterotermes cardini 卡丁异白蚁（加勒比、波多黎各、瓜德罗普、巴哈马、巴拿马、美国）
Heterotermes ceylonicus 锡兰异白蚁（斯里兰卡）
Heterotermes convexinotatus 凸背异白蚁（加勒比、波多黎各、安提瓜和巴布达、巴巴多斯、墨西哥、南美洲、巴西、哥伦比亚、伯利兹、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马）
Heterotermes crinitus 密毛异白蚁（南美洲、哥伦比亚、法属圭亚那、巴西）
Heterotermes ferox 好斗异白蚁（澳大利亚）
Heterotermes gertrudae 格特鲁德异白蚁（南亚、印度、巴基斯坦）
Heterotermes indicola 印度异白蚁（南亚、巴基斯坦、印度、阿富汗、伊朗）
Heterotermes intermedius 中间异白蚁（澳大利亚）
Heterotermes lauralinearum 劳拉利纳异白蚁（阿根廷、玻利维亚、巴拉圭）
Heterotermes longicatena 长链异白蚁（澳大利亚）
Heterotermes longiceps 长头异白蚁（南美洲、巴西、玻利维亚）
Heterotermes maculatus 斑点异白蚁（墨西哥）
Heterotermes malabaricus 马拉巴尔异白蚁（印度）
Heterotermes occiduus 西部异白蚁（澳大利亚）
Heterotermes omanae 阿曼异白蚁（阿曼）
Heterotermes pamatatensis 帕玛塔塔异白蚁（印尼、印度尼西亚）
Heterotermes paradoxus 奇异异白蚁（澳大利亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚）
Heterotermes perfidus 危险异白蚁（圣赫勒拿）

Heterotermes philippinensis 菲律宾异白蚁（菲律宾、马达加斯加、毛里求斯）
**Heterotermes platycephalus* 宽头异白蚁（澳大利亚）
Heterotermes sulcatus 具沟异白蚁（南美洲、巴西、委内瑞拉、苏里南）
Heterotermes tenuior 细长异白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Heterotermes tenuis 细瘦异白蚁（新热带界、南美至中美洲、墨西哥、蒙特塞拉特、美国、巴哈马、巴巴多斯、古巴、多米尼克、多米尼加共和国、格林纳达、法属瓜德罗普、海地、牙买加、法属马提尼克、波多黎各、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、美属维尔京群岛）
Heterotermes vagus 游荡异白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Heterotermes validus 健壮异白蚁（澳大利亚）
Heterotermes wittmeri 威特默异白蚁（沙特阿拉伯）

散白蚁属 *Reticulitermes*

Reticulitermes aculabialis 尖唇散白蚁（中国）
Reticulitermes aegeus 爱琴散白蚁（东地中海、克罗地亚、希腊、土耳其、塞浦路斯）
Reticulitermes affinis 肖若散白蚁（中国）
Reticulitermes altus 高山散白蚁（中国）
Reticulitermes amamianus 奄美散白蚁（日本）
Reticulitermes ampliceps 扩头散白蚁（中国）
Reticulitermes ancyleus 钩颚散白蚁（中国）
Reticulitermes angustatus 狭胸散白蚁（中国）
Reticulitermes angusticephalus 窄头散白蚁（中国）
Reticulitermes arenincola 沙栖散白蚁（美国）
Reticulitermes assamensis 突额散白蚁（印度、不丹、中国）
Reticulitermes aurantius 橙黄散白蚁（中国）
Reticulitermes balkanensis 巴尔干散白蚁（巴尔干半岛、希腊等、阿尔巴尼亚、前南斯拉夫）
Reticulitermes banyulensis 巴尼于勒散白蚁（西南欧、西班牙、法国）
Reticulitermes bicristatus 双瘤散白蚁（中国）
Reticulitermes bitumulus 双峰散白蚁（中国）
Reticulitermes brachygnathus 短颚散白蚁（中国）
Reticulitermes brevicurvatus 短弯颚散白蚁（中国）
Reticulitermes cancrifemuris 蟹腿散白蚁（中国）
Reticulitermes castanus 褐胸散白蚁（中国）
Reticulitermes chayuensis 察隅散白蚁（中国西藏）
Reticulitermes chinensis 黑胸散白蚁（中国、印度、越南）
Reticulitermes choui 周氏散白蚁（中国）
Reticulitermes chryseus 金黄散白蚁（中国）
Reticulitermes citrinus 柠黄散白蚁（中国）
Reticulitermes clypeatus 大唇散白蚁（中东、以色列、土耳其、罗马尼亚）
Reticulitermes coelceps 凹头散白蚁（中国）
Reticulitermes conus 锥颚散白蚁（中国）

Reticulitermes croceus 深黄散白蚁（中国）
Reticulitermes curticeps 短头散白蚁（中国）
Reticulitermes curvatus 弯颚散白蚁（中国）
Reticulitermes cymbidii 幽兰散白蚁（中国）
Reticulitermes dabieshanensis 大别山散白蚁（中国）
Reticulitermes dantuensis 丹徒散白蚁（中国）
Reticulitermes dayongensis 大庸散白蚁（中国）
Reticulitermes dinghuensis 鼎湖散白蚁（中国）
Reticulitermes emei 峨嵋散白蚁（中国）
Reticulitermes fengduensis 丰都散白蚁（中国）
Reticulitermes flaviceps 黄胸散白蚁（中国南部、台湾、香港、日本、越南）
**Reticulitermes flavipes* 北美散白蚁（北美东部、美国东部、加拿大东南部、随贸易引入欧洲、危地马拉、奥地利、巴哈马、智利、法国、德国、乌拉圭）
Reticulitermes fukienensis 花胸散白蚁（中国）
Reticulitermes fulvimarginalis 褐缘散白蚁（中国）
Reticulitermes ganga 恒湖散白蚁（印度）
Reticulitermes gaoshi 大囟散白蚁（中国）
Reticulitermes gaoyaoensis 高要散白蚁（中国）
Reticulitermes grandis 大头散白蚁（中国）
Reticulitermes grassei 格拉塞散白蚁（西南欧、西班牙、葡萄牙、法国、英国）
Reticulitermes guangzhouensis 广州散白蚁（中国）
Reticulitermes guilinensis 桂林散白蚁（中国）
Reticulitermes guiyangensis 贵阳散白蚁（中国）
Reticulitermes guizhouensis 贵州散白蚁（中国）
Reticulitermes gulinensis 古蔺散白蚁（中国）
Reticulitermes hageni 哈根散白蚁（美国东南部）
Reticulitermes hainanensis 海南散白蚁（中国）
Reticulitermes hesperus 西部散白蚁（北美西部、美国西部、加拿大西南部）
Reticulitermes huangi 黄氏散白蚁（中国）
Reticulitermes huapingensis 花坪散白蚁（中国）
Reticulitermes hubeiensis 湖北散白蚁（中国）
Reticulitermes hunanensis 湖南散白蚁（中国）
Reticulitermes hypsofrons 高额散白蚁（中国）
Reticulitermes jiangchengensis 江城散白蚁（中国）
Reticulitermes kanmonensis 关门散白蚁（日本、朝鲜半岛、中国、台湾、韩国）
Reticulitermes labralis 圆唇散白蚁（中国）
Reticulitermes largus 大型散白蚁（中国）
Reticulitermes latilabris 宽唇散白蚁（中国）
Reticulitermes leiboensis 雷波散白蚁（中国）
Reticulitermes leigongshanensis 雷公山散白蚁（中国）

Reticulitermes leptogulus 细颏散白蚁（中国）
Reticulitermes leptomandibularis 细颚散白蚁（东亚、台湾、中国）
Reticulitermes levatoriceps 隆头散白蚁（中国）
Reticulitermes lianchengensis 连城散白蚁（中国）
Reticulitermes lii 李氏散白蚁（中国）
Reticulitermes lingulatus 舌唇散白蚁（中国）
Reticulitermes longicephalus 长头散白蚁（中国）
Reticulitermes longigulus 长颏散白蚁（中国）
Reticulitermes longipennis 长翅散白蚁（中国）
Reticulitermes lucifugus 暗黑散白蚁（地中海欧洲、南欧、西亚、中欧、东欧（阿尔及利亚、阿塞拜疆、波黑、克罗地亚、塞浦路斯、埃及、法国、德国、希腊、伊朗、伊拉克、意大利、马德拉群岛（葡萄牙）、摩洛哥、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、西班牙、瑞士、土耳其、乌克兰、南斯拉夫（旧）））
corsicus 科西嘉亚种
lucifugus 指名亚种
siculus 西西里亚种
Reticulitermes luofunicus 罗浮散白蚁（中国）
Reticulitermes magdalenae 马格达莱纳散白蚁（越南）
Reticulitermes majiangensis 麻江散白蚁（中国）
Reticulitermes malletei 马利特散白蚁（美国）
Reticulitermes mangshanensis 莽山散白蚁（中国）
Reticulitermes maopingensis 毛坪散白蚁（中国）
Reticulitermes microcephalus 小头散白蚁（中国）
Reticulitermes minutus 侏儒散白蚁（中国）
Reticulitermes mirogulus 奇颏散白蚁（中国）
Reticulitermes mirus 陌宽散白蚁（中国）
Reticulitermes miyatakei 宫武散白蚁（日本）
Reticulitermes nanjiangensis 南江散白蚁（中国）
Reticulitermes nelsonae 纳尔逊散白蚁（美国）
Reticulitermes neochinensis 新中华散白蚁（中国）
Reticulitermes okinawanus 冲绳散白蚁（日本）
Reticulitermes oocephalus 蛋头散白蚁（中国）
Reticulitermes oreophilus 喜山散白蚁（中国）
Reticulitermes ovatilabrum 卵唇散白蚁（中国）
Reticulitermes paralucifugus 似暗散白蚁（中国）
Reticulitermes parvus 小散白蚁（中国）
Reticulitermes perangustus 狭颏散白蚁（中国）
Reticulitermes periflaviceps 近黄胸散白蚁（中国）
Reticulitermes perilabralis 近圆唇散白蚁（中国）
Reticulitermes perilucifugus 近暗散白蚁（中国）
Reticulitermes pingjiangensis 平江散白蚁（中国）

Reticulitermes planifrons 平额散白蚁（中国）
Reticulitermes planimentus 平颏散白蚁（中国）
Reticulitermes pseudaculabialis 拟尖唇散白蚁（中国）
Reticulitermes qingdaoensis 青岛散白蚁（中国）
Reticulitermes qingjiangensis 清江散白蚁（中国）
Reticulitermes rectis 直缘散白蚁（中国）
Reticulitermes rusti 鲁斯特散白蚁（美国加利福尼亚南部）
Reticulitermes saraswati 萨拉斯瓦特散白蚁（印度）
Reticulitermes setosus 刚毛散白蚁（中国）
Reticulitermes solidimandibulas 粗颚散白蚁（中国）
Reticulitermes speratus 栖北散白蚁（日本、朝鲜半岛、中国东北部、台湾、俄罗斯、美国）
kyushuensis 九州亚种
leptolabralis 细唇亚种
speratus 指名亚种
Reticulitermes subligulosus 近舌唇散白蚁（中国）
Reticulitermes sublongicapitatus 似长头散白蚁（中国）
Reticulitermes sylvestris 林海散白蚁（中国）
Reticulitermes testudineus 龟唇散白蚁（中国）
Reticulitermes tianpingshanensis 天平山散白蚁（中国）
Reticulitermes tibetanus 西藏散白蚁（中国西藏）
Reticulitermes tibialis 黑胫散白蚁（北美西部、美国西部、墨西哥北部）
Reticulitermes tirapi 特拉普散白蚁（印度）
Reticulitermes translucens 端明散白蚁（中国）
Reticulitermes trichocephalus 毛头散白蚁（中国）
Reticulitermes tricholabralis 毛唇散白蚁（中国）
Reticulitermes trichothorax 毛胸散白蚁（中国）
Reticulitermes tricolorus 三色散白蚁（中国）
Reticulitermes urbis 城市散白蚁（欧洲、克罗地亚、希腊、意大利、法国）
Reticulitermes virginicus 弗吉尼亚散白蚁（美国东部）
Reticulitermes wugangensis 武冈散白蚁（中国）
Reticulitermes wugongensis 武宫散白蚁（中国）
Reticulitermes wuyishanensis 武夷山散白蚁（中国）
Reticulitermes xingshanensis 兴山散白蚁（中国）
Reticulitermes xingyiensis 兴义散白蚁（中国）
Reticulitermes yaeyamanus 八重山散白蚁（日本、中国）
Reticulitermes yinae 尹氏散白蚁（中国）
Reticulitermes yingdeensis 英德散白蚁（中国）
Reticulitermes yizhangensis 宜章散白蚁（中国）
Reticulitermes yongdingensis 永定散白蚁（中国）
Reticulitermes yunsiensis 云寺散白蚁（中国）

Reticulitermes zhaoi 赵氏散白蚁（中国）

白蚁科 TERMITIDAE

白蚁科由 Latreille 于 1802 年建立，模式属为 *Termes* Linnaeus, 1758；科名由模式属词干 *Termit-* 加科级后缀 *-idae* 构成。本名录收录 277 属 2138 种。

本科为泛热带分布，热带、亚热带各大动物地理区均有代表，少数种延伸至暖温带。食性为白蚁各科中最多样的类群，涵盖木食、草食、枯枝落叶食、腐殖土食与培养真菌食等类型，少数种类取食树皮附生的地衣与藻类（如缩白蚁属 *Constrictotermes*），寄居性种类则取食宿主巢的巢材与粪便（如客白蚁属 *Inquilinitermes*）；约六成种专营土壤腐殖质食性。与其他科不同，本科后肠高度分室，消化共生者以细菌和古菌为主。白蚁科兵蚁最显著的共性是拥有不成对的囊状额腺[35]，其外开孔即囟门，防御手段却沿此结构走向殊途。象白蚁亚科（*Nasutitermitinae*）为本科最大亚科，兵蚁头前部延伸成圆锥形象鼻，上颚退化，全凭额腺经象鼻末端囟门喷射粘性分泌物裹缚来敌；同具象鼻的 *Syntermitinae* 则保留发达上颚，机械与化学防御并用。另一极端见于瘤白蚁亚科（*Mirocapritermitinae*）的弹颚类群，如近扭白蚁属 *Pericapritermes*，借两颚骤然错击御敌，额腺反而不发达；*Globitermes sulphureus* 更以额腺爆裂行自杀式防御。本科亦有少数支系丧失兵蚁品级，尖白蚁亚科在新热带界的种类即为一例，御敌全由工蚁承担。有翅蚁前胸背板呈马鞍形，后翅无臀叶、翅脉简化，具囟门与单眼；工蚁后唇基膨大成球状、后肠具混合节，触角多为 13–15 节，兵蚁触角多为 12–16 节。各亚科兵蚁与工蚁的详细鉴别特征详见后续亚科段。筑巢模式多样，土栖巢、地表垅巢、树栖纸巢均见，本科蚁巢是热带森林与稀树草原最显著的生态工程结构。白蚁科是新等翅类中物种多样性最高的类群，约于始新世末开始辐射，其内部在古近纪发生了快速辐射。

本科现分 18 个亚科[21]：弓白蚁亚科 *Amitermitinae*（14 属 194 种）、尖白蚁亚科 *Apicotermitinae*（65 属 237 种）、响白蚁亚科 *Crepititermitinae*（1 属 1 种）、方白蚁亚科 *Cubitermitinae*（28 属 142 种）、圆筒白蚁亚科 *Cylindrotermitinae*（2 属 9 种）、恩格尔白蚁亚科 *Engelitermitinae*（1 属 1 种）、孔白蚁亚科 *Foraminitermitinae*（3 属 10 种）、剪白蚁亚科 *Forficulitermitinae*（1 属 1 种）、大白蚁亚科 *Macrotermitinae*（12 属 373 种）、锯白蚁亚科 *Microcerotermitinae*（2 属 150 种）、瘤白蚁亚科 *Mirocapritermitinae*（14 属 133 种）、象白蚁亚科 *Nasutitermitinae*（81 属 608 种）、新扭白蚁亚科 *Neocapritermitinae*（3 属 20 种）、前奇白蚁亚科 *Promirotermitinae*（2 属 39 种）、始钩白蚁亚科 *Protohamitermitinae*（2 属 2 种）、圆球白蚁亚科 *Sphaerotermitinae*（1 属 1 种）、聚白蚁亚科 *Syntermitinae*（22 属 105 种）、白蚁亚科 *Termitinae*（23 属 106 种）。本科的经济危害详见各亚科。

弓白蚁亚科 Amitermitinae

弓白蚁亚科由 Kemner 于 1934 年建立（原始文献第 110 页），模式属为弓白蚁属 *Amitermes* Silvestri, 1901，亚科名即取自模式属，*Amitermes* 疑取拉丁语 hami-“钩” + termes，指兵蚁弯曲如弓的上颚。本名录收录 14 属 194 种。

本亚科分布以澳大利亚与旧热带界为中心，延及新热带界、中东、南亚与美国南部。食性涵盖腐木、干草及土—木界面多种基质；兵蚁头多呈梨形、无额突，上颚在属间变化极大，咬压、穿刺、劈砍乃至对称弹击型均有，为本科上颚防御类型分化最丰富的类群之一，其中闯白蚁属 *Invasitermes* 无兵蚁品级；工蚁左上颚端齿一般短于缘齿，无钩白蚁属 *Ahamitermes*、闯白蚁属 *Invasitermes*、直颚白蚁属 *Orthognathotermes* 例外；工蚁回肠（P1）管状至膨大成球状、腹面不成环，马氏管每两管合

于一共同基部结节，前钩白蚁属 *Prohamitermes* 例外。兵蚁一般无额突，漠白蚁属 *Eremotermes*、齿尖白蚁属 *Dentispicotermes* 例外，其兵蚁具额突；以模式属弓白蚁属 *Amitermes* 为代表，兵蚁囟门开口于头前部、额腺发达，触角 13–15 节（多为 15 节），上颚内缘通常具一齿。筑巢以地下隧道巢为主，部分种类筑土垅或栖于旧垅。经济上，本亚科部分种类为害草原与作物：北美沙漠白蚁 *Gnathamitermes tubiformans* 在干旱草原大量取食禾草与凋落物[36]，澳大利亚镰白蚁属 *Drepanotermes* 为牧场禾草与凋落物的重要取食者[37]，印度漠白蚁属 *Eremotermes* 危害马铃薯[38]；*Globitermes sulphureus* 在马来西亚危害建筑木材与椰子、油棕种植园[39]。

经济上本亚科在西非有明确农作物为害记录：完胜弓白蚁 *Amitermes evuncifer*（产西非、中非、东非）在贝宁为农户点名的主要作物白蚁之一，在加纳糖料蔗园为复合群落中最常见为害种[40]，在多哥为主要为害白蚁，并见于科特迪瓦可可园与贝宁旱作稻田。



Globitermes sulphureus 黄球白蚁

无钩白蚁属 *Ahamitermes*

Ahamitermes hillii 希尔无钩白蚁（澳大利亚）

Ahamitermes inclusus 栖垄无钩白蚁（澳大利亚）

**Ahamitermes nidicola* 栖巢无钩白蚁（澳大利亚）

弓白蚁属 *Amitermes*

Amitermes abruptus 陡额弓白蚁（澳大利亚）

Amitermes accinctus 锋颚弓白蚁（澳大利亚）

Amitermes acinacifer 短刀弓白蚁（埃塞俄比亚、肯尼亚）

Amitermes aduncus 钩颚弓白蚁（澳大利亚）

Amitermes agrilus 野外弓白蚁（澳大利亚）

Amitermes amicki 阿米克弓白蚁（阿鲁巴、哥伦比亚、委内瑞拉）

**Amitermes amifer* 弓颚弓白蚁（巴西、东南亚大陆、阿根廷、玻利维亚、巴拉圭）

Amitermes aporema 阿波雷马弓白蚁（巴西）

Amitermes arboreus 树栖弓白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Amitermes arcuatus 弧颚弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes baluchistanicus 俾路支弓白蚁（巴基斯坦、伊朗）
Amitermes bandeirai 班代拉弓白蚁（巴西）
Amitermes basidens 基齿弓白蚁（多哥）
Amitermes beaumonti 博蒙特弓白蚁（巴西、圭亚那地盾、亚马孙地区、中美洲及加勒比、墨西哥）
Amitermes belli 贝尔弓白蚁（南亚、伊朗）
Amitermes boreus 北方弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes braunsi 布劳恩斯弓白蚁（南非）
Amitermes calabyi 卡拉比弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes californicus 加州弓白蚁（美国、墨西哥）
Amitermes capito 大头弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes coachellae 科切拉弓白蚁（美国）
Amitermes colonus 小山弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes conformis 相似弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes corpulentus 肥胖弓白蚁（伊拉克、伊朗）
Amitermes cryptodon 隐齿弓白蚁（中美洲及加勒比、墨西哥）
Amitermes darwini 达尔文弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes dentatus 具齿弓白蚁（东南亚岛屿、中国、泰国）
Amitermes dentosus 多齿弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes deplanatus 变平弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes desertorum 遗弃弓白蚁（阿尔及利亚、埃及、利比亚、突尼斯）
Amitermes emersoni 埃默森弓白蚁（墨西哥、美国）
Amitermes ensifer 剑颚弓白蚁（墨西哥）
Amitermes eucalypti 尤卡尔普特弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes evuncifer 完胜弓白蚁（西非、中非、东非）
Amitermes excellens 优秀弓白蚁（巴西、圭亚那地盾、委内瑞拉）
Amitermes exilis 纤细弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes falcatus 镰颚弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes firmus 坚颚弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes foreli 福雷尔弓白蚁（亚马孙地区、中美洲及加勒比、哥伦比亚、委内瑞拉）
Amitermes gallagheri 加拉格尔弓白蚁（阿曼、沙特阿拉伯、也门）
Amitermes germanus 芽弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes gestroanus 客栖弓白蚁（埃塞俄比亚）
Amitermes gracilis 细瘦弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes guineensis 几内亚弓白蚁（西非）
Amitermes hartmeyeri 哈特迈耶弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes hastatus 长矛弓白蚁（南部非洲、坦桑尼亚）
Amitermes herbertensis 赫伯特弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes heteraspis 火罐弓白蚁（厄立特里亚、埃塞俄比亚）

Amitermes heterognathus 异颚弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes importunus 粗鲁弓白蚁（马拉维、赞比亚、津巴布韦）
Amitermes innoxius 无害弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes inops 无助弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes insolitus 异常弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes inspissatus 粗颚弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes iranicus 伊朗弓白蚁（伊朗）
Amitermes kavarattiensis 卡瓦拉蒂弓白蚁（印度）
Amitermes kharrazii 哈尔拉兹弓白蚁（伊朗）
Amitermes lanceolatus 具矛弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes latidens 宽齿弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes lativentris 宽腹弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes laurensis 劳拉弓白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Amitermes leptognathus 细颚弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes lilloi 利略弓白蚁（南美东南部）
Amitermes loennbergianus 伦伯格弓白蚁（厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、坦桑尼亚、乌干达、也门）
Amitermes lunae 卢纳弓白蚁（秘鲁、厄瓜多尔）
Amitermes meridionalis 南方弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes messinae 墨西拿弓白蚁（南非、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、肯尼亚、马拉维、沙特阿拉伯、苏丹、坦桑尼亚、也门、赞比亚）
Amitermes minimus 最小弓白蚁（美国）
Amitermes mitchelli 米切尔弓白蚁（津巴布韦）
Amitermes modicus 中等弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes neogermanus 新芽弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes obeuntis 相会弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes obtusidens 钝齿弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes pallidiceps 灰头弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes pallidus 苍白弓白蚁（美国）
Amitermes pandus 弯曲弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes papuanus 巴布亚弓白蚁（巴布亚新几内亚）
Amitermes paradentatus 似具齿弓白蚁（巴基斯坦）
Amitermes parallelus 平行弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes paravilis 似讨厌弓白蚁（伊朗）
Amitermes parvidens 小齿弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes parvulus 幼小弓白蚁（美国、墨西哥）
Amitermes parvus 微小弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes paucinervius 寡脉弓白蚁（博茨瓦纳）
Amitermes pavidus 胆小弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes perarmatus 全武弓白蚁（澳大利亚）

Amitermes perelegans 真帅弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes perryi 佩里弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes procerus 长颚弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes quadratus 方头弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes ravus 茶色弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes rotundus 圆腹弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes sciangallorum 夏安盖洛姆弓白蚁（埃塞俄比亚、肯尼亚、苏丹、坦桑尼亚）
Amitermes scopulus 峭壁弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes seminotus 知半弓白蚁（博茨瓦纳、南非）
Amitermes silvestrianus 西尔韦斯特里弓白蚁（美国）
Amitermes snyderi 斯奈德弓白蚁（美国）
Amitermes socotrensis 索科特拉弓白蚁（中东/阿拉伯半岛）
Amitermes somaliensis 索马里弓白蚁（索马里、埃塞俄比亚、肯尼亚、马拉维）
Amitermes spinifer 具刺弓白蚁（西非、东非、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达）
Amitermes stephensoni 斯蒂芬森弓白蚁（几内亚、伊朗、肯尼亚、尼日利亚、阿曼、沙特阿拉伯、苏丹、也门）
Amitermes subtilis 微型弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes truncatidens 畸齿弓白蚁（西非、尼日利亚、安哥拉、刚果民主共和国、马拉维、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦）
Amitermes uncinatus 钩刺弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes unidentatus 单齿弓白蚁（安哥拉、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、肯尼亚、马拉维、卢旺达、南非、苏丹、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚）
Amitermes vicinus 近邻弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes vilis 讨厌弓白蚁（中东/阿拉伯半岛、阿富汗、土库曼斯坦）
Amitermes viriosus 强壮弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes vitiosus 凶残弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes westraliensis 西澳弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes wheeleri 惠勒弓白蚁（美国、墨西哥）
Amitermes xylophagus 食木弓白蚁（澳大利亚）
Amitermes yasujensis 亚苏季弓白蚁（伊朗）

齿尖白蚁属 *Dentispicotermes*

Dentispicotermes brevicarinatus 短脊齿尖白蚁（圭亚那地盾、法属圭亚那/圭亚那/苏里南、巴西）
Dentispicotermes conjunctus 邻近齿尖白蚁（巴西）
Dentispicotermes cupiporanga 库皮珀安加齿尖白蚁（巴西、委内瑞拉）
**Dentispicotermes globicephalus* 球头齿尖白蚁（巴西）
Dentispicotermes pantanalis 沼泽齿尖白蚁（巴西、塞拉多）
Dentispicotermes trapezia 梯形齿尖白蚁（玻利维亚、巴拉圭、潘塔纳尔-查科）

镰白蚁属 *Drepanotermes*

Drepanotermes acicularis 细长镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes barretti 巴雷特镰白蚁（澳大利亚）

Drepanotermes basidens 基齿镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes bellator 勇士镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes brevis 短小镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes calabyi 卡拉比镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes clarki 克拉克镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes columellaris 小柱镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes corax 乌黑镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes crassidens 厚齿镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes daliensis 戴利镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes dibolia 狄波拉镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes diversicolor 多色镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes gayi 盖伊镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes hamulus 小钩镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes hilli 希尔镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes invasor 入侵镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes magnificus 巨大镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes paradoxus 奇异镰白蚁（澳大利亚）
**Drepanotermes perniger* 全黑镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes phoenix 凤凰镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes rubriceps 红头镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes septentrionalis 北方镰白蚁（澳大利亚）
Drepanotermes tamminensis 塔明镰白蚁（澳大利亚）

漠白蚁属 *Eremotermes*

Eremotermes arctus 短窄漠白蚁（以色列）
Eremotermes dehraduni 德拉敦漠白蚁（印度）
Eremotermes fletcheri 弗莱彻漠白蚁（印度、巴基斯坦）
**Eremotermes indicatus* 指示漠白蚁（利比亚、突尼斯）
Eremotermes madrasicus 马德拉斯漠白蚁（印度）
Eremotermes nanus 侏儒漠白蚁（尼日利亚、苏丹、也门）
Eremotermes neoparadoxalis 新奇异漠白蚁（印度、巴基斯坦）
Eremotermes paradoxalis 奇异漠白蚁（印度、巴基斯坦）
Eremotermes sanyuktae 女神漠白蚁（印度）
Eremotermes senegalensis 塞内加尔漠白蚁（塞内加尔）

球白蚁属 *Globitermes*

Globitermes brachycerastes 短角球白蚁（云南（景洪 500 m）、中国）
**Globitermes globosus* 球形球白蚁（东南亚岛屿、南洋群岛）
depilis 无毛亚种
globosus 指名亚种
Globitermes menglaensis 勐腊球白蚁（云南（勐腊 660 m）、中国）
Globitermes mengpengensis 勐捧球白蚁（云南（勐腊勐棒 640 m）、中国）

Globitermes minor 小球白蚁（云南（景洪大勐龙）、中国）
Globitermes sulphureus 黄球白蚁（东南亚大陆、中南半岛、东南亚岛屿、南洋群岛、中国）
Globitermes vadaensis 瓦达球白蚁（东南亚岛屿、南洋群岛）

颚钩白蚁属 *Gnathamitermes*

Gnathamitermes grandis 大颚钩白蚁（中美洲墨西哥）
Gnathamitermes nigriceps 黑头颚钩白蚁（中美洲墨西哥）
**Gnathamitermes perplexus* 复杂颚钩白蚁（美国、墨西哥）
Gnathamitermes tubiformans 管形颚钩白蚁（墨西哥、美国）

武白蚁属 *Hoplotermes*

**Hoplotermes amplus* 广泛武白蚁（中美洲及加勒比、墨西哥）

子民白蚁属 *Incolitermes*

**Incolitermes pumilus* 侏儒子民白蚁（澳大利亚）

闯白蚁属 *Invasitermes*

**Invasitermes inermis* 非武闯白蚁（澳大利亚）
Invasitermes insitivus 候补闯白蚁（澳大利亚）

直颚白蚁属 *Orthognathotermes*

Orthognathotermes aduncus 具钩直颚白蚁（巴西、圭亚那地盾、玻利维亚、巴拉圭、秘鲁）
Orthognathotermes brevipilosus 短毛直颚白蚁（玻利维亚）
Orthognathotermes gibberorum 驼背直颚白蚁（巴西、圭亚那地盾）
Orthognathotermes heberi 希伯直颚白蚁（巴西）
Orthognathotermes humilis 小直颚白蚁（巴西、圭亚那地盾）
Orthognathotermes insignis 醒目直颚白蚁（巴西）
Orthognathotermes longilamina 长刀直颚白蚁（巴西）
**Orthognathotermes macrocephalus* 大头直颚白蚁（巴西、玻利维亚）
Orthognathotermes mirim 小兵直颚白蚁（巴西）
Orthognathotermes okeyma 无巢直颚白蚁（巴西、巴拉圭）
Orthognathotermes orthognathus 直颚直颚白蚁（巴西、巴拉圭）
Orthognathotermes pilosus 多毛直颚白蚁（巴西、委内瑞拉）
Orthognathotermes tubesauassu 大眼直颚白蚁（巴西）
Orthognathotermes uncimandibularis 钩颚直颚白蚁（巴西）
Orthognathotermes wheeleri 惠勒直颚白蚁（亚马孙地区、哥伦比亚、巴拿马）

前钩白蚁属 *Prohamitermes*

Prohamitermes hosei 霍斯前钩白蚁（婆罗洲、印度尼西亚、马来西亚）
hosei 指名亚种
minor 小亚种
**Prohamitermes mirabilis* 奇异前钩白蚁（马来西亚、婆罗洲、新加坡、印度尼西亚）

伪钩白蚁属 *Pseudhamitermes*

**Pseudhamitermes khmerensis* 高棉伪钩白蚁（越南）
Pseudhamitermes longignathus 长颚伪钩白蚁（泰国）

同钩白蚁属 *Synhamitermes*

Synhamitermes ceylonicus 锡兰同钩白蚁（斯里兰卡）
Synhamitermes colombensis 科伦坡同钩白蚁（斯里兰卡）
Synhamitermes labioangulatus 角唇同钩白蚁（印度）
**Synhamitermes quadriceps* 方头同钩白蚁（南美东南部、阿根廷/巴拉圭/乌拉圭、南亚、印度）

尖白蚁亚科 Apicotermitinae

尖白蚁亚科由 Grassé 与 Noirot 于 1955 年在研究 *Apicotermes arquieri* 的著作中建立[41]，模式属为尖白蚁属 *Apicotermes* Holmgren, 1911，亚科名取自模式属。本名录收录 65 属 237 种。

本亚科是高等白蚁中无兵蚁品级类群的主要归属：绝大多数种类在演化中独立丢失了兵蚁品级（至少两次独立发生），仅较基部的少数属保留兵蚁。保留兵蚁的少数属均限于旧热带界与东洋界：旧热带界有 *Machadotermes*、*Jugositermes*、*Phoxotermes*、*Rostrotermes*、*Coxotermes*、*Eburnitermes* 等，东洋界有印白蚁属 *Indotermes* 与 *Eurytermes*；已知的新热带界种类则全部无兵蚁。此类保留兵蚁的类群，兵蚁上颚短壮、属穿刺—切割型，其中 *Machadotermes* 兵蚁上颚为全亚科最短者；*Eburnitermes*、*Indotermes*、*Eurytermes* 兵蚁腹部因纯由工蚁唾液饲喂而呈乳白色（白肠型兵蚁）。工蚁左上颚端齿与第一缘齿长大、明显突出于第三缘齿与臼突连线之上，臼突上方并可见一副（第四）缘齿；右上颚端齿长于第一缘齿——此为本亚科工蚁上颚的共同轮廓，属间鉴定则仍靠肠瓣细节。食性以食土（腐殖质）为主，但并非全部种类均为食土性，如腹爆白蚁属的 *Ruptitermes arboreus* 与印白蚁属 *Indotermes* 取食更广泛的底物（包括落叶）；本亚科营弥散的地下巢，生活隐蔽，分类鉴定长期依赖工蚁肠瓣形态与分子序列。三大区系分明：旧热带界（西非、中非、东非及南部非洲）种类最多，东洋界次之，新热带界亦有代表。线粒体系统发育与生物地理学研究确认本亚科为单系群，起源于旧热带界，尔后分别扩散至东洋界与新热带界[21]。经济上，本亚科新热带的 *Anoplotermes* 属有危害记录：巴西旱稻根际的 *Anoplotermes* 被首次鉴定为旱稻害虫[42]，米纳斯吉拉斯州 *Anoplotermes pacificus* 危害桉树苗木[43]，*Aparatermes abbreviatus* 危害牧草与桉树根系[44]。



亮白蚁 *Euhamitermes sp.*

顺白蚁属 *Acholotermes*

Acholotermes chirotus 短小顺白蚁（东非、刚果、刚果民主共和国）

Acholotermes epius 椭囟顺白蚁（非洲热带、赞比亚）
Acholotermes imbellis 和平顺白蚁（非洲热带）
Acholotermes socialis 社会顺白蚁（中非、刚果盆地、尼日利亚）
******Acholotermes tithasus* 体大顺白蚁（非洲热带）

虚白蚁属 *Acidnotermes*

******Acidnotermes praus* 短肠虚白蚁（非洲热带）

尖齿白蚁属 *Acutidentitermes*

******Acutidentitermes osborni* 奥斯本尖齿白蚁（刚果民主共和国）

和白蚁属 *Adaiphrotermes*

Adaiphrotermes choanensis 乔安和白蚁（肯尼亚、马拉维、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、津巴布韦）
******Adaiphrotermes cuniculator* 灵动和白蚁（西非）
Adaiphrotermes scapheutes 中凹和白蚁（马拉维、赞比亚）

谐白蚁属 *Aderitotermes*

Aderitotermes cavator 中空谐白蚁（西非、喀麦隆、冈比亚、科特迪瓦、尼日利亚）
******Aderitotermes fossor* 挖掘谐白蚁（喀麦隆、肯尼亚、马拉维、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚）

弱白蚁属 *Adynatotermes*

******Adynatotermes moretelae* 莫特拉弱白蚁（南非）

雅白蚁属 *Aganotermes*

******Aganotermes oryctes* 挖者雅白蚁（南非、赞比亚、津巴布韦）

异颚白蚁属 *Allognathotermes*

Allognathotermes aburiensis 阿布里异颚白蚁（加纳、几内亚、尼日利亚）
******Allognathotermes hypogeus* 地下异颚白蚁（西非、喀麦隆）
Allognathotermes ivorensis 象牙海岸异颚白蚁（西非）

逃白蚁属 *Alyscotermes*

******Alyscotermes kilimandjaricus* 乞力马扎罗逃白蚁（刚果民主共和国、冈比亚、几内亚、科特迪瓦、肯尼亚、马拉维、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、乌干达、津巴布韦）
Alyscotermes trestus 懦夫逃白蚁（埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚）

软白蚁属 *Amalotermes*

******Amalotermes phaeocephalus* 暗头软白蚁（中非、刚果盆地、喀麦隆、刚果（布）、刚果民主共和国、加蓬、尼日利亚）

善白蚁属 *Amicotermes*

Amicotermes autothysius 自爆善白蚁（喀麦隆）
Amicotermes camerunensis 喀麦隆善白蚁（喀麦隆）
Amicotermes congoensis 刚果善白蚁（刚果民主共和国、刚果）
Amicotermes cristatus 冠毛善白蚁（刚果）
Amicotermes dibogi 迪博格善白蚁（喀麦隆）
******Amicotermes galenus* 盖伦善白蚁（刚果民主共和国、尼日利亚）
Amicotermes gasteruptus 腰肠善白蚁（喀麦隆）
Amicotermes ivorensis 象牙海岸善白蚁（喀麦隆、科特迪瓦）

Amicotermes mayombei 马永贝善白蚁（刚果）
Amicotermes mbalmayoensis 姆巴尔马约善白蚁（喀麦隆、姆巴尔马约、尼日利亚）
Amicotermes multispinus 多刺善白蚁（刚果）
Amicotermes spiculatus 具针善白蚁（喀麦隆）

大腿白蚁属 *Amplucrutermes*

**Amplucrutermes inflatus* 椭圆大腿白蚁（南美洲、圭亚那地盾、法属圭亚那）

无戟白蚁属 *Anaorotermes*

**Anaorotermes echinocolon* 海胆肠无戟白蚁（尼日利亚）

无甲白蚁属 *Anenteotermes*

Anenteotermes amachetus 无刀无甲白蚁（刚果共和国、刚果民主共和国）
Anenteotermes ateuchestes 无锐无甲白蚁（喀麦隆、冈比亚、坦桑尼亚）
Anenteotermes cherubimi 小天使无甲白蚁（刚果共和国、喀麦隆）
Anenteotermes cicur 温顺无甲白蚁（刚果民主共和国）
Anenteotermes cnaphorus 笨神无甲白蚁（刚果共和国、刚果民主共和国、马拉维）
**Anenteotermes disluctans* 不斗无甲白蚁（刚果民主共和国、乌干达、赞比亚）
Anenteotermes hemerus 肱骨无甲白蚁（苏丹）
Anenteotermes improcinctus 无备无甲白蚁（科特迪瓦、尼日利亚）
Anenteotermes improelatans 不变无甲白蚁（肯尼亚、马拉维）
Anenteotermes nanus 侏儒无甲白蚁（喀麦隆、刚果共和国、刚果民主共和国）
Anenteotermes polyscolus 多魁无甲白蚁（西非、中非、刚果盆地）

解甲白蚁属 *Anoplotermes*

Anoplotermes ater 暗黑解甲白蚁（巴西、阿根廷、哥伦比亚、巴拉圭、秘鲁）
Anoplotermes bahamensis 巴哈马解甲白蚁（巴哈马）
Anoplotermes banksi 班克斯解甲白蚁（巴西、圭亚那地盾、亚马孙地区、特立尼达和多巴哥）
Anoplotermes bolivianus 玻利维亚解甲白蚁（玻利维亚）
Anoplotermes brucei 布鲁斯解甲白蚁（玻利维亚）
Anoplotermes distans 遥远解甲白蚁（圭亚那地盾、亚马孙地区）
Anoplotermes fumosus 烟色解甲白蚁（巴西、墨西哥、美国）
Anoplotermes gracilis 细瘦解甲白蚁（法属圭亚那、巴拿马）
Anoplotermes grandifrons 大囟解甲白蚁（玻利维亚）
Anoplotermes hondurensis 洪都拉斯解甲白蚁（洪都拉斯）
Anoplotermes howardi 霍华德解甲白蚁（玻利维亚、巴西）
Anoplotermes inopinatus 意外解甲白蚁（巴哈马）
Anoplotermes janus 门神解甲白蚁（巴西、圭亚那地盾、亚马孙地区、中美洲及加勒比）
Anoplotermes meridianus 南方解甲白蚁（巴西、亚马孙地区、南美东南部、中美洲及加勒比）
**Anoplotermes pacificus* 太平洋解甲白蚁（巴西、亚马孙地区）
Anoplotermes parvus 小解甲白蚁（巴西、圭亚那地盾、亚马孙地区、中美洲及加勒比）
Anoplotermes punctatus 具点解甲白蚁（玻利维亚）
Anoplotermes pyriformis 梨形解甲白蚁（哥斯达黎加）
Anoplotermes rotundus 球形解甲白蚁（玻利维亚）

Anoplotermes schwarzi 施瓦茨解甲白蚁（古巴）
Anoplotermes subterraneus 地下解甲白蚁（圭亚那、委内瑞拉）
Anoplotermes susanae 苏珊解甲白蚁（厄瓜多尔、巴西、法属圭亚那、秘鲁）
Anoplotermes tenebrosus 黑暗解甲白蚁（巴西、阿根廷、委内瑞拉）

疲白蚁属 *Apagotermes*

**Apagotermes stolidus* 愚蠢疲白蚁（刚果民主共和国、喀麦隆、刚果共和国、尼日利亚）

弯肠白蚁属 *Aparatermes*

**Aparatermes abbreviatus* 缩短弯肠白蚁（亚马孙地区、南美西北部、南美东南部、阿根廷/巴拉圭/乌拉圭、玻利维亚）
Aparatermes cingulatus 环带弯肠白蚁（巴西、圭亚那地盾、法属圭亚那/圭亚那/苏里南、亚马孙地区、哥伦比亚/秘鲁/玻利维亚/厄瓜多尔、南美东南部、阿根廷/巴拉圭/乌拉圭、中美洲及加勒比）
Aparatermes thornatus 刺棘弯肠白蚁（巴西、圭亚那地盾、法属圭亚那/圭亚那/苏里南、亚马孙地区、哥伦比亚/秘鲁/玻利维亚/厄瓜多尔、中美洲及加勒比）

尖白蚁属 *Apicotermes*

Apicotermes angustatus 狭窄尖白蚁（安哥拉、刚果民主共和国）
Apicotermes arquieri 阿奎尔尖白蚁（中非、刚果盆地、尼日利亚）
Apicotermes desneuxi 德纳尖白蚁（刚果民主共和国）
Apicotermes emersoni 埃默森尖白蚁（安哥拉、刚果民主共和国）
Apicotermes goesswaldi 格斯瓦尔德尖白蚁（安哥拉、刚果民主共和国）
Apicotermes gurgulifex 喉头尖白蚁（安哥拉、刚果民主共和国）
Apicotermes holmgreni 霍姆格伦尖白蚁（马拉维、坦桑尼亚）
Apicotermes kisantuensis 基桑图尖白蚁（刚果民主共和国）
Apicotermes lamani 拉曼尖白蚁（安哥拉、刚果、刚果民主共和国、坦桑尼亚）
Apicotermes occultus 隐蔽尖白蚁（几内亚、尼日利亚）
Apicotermes porifex 具孔尖白蚁（刚果民主共和国）
Apicotermes rimulifex 裂缝尖白蚁（安哥拉、刚果民主共和国）
**Apicotermes tragardhi* 特雷高尖白蚁（莫桑比克、南非、坦桑尼亚、津巴布韦）

和平白蚁属 *Apolemotermes*

**Apolemotermes fodiens* 挖掘和平白蚁（喀麦隆）

无剑白蚁属 *Asagarotermes*

**Asagarotermes coronatus* 冠毛无剑白蚁（刚果（金）加丹加、喀麦隆、刚果民主共和国）

无利器白蚁属 *Astalotermes*

Astalotermes acholus 阿彻鲁斯无利器白蚁（非洲热带、喀麦隆、刚果民主共和国、坦桑尼亚）
Astalotermes aganus 温柔无利器白蚁（非洲热带、南非）
Astalotermes amicus 仁爱无利器白蚁（非洲热带、坦桑尼亚）
Astalotermes benignus 仁慈无利器白蚁（非洲热带、几内亚、科特迪瓦、尼日利亚）
Astalotermes brevior 短小无利器白蚁（中非刚果盆地、南部非洲、安哥拉、喀麦隆、纳米比亚、南非、斯威士兰、赞比亚、津巴布韦）
Astalotermes comis 友好无利器白蚁（非洲热带、喀麦隆、南非）
**Astalotermes concilians* 团结无利器白蚁（西非、几内亚、尼日利亚）

Astalotermes empodius 棘头无利器白蚁（非洲热带、南非）
Astalotermes eumenus 蜾蠃无利器白蚁（非洲热带、刚果民主共和国）
Astalotermes hapalus 哈帕勒斯无利器白蚁（非洲热带、肯尼亚）
Astalotermes ignavus 懒惰无利器白蚁（非洲热带、刚果）
Astalotermes impedians 慢行无利器白蚁（非洲热带、赞比亚）
Astalotermes irrixosus 和平无利器白蚁（非洲热带、苏丹）
Astalotermes mitis 温和无利器白蚁（非洲热带、马拉维）
Astalotermes murcus 懦弱无利器白蚁（非洲热带、喀麦隆、刚果、赞比亚）
Astalotermes obstructus 阻碍无利器白蚁（非洲热带、刚果民主共和国）
Astalotermes quietus 宁静无利器白蚁（西非、中非刚果盆地、喀麦隆、刚果民主共和国、加纳、几内亚、科特迪瓦、尼日利亚、卢旺达、塞拉利昂）

无刃白蚁属 *Astratotermes*

Astratotermes aneristus 赞比亚无刃白蚁（非洲热带）
Astratotermes apocnetus 小凶无刃白蚁（非洲热带）
Astratotermes hilarus 高兴无刃白蚁（中非刚果盆地、东非、喀麦隆、刚果民主共和国、坦桑尼亚）
Astratotermes mansuetus 驯服无刃白蚁（非洲热带）
Astratotermes pacatus 平静无刃白蚁（非洲热带）
**Astratotermes prosenus* 大型无刃白蚁（非洲热带）

无锐白蚁属 *Ateuchotermes*

Ateuchotermes ctenopher 梳肠无锐白蚁（喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬）
Ateuchotermes muricatus 胆怯无锐白蚁（马拉维、南非、斯威士兰）
**Ateuchotermes pectinatus* 梳痕无锐白蚁（喀麦隆、刚果民主共和国、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达）
Ateuchotermes rastratus 耙痕无锐白蚁（喀麦隆、埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚）
Ateuchotermes retifaciens 刚果无锐白蚁（喀麦隆、刚果民主共和国）
Ateuchotermes sentosus 多刺无锐白蚁（喀麦隆、刚果、几内亚、尼日利亚）
Ateuchotermes spinulatus 小刺无锐白蚁（刚果民主共和国）
Ateuchotermes tranquillus 宁静无锐白蚁（几内亚）

首白蚁属 *Caputitermes*

**Caputitermes dimorphus* 二型首白蚁（巴西）

蔡斯白蚁属 *Chasitermes*

**Chasitermes pax* 和平蔡斯白蚁（特立尼达和多巴哥）

肠刺白蚁属 *Compositermes*

Compositermes bani 班恩肠刺白蚁（玻利维亚、巴西）
**Compositermes vindai* 文达肠刺白蚁（巴西、圭亚那地盾、法属圭亚那/圭亚那/苏里南、亚马孙地区、哥伦比亚/秘鲁/玻利维亚/厄瓜多尔、南美东南部、阿根廷/巴拉圭/乌拉圭、中美洲及加勒比）

基白蚁属 *Coxotermes*

**Coxotermes boukokoensis* 布科科基白蚁（中非、喀麦隆、刚果、尼日利亚、中非共和国）

间断白蚁属 *Disjunctitermes*

**Disjunctitermes insularis* 岛生间断白蚁（巴西、亚马孙地区、中美洲及加勒比）

隐藏白蚁属 *Dissimulitermes*

**Dissimulitermes invisibilis* 隐形隐藏白蚁（巴西）

双齿白蚁属 *Duplidentitermes*

**Duplidentitermes furcatidens* 叉齿双齿白蚁（喀麦隆、中非共和国、刚果（布）、加纳、科特迪瓦）

Duplidentitermes jurioni 朱里翁双齿白蚁（安哥拉、刚果民主共和国）

Duplidentitermes latimentonis 宽颏双齿白蚁（刚果民主共和国）

埃博戈白蚁属 *Ebogotermes*

**Ebogotermes raphaeli* 拉斐尔埃博戈白蚁（喀麦隆）

象牙白蚁属 *Eburnitermes*

**Eburnitermes grassei* 格拉塞象牙白蚁（喀麦隆、科特迪瓦、尼日利亚）

多刺白蚁属 *Echinotermes*

**Echinotermes biriba* 比里巴多刺白蚁（南美洲、哥伦比亚、秘鲁）

亮白蚁属 *Euhamitermes*

Euhamitermes aruna 阿鲁纳亮白蚁（东洋界）

Euhamitermes bidentatus 双齿亮白蚁（东洋界）

Euhamitermes chhotanii 乔塔里亮白蚁（南亚、印度）

Euhamitermes concavigulus 匙颏亮白蚁（东洋界）

Euhamitermes daweishanensis 大围亮白蚁（中国、云南）

Euhamitermes dentatus 具齿亮白蚁（印度、安得拉邦）

Euhamitermes guizhouensis 贵州亮白蚁（中国、贵州）

**Euhamitermes hamatus* 多毛亮白蚁（东南亚、泰国及中国南方）

Euhamitermes indicus 印度亮白蚁（印度、泰米尔纳德邦）

Euhamitermes kanhaensis 甘哈亮白蚁（南亚、印度）

Euhamitermes karnatakensis 卡纳塔克亮白蚁（印度卡纳塔克）

Euhamitermes lighti 莱特亮白蚁（南亚、印度）

Euhamitermes melanocephalus 黑头亮白蚁（东洋界）

Euhamitermes mengdingensis 孟定亮白蚁（中国、云南）

Euhamitermes microcephalus 小头亮白蚁（东洋界）

Euhamitermes quadratceps 方头亮白蚁（中国）

Euhamitermes retusus 凹唇亮白蚁（东洋界）

Euhamitermes shillongensis 西隆亮白蚁（南亚、印度梅加拉亚）

Euhamitermes urbanii 乌尔巴尼亮白蚁（东洋界）

Euhamitermes wittmeri 威特默亮白蚁（东洋界）

Euhamitermes yui 尤氏亮白蚁（中国）

Euhamitermes yunnanensis 云南亮白蚁（中国、云南）

Euhamitermes yuntaishanensis 云台山亮白蚁（中国、云南）

Euhamitermes zhejianensis 浙江亮白蚁（中国、浙江）

宽白蚁属 *Eurytermes*

**Eurytermes assmuthi* 阿斯穆斯宽白蚁（南亚、印度）

assmuthi 指名亚种
modestior 温和亚种
Eurytermes boveni 博文宽白蚁（东洋界、印度）
Eurytermes buddha 大佛宽白蚁（印度、泰米尔纳德邦）
Eurytermes ceylonicus 锡兰宽白蚁（斯里兰卡）
Eurytermes mohana 莫罕娜宽白蚁（东洋界、印度）
Eurytermes topslipensis 托普斯利普宽白蚁（南亚、印度西高止山）

坚白蚁属 *Firmitermes*

**Firmitermes abyssinicus* 阿比西尼亚坚白蚁（旧热带界、埃塞俄比亚）

胃白蚁属 *Gastrotermes*

**Gastrotermes spinatus* 多刺胃白蚁（西非/中非、喀麦隆）

灰白蚁属 *Grigiotermes*

**Grigiotermes hageni* 哈根灰白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、委内瑞拉、玻利维亚、巴拉圭、阿根廷、特立尼达和多巴哥）
Grigiotermes piassava 皮亚萨瓦灰白蚁（巴西）

埃姆白蚁属 *Heimitermes*

**Heimitermes laticeps* 宽头埃姆白蚁（中非、喀麦隆、尼日利亚）
Heimitermes moorei 穆尔埃姆白蚁（旧热带界）

毛糙白蚁属 *Hirsutitermes*

**Hirsutitermes kanzakii* 神崎毛糙白蚁（哥伦比亚、法属圭亚那、玻利维亚、巴西、厄瓜多尔、秘鲁、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）

锐颚白蚁属 *Hoplognathotermes*

Hoplognathotermes angolensis 安哥拉锐颚白蚁（非洲、安哥拉）
Hoplognathotermes submissus 地下锐颚白蚁（旧热带界、喀麦隆）
**Hoplognathotermes subterraneus* 土栖锐颚白蚁（西非、科特迪瓦）

腐殖白蚁属 *Humutermes*

**Humutermes krishnai* 克里希纳腐殖白蚁（新热带界、巴拿马、哥伦比亚、法属圭亚那、巴西、厄瓜多尔）
Humutermes noiroti 努瓦罗腐殖白蚁（新热带界）

海德瑞克白蚁属 *Hydrecotermes*

**Hydrecotermes arienesho* 惊人海德瑞克白蚁（哥伦比亚、法属圭亚那、玻利维亚、巴拉圭、特立尼达和多巴哥）
Hydrecotermes kawaii 可爱海德瑞克白蚁（哥伦比亚、法属圭亚那、巴西、阿根廷、玻利维亚、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、特立尼达和多巴哥）

印白蚁属 *Indotermes*

Indotermes arshadi 阿沙德印白蚁（东洋界）
Indotermes capillosus 多毛印白蚁（东洋界）
Indotermes hainanensis 海南印白蚁（中国、海南）
Indotermes isodentatus 等齿印白蚁（东洋界）
Indotermes luxiensis 潞西印白蚁（中国、云南）

*_Indotermes maymensis_ 眉妙印白蚁（缅甸、中国）
Indotermes menggarensis 勐戛印白蚁（中国、西藏）
Indotermes rongrensis 龙格伦吉里印白蚁（东洋界）
Indotermes thailandis 泰国印白蚁（泰国）
Indotermes yunnanensis 云南印白蚁（中国、云南）

岗白蚁属 *Jugositermes*

**Jugositermes tuberculatus* 具瘤岗白蚁（中非、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、加蓬、尼日利亚）

库塔巴白蚁属 *Koutabatermes*

**Koutabatermes spinifer* 具刺库塔巴白蚁（新热带界具体国家未核、喀麦隆）

克雷切克白蚁属 *Krecekitermes*

**Krecekitermes daironi* 戴龙克雷切克白蚁（南美洲、哥伦比亚、法属圭亚那）

钳白蚁属 *Labidotermes*

**Labidotermes celisi* 塞利斯钳白蚁（中非、喀麦隆）

长工白蚁属 *Longustitermes*

**Longustitermes manni* 曼长工白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、秘鲁、玻利维亚、哥斯达黎加、洪都拉斯、巴拿马）

剑白蚁属 *Machadotermes*

**Machadotermes inflatus* 过高剑白蚁（旧热带界）
Machadotermes latus 宽剑白蚁（旧热带界）
Machadotermes rigidus 强直剑白蚁（旧热带界）

曼戈尔德白蚁属 *Mangolditermes*

**Mangolditermes curveileum* 曲回曼戈尔德白蚁（南美洲、哥伦比亚、法属圭亚那、玻利维亚、巴西、巴拉圭、秘鲁、特立尼达和多巴哥）

海胆白蚁属 *Ourissotermes*

**Ourissotermes giblinorum* 吉布林海胆白蚁（南美洲）

帕塔瓦白蚁属 *Patawatermes*

Patawatermes nigripunctatus 黑点帕塔瓦白蚁（南美洲、哥伦比亚、法属圭亚那、厄瓜多尔、巴西、玻利维亚、秘鲁、特立尼达和多巴哥）
**Patawatermes turricola* 土栖帕塔瓦白蚁（南美洲、哥伦比亚、巴西、秘鲁、厄瓜多尔、委内瑞拉、巴拉圭、阿根廷、玻利维亚、巴拿马、特立尼达和多巴哥）

锐白蚁属 *Phoxotermes*

**Phoxotermes cerberus* 三头犬锐白蚁（中非、喀麦隆、刚果）

突吻白蚁属 *Rostrotermes*

**Rostrotermes cornutus* 具角突吻白蚁（西非、科特迪瓦、几内亚、利比里亚、尼日利亚、塞拉利昂）

变红白蚁属 *Rubeotermes*

**Rubeotermes jheringi* 耶林变红白蚁（南美洲、巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、特立尼达和多巴哥）

腹爆白蚁属 *Ruptitermes*

Ruptitermes araujoi 阿劳若腹爆白蚁（巴西）

Ruptitermes arboreus 树栖腹爆白蚁（巴西及邻近南美国家、哥伦比亚、圭亚那、法属圭亚那、苏里南）
Ruptitermes atyra 硬毛腹爆白蚁（南美洲、哥伦比亚、巴西、巴拿马、秘鲁）
Ruptitermes bandeirai 班代拉腹爆白蚁（巴西）
Ruptitermes cangua 圆头腹爆白蚁（南美洲、法属圭亚那、巴西）
Ruptitermes franciscoi 弗朗西斯科腹爆白蚁（南美洲、巴西、法属圭亚那、委内瑞拉、玻利维亚、哥伦比亚）
Ruptitermes kaapora 林栖腹爆白蚁（巴西、巴拉圭）
Ruptitermes krishnai 克里希纳腹爆白蚁（巴西、特立尼达和多巴哥）
Ruptitermes maraca 马拉卡腹爆白蚁（巴西）
Ruptitermes piliceps 毛头腹爆白蚁（南美洲、哥伦比亚、巴西）
Ruptitermes pitan 红头腹爆白蚁（巴西）
Ruptitermes reconditus 隐匿腹爆白蚁（新热带界、巴拿马、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、玻利维亚、厄瓜多尔、阿根廷、法属圭亚那、巴拉圭、秘鲁）
**Ruptitermes xanthochiton* 黄袍腹爆白蚁（南美洲、巴西、巴拉圭、法属圭亚那、玻利维亚）

拉斯特白蚁属 *Rustitermes*

**Rustitermes boteroi* 博特罗拉斯特白蚁（南美洲、哥伦比亚、法属圭亚那、巴西、特立尼达和多巴哥）

洁白蚁属 *Skatitermes*

**Skatitermes psammophilus* 喜沙洁白蚁（非洲南部南非）
Skatitermes watti 瓦特洁白蚁（非洲南部南非）

稀白蚁属 *Speculitermes*

Speculitermes angustigulus 狭颏稀白蚁（南亚、印度、中国）
Speculitermes chadaensis 查达稀白蚁（南亚、印度）
**Speculitermes cyclops* 巨人稀白蚁（南亚、印度）
Speculitermes deccanensis 德干稀白蚁（南亚、印度德干）
Speculitermes dharwarensis 塔尔瓦尔稀白蚁（南亚、印度卡纳塔克）
Speculitermes emersoni 埃默森稀白蚁（南亚、印度）
Speculitermes goesswaldi 格斯瓦尔德稀白蚁（南亚、印度）
Speculitermes latalabrum 宽唇稀白蚁（南亚、印度）
Speculitermes macrodentatus 大齿稀白蚁（中国南方、泰国、柬埔寨）
Speculitermes paivai 派瓦稀白蚁（南亚、印度）
Speculitermes roonwali 鲁恩沃稀白蚁（南亚、印度）
Speculitermes sinhalensis 僧伽罗稀白蚁（斯里兰卡、印度）
Speculitermes triangularis 三角稀白蚁（南亚、印度）

足白蚁属 *Tetimatermes*

**Tetimatermes oliveirae* 橄榄树足白蚁（巴西）

奇囟白蚁属 *Tonsuritermes*

Tonsuritermes mathewsi 马修斯奇囟白蚁（巴西）
**Tonsuritermes tucki* 塔克奇囟白蚁（南美洲、巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、巴拉圭、秘鲁）

发白蚁属 *Trichotermes*

Trichotermes ducis 首领发白蚁（旧热带界、刚果民主共和国）

Trichotermes machadoi 马查多发白蚁（旧热带界）

* *Trichotermes villifrons* 毛额发白蚁（非洲、刚果民主共和国、中非、刚果共和国）

三棒白蚁属 *Triclavitermes*

* *Triclavitermes catoleensis* 卡托莱三棒白蚁（巴西、巴伊亚）

黄汁白蚁属 *Tucupitermes*


* *Tucupitermes ubixaba* 乌比沙巴黄汁白蚁（巴西）

响白蚁亚科 Crepititermitinae

响白蚁亚科由 Hellemans、Engel 与 Bourguignon 于 2024 年建立[21]，模式属为响白蚁属 *Crepititermes* Emerson, 1925；亚科名源自模式属名（拉丁语 crepitus，爆裂声）。本名录收录 1 属 1 种。

因仅含一属一种，其特征即亚科特征。唯一种分布于南美洲：巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、玻利维亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁及特立尼达和多巴哥。食性为腐殖质（土壤）食性。兵蚁头近矩形、额扁平，上唇端缘凹入、侧角尖锐，上颚为对称弹颚（symmetrical snapping mandibles）；其工蚁御敌行自体爆炸[21]（autothysis）：受扰时胸腹部交界处体背破裂，暴露黏性肠内容物御敌。后肠 P3 具盲囊、砂囊具柱状带等特征介于方白蚁亚科与近缘类群之间，为高等白蚁早期分支的代表类群之一。

Rocha & Cuezzo (2015)[45] 首次系统描述了该种工蚁消化道的形态与原位盘绕方式；有翅蚁曾由 Emerson (1925) 据圭亚那 Kartabo 正模记述（*Crepititermes verruculosus* 正模即为成虫），Roonwal & Verma (1980)[46] 另记述其翅面微刻饰。法属圭亚那 Petit Saut 种群的工蚁肠道宏基因组亦有测序记录（Mikaelyan et al., 2015）[47]，为研究土栖高等白蚁肠道共生菌提供了材料。



Supplementary Figure 3: Crepititermitinae, represented by its sole species, *Crepititermes verruculosus*. (a) Soldier's head, in dorsal view. (b) Digestive tube, in right view, with (c) detail of the Malpighian tubules insertion; the arrow indicates the P3 diverticulum (both adapted from Rocha & Cuezzo[26]). (d) Left and right worker mandibles (not to scale; adapted from Rocha & Cuezzo[26]). (e) Enteric valve armature (UF-PU715). Foregut: C, crop; G, gizzard. Midgut (stippled). Hindgut: P1, ileum; P2, enteric valve; P3, paunch; P4, colon; P5, rectum. Mandibles: A, apical tooth; LM, left marginal tooth; RM, right marginal tooth; Mpr, molar prominence; Mpl, molar plate.

Crepititermes verruculosus 多疣响白蚁（参考文献 21 的补充资料）

响白蚁属 *Crepititermes*

**Crepititermes verruculosus* 多疣响白蚁（南美洲、巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、玻利维亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、特立尼达和多巴哥）

方白蚁亚科 Cubitermitinae

方白蚁亚科由 Weidner 于 1956 年建立，模式属为方白蚁属 *Cubitermes* Wasmann, 1902，亚科名取自模式属。本名录收录 28 属 142 种。

本亚科已知属种均分布于撒哈拉以南非洲——西非（科特迪瓦、尼日利亚、几内亚、塞内加尔、冈比亚、多哥等）、中非与刚果盆地（喀麦隆、刚果、刚果民主共和国、加蓬、中非共和国）、东非（肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达）及非洲南部（南非、津巴布韦、赞比亚、纳米比亚、安哥拉等）。食性以食土（腐殖质）为主；筑巢方式为其显著特征——许多属在地表建造柱状、伞状或蘑菇状垅巢，巢壁以土粪构筑，可显著富集土壤黏粒与养分、改造土壤结构（乌干达草原 *Cubitermes testaceus* 垅巢密度可达每公顷百余个[48]），常被用作土壤健康的生物指示类群。兵蚁具咬合型上颚，行巢口防御。以模式属方白蚁属 *Cubitermes* 为代表，兵蚁头近矩形、囟门位于额面，触角约 14–15 节，上颚短壮内弯；原方白蚁属 *Procubitermes*、节白蚁属 *Noditermes*、*Basidentitermes*、*Unguitermes*、*Unicornitermes* 等属兵蚁腹部乳白色（白肠型），纯由工蚁唾液饲喂。工蚁回肠（P1）膨大成囊状，肠瓣具中间垫，后肠 P3 腹面具盲囊，砂囊不具柱状带。分类上本亚科为稳固单系群；方白蚁属 *Cubitermes* 的后肠是研究高等白蚁肠道厌氧发酵与产甲烷微生物区系的经典材料[49]。

经济上本亚科全系食土类群，其垅巢在湿润牧场边缘密生时可能占压土地[50]。



蛇白蚁 *Ophiotermes sp.*(https://www.inaturalist.org/observations/330017606)

无毛白蚁属 *Apilitermes*

**Apilitermes longiceps* 长头无毛白蚁（旧热带界、刚果、尼日利亚）

基齿白蚁属 *Basidentitermes*

Basidentitermes amicus 友善基齿白蚁（旧热带界、坦桑尼亚）

**Basidentitermes aurivillii* 奥里维尔基齿白蚁（西非、多哥、尼日利亚、加纳、喀麦隆、刚果共和国、刚果民主共和国、苏丹、乌干达）
Basidentitermes demoulini 德穆兰基齿白蚁（旧热带界、喀麦隆、刚果民主共和国、坦桑尼亚）
Basidentitermes diversifrons 裂额基齿白蚁（旧热带界、喀麦隆、刚果共和国）
Basidentitermes mactus 荣耀基齿白蚁（西非、几内亚、利比里亚、加纳、科特迪瓦、尼日利亚、喀麦隆、坦桑尼亚）
mactus 指名亚种
supera 上亚种
Basidentitermes malelaensis 马雷拉基齿白蚁（非洲、刚果、喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬、加纳）
Basidentitermes potens 强壮基齿白蚁（西非、科特迪瓦、冈比亚、多哥、尼日利亚、塞内加尔、喀麦隆、坦桑尼亚）
Basidentitermes trilobatus 三裂基齿白蚁（旧热带界）

铲白蚁属 *Batillitermes*

Batillitermes clypeatus 大唇铲白蚁（非洲南部、南非、尼日利亚）
**Batillitermes monachus* 僧侣铲白蚁（非洲南部、南非、津巴布韦）

刻痕白蚁属 *Crenetermes*

**Crenetermes albotarsalis* 白跗刻痕白蚁（中非、喀麦隆、刚果、刚果民主共和国、加蓬、尼日利亚、卢旺达、坦桑尼亚、赞比亚）
Crenetermes elongatus 细长刻痕白蚁（旧热带界）
Crenetermes fruitus 可爱刻痕白蚁（旧热带界）
Crenetermes mandibulatus 大颚刻痕白蚁（旧热带界）
Crenetermes mixtus 混杂刻痕白蚁（旧热带界）

方白蚁属 *Cubitermes*

Cubitermes atrox 凶猛方白蚁（旧热带界）
**Cubitermes bilobatus* 双裂方白蚁（非洲南部、南非、刚果民主共和国、尼日利亚、苏丹、坦桑尼亚）
Cubitermes caesareus 凯撒方白蚁（旧热带界）
Cubitermes conjenii 康杰尼方白蚁（非洲南部、南非）
Cubitermes exiguus 短小方白蚁（非洲、刚果民主共和国）
Cubitermes pretorianus 比勒陀利亚方白蚁（非洲南部、南非）
heidelbergi 海德堡亚种
pretorianus 指名亚种
Cubitermes sanctaeluciae 圣卢西亚方白蚁（非洲南部、南非、赞比亚）
Cubitermes tenuiceps 细头方白蚁（非洲、刚果民主共和国）
Cubitermes transvaalensis 德兰士瓦方白蚁（非洲南部、南非德兰士瓦、赞比亚）
Cubitermes zulucola 祖鲁兰方白蚁（非洲南部、南非祖鲁兰）
Cubitermes zuluensis 祖鲁方白蚁（非洲南部、南非祖鲁兰）

真唇白蚁属 *Euchilotermes*

Euchilotermes acutidens 尖齿真唇白蚁（旧热带界）

Euchilotermes quadriceps 方头真唇白蚁（旧热带界）
**Euchilotermes tensus* 拉长真唇白蚁（西非、冈比亚、几内亚、塞拉利昂、加纳、科特迪瓦、尼日利亚、喀麦隆）
arcuata 弓形亚种
tensus 指名亚种
Euchilotermes umbraticola 隐蔽真唇白蚁（旧热带界）

峰白蚁属 *Fastigitermes*

**Fastigitermes jucundus* 可爱峰白蚁（非洲热带、安哥拉、喀麦隆、中非共和国、刚果、刚果民主共和国、尼日利亚）

叉白蚁属 *Furculitermes*

Furculitermes brevilabius 短唇叉白蚁（旧热带界）
Furculitermes brevimalatus 短颚叉白蚁（旧热带界）
Furculitermes cubitalis 急弯叉白蚁（旧热带界）
Furculitermes hendrickxi 亨德里克斯叉白蚁（旧热带界）
Furculitermes longilabius 长唇叉白蚁（旧热带界）
Furculitermes parviceps 小头叉白蚁（中非、喀麦隆）
Furculitermes soyeri 索耶叉白蚁（旧热带界）
**Furculitermes winifredae* 威尼弗雷德叉白蚁（旧热带界）

等颚白蚁属 *Isognathotermes*

Isognathotermes bulbifrons 球额等颚白蚁（非洲热带）
Isognathotermes congoensis 刚果等颚白蚁（刚果民主共和国）
Isognathotermes finitimus 近邻等颚白蚁（非洲热带）
Isognathotermes fungifaber 菌匠等颚白蚁（非洲热带）
**Isognathotermes minitabundus* 威吓等颚白蚁（非洲热带）
Isognathotermes planifrons 平额等颚白蚁（非洲热带）
Isognathotermes severus 严肃等颚白蚁（西非科特迪瓦、喀麦隆、刚果民主共和国、冈比亚、几内亚、尼日利亚、苏丹、坦桑尼亚）
Isognathotermes ugandensis 乌干达等颚白蚁（乌干达、刚果民主共和国、肯尼亚、马拉维、卢旺达、坦桑尼亚、赞比亚）
Isognathotermes zenkeri 岑克等颚白蚁（喀麦隆、刚果民主共和国）

鳞白蚁属 *Lepidotermes*

Lepidotermes amydrus 幽暗鳞白蚁（非洲南部、南非）
Lepidotermes goliathi 戈利亚特鳞白蚁（非洲南部、南非）
Lepidotermes lounsburyi 劳恩斯伯里鳞白蚁（非洲南部、南非）
Lepidotermes mtwalumi 姆图瓦卢米鳞白蚁（非洲南部、南非）
Lepidotermes planifacies 扁形鳞白蚁（非洲南部、南非）
**Lepidotermes pretoriensis* 比勒陀利亚鳞白蚁（非洲南部、南非比勒陀利亚）
Lepidotermes scalenus 斜角肌鳞白蚁（非洲南部、南非）
Lepidotermes simplex 简单鳞白蚁（非洲南部、南非）
Lepidotermes vastus 空闲鳞白蚁（非洲南部、南非）

大颚白蚁属 *Megagnathotermes*

Megagnathotermes katangensis 加丹加大颚白蚁（非洲、刚果民主共和国加丹加、赞比亚）

**Megagnathotermes notandus* 标记大颚白蚁（西非、科特迪瓦、刚果民主共和国、冈比亚、几内亚、尼日利亚、塞拉利昂）

锐尖白蚁属 *Mucrotermes*

Mucrotermes heterochilus 异唇锐尖白蚁（旧热带界、贝宁、喀麦隆、刚果民主共和国、加纳、几内亚、尼日利亚）

**Mucrotermes osborni* 奥斯本锐尖白蚁（旧热带界、刚果民主共和国）

净白蚁属 *Nitiditermes*

Nitiditermes aemulus 竞争净白蚁（几内亚）

Nitiditermes anatruncatus 反截净白蚁（南非）

**Nitiditermes berghei* 伯格净白蚁（刚果民主共和国、赞比亚）

Nitiditermes curtatus 短缩净白蚁（加纳、几内亚、塞内加尔）

Nitiditermes fulvus 栗色净白蚁（坦桑尼亚）

Nitiditermes niokoloensis 尼奥科洛净白蚁（塞内加尔）

Nitiditermes oculatus 眼显净白蚁（加纳、几内亚、尼日利亚、塞内加尔、苏丹、坦桑尼亚）

Nitiditermes orthognathus 直颚净白蚁（刚果民主共和国、肯尼亚、马拉维、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚）

Nitiditermes proximatus 近净白蚁（西非、塞内加尔、科特迪瓦、布基纳法索、肯尼亚、坦桑尼亚）

Nitiditermes sankurensis 桑库鲁净白蚁（安哥拉、刚果共和国、刚果民主共和国、几内亚、肯尼亚、马拉维、马里、尼日利亚、塞内加尔、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦）

Nitiditermes schereri 谢勒净白蚁（刚果民主共和国、几内亚、科特迪瓦、利比里亚、塞拉利昂、坦桑尼亚）

Nitiditermes sierraleonicus 塞拉利昂净白蚁（塞拉利昂）

Nitiditermes testaceus 厚壳净白蚁（肯尼亚、卢旺达、南非、乌干达）

Nitiditermes truncatoides 拟伤残净白蚁（南非）

Nitiditermes truncatus 伤残净白蚁（南非）

节白蚁属 *Noditermes*

Noditermes angolensis 安哥拉节白蚁（安哥拉）

Noditermes cristifrons 毛额节白蚁（西非、冈比亚、塞内加尔、多哥、布基纳法索、安哥拉、喀麦隆、刚果民主共和国、坦桑尼亚）

Noditermes festivus 欢乐节白蚁（刚果民主共和国）

Noditermes indoensis 因多节白蚁（中非、加蓬、刚果盆地、喀麦隆、刚果（布）、刚果民主共和国、坦桑尼亚）

**Noditermes lamanianus* 拉曼节白蚁（中非、刚果共和国、安哥拉、喀麦隆、刚果民主共和国）

Noditermes profestus 工作日节白蚁（刚果民主共和国）

Noditermes wasambaricus 瓦森巴拉节白蚁（肯尼亚、坦桑尼亚）

奥卡万戈白蚁属 *Okavangotermes*

**Okavangotermes giessi* 吉斯奥卡万戈白蚁（安哥拉、纳米比亚）

Okavangotermes guineensis 几内亚奥卡万戈白蚁（加纳）

蛇白蚁属 *Ophiotermes*

Ophiotermes gracilis 细瘦蛇白蚁（安哥拉）

Ophiotermes grandilabius 大唇蛇白蚁（喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬、加纳、科特迪瓦、尼日利亚、坦桑尼亚）

**Ophiotermes mandibularis* 显颚蛇白蚁（中非、中非共和国、喀麦隆、刚果（布）、刚果民主共和国、加蓬）

Ophiotermes mirandus 惊奇蛇白蚁（安哥拉、刚果民主共和国、几内亚）

Ophiotermes receptus 接受蛇白蚁（中非、刚果民主共和国）

Ophiotermes shabaensis 沙巴蛇白蚁（刚果民主共和国）

Ophiotermes ugandaensis 乌干达蛇白蚁（安哥拉、刚果民主共和国、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达）

直白蚁属 *Orthotermes*

**Orthotermes depressifrons* 陷额直白蚁（非洲热带）

Orthotermes mansuetus 顺从直白蚁（刚果民主共和国、安哥拉、喀麦隆、加蓬）

奥万博兰白蚁属 *Ovambotermes*

**Ovambotermes sylvaticus* 林地奥万博兰白蚁（纳米比亚、赞比亚）

棘白蚁属 *Pilotermes*

**Pilotermes langi* 兰棘白蚁（刚果民主共和国）

多铲白蚁属 *Polyspathotermes*

Polyspathotermes bugeserae 布盖塞拉多铲白蚁（卢旺达）

Polyspathotermes inclitus 显赫多铲白蚁（刚果、刚果民主共和国、肯尼亚、马拉维、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚）

Polyspathotermes intercalatus 居间多铲白蚁（安哥拉、刚果、刚果民主共和国）

Polyspathotermes montanus 高山多铲白蚁（马拉维、坦桑尼亚、赞比亚）

Polyspathotermes oblectatus 愉悦多铲白蚁（刚果民主共和国、马拉维、坦桑尼亚、赞比亚）

**Polyspathotermes sulcifrons* 沟额多铲白蚁（喀麦隆、刚果民主共和国、尼日利亚、坦桑尼亚）

Polyspathotermes umbratus 荫生多铲白蚁（刚果民主共和国、几内亚、肯尼亚、马拉维、坦桑尼亚）

象鼻白蚁属 *Proboscitermes*

Proboscitermes mcgrewi 麦克格鲁象鼻白蚁（坦桑尼亚）

**Proboscitermes tubuliferus* 具管象鼻白蚁（喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬、尼日利亚）

原方白蚁属 *Procubitermes*

Procubitermes aburiensis 阿布里原方白蚁（西非、科特迪瓦、几内亚、多哥、加纳、尼日利亚）

**Procubitermes arboricola* 树栖原方白蚁（中非、喀麦隆、刚果、刚果民主共和国、尼日利亚）

Procubitermes curvatus 弯曲原方白蚁（加纳、几内亚、科特迪瓦、利比里亚）

Procubitermes niapuensis 尼亚普原方白蚁（喀麦隆、刚果、刚果民主共和国）

Procubitermes sinuosus 扭曲原方白蚁（西非、尼日利亚、几内亚）

Procubitermes sjostedti 舍斯泰特原方白蚁（西非、科特迪瓦、塞内加尔、尼日利亚、冈比亚、几内亚、利比里亚）

Procubitermes ueleensis 韦莱原方白蚁（刚果民主共和国、韦莱地区、加蓬、乌干达）

Procubitermes undulans 波纹原方白蚁（东非、乌干达、刚果民主共和国）

Procubitermes wasmanni 沃斯曼原方白蚁（喀麦隆）

前峰白蚁属 *Profastigitermes*

**Profastigitermes putnami* 帕特南前峰白蚁（喀麦隆、刚果民主共和国）

三方白蚁属 *Ternicubitermes*

**Ternicubitermes bilobatodes* 双叶三方白蚁（冈比亚、几内亚比绍、塞内加尔）

Ternicubitermes breviceps 短头三方白蚁（津巴布韦）

Ternicubitermes duplex 含糊三方白蚁（南非）

Ternicubitermes falcifer 具镰三方白蚁（坦桑尼亚）

Ternicubitermes glebae 土块三方白蚁（肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达）

Ternicubitermes latens 隐藏三方白蚁（坦桑尼亚）

Ternicubitermes microduplex 小双三方白蚁（南非）

Ternicubitermes muneris 职司三方白蚁（刚果民主共和国、肯尼亚、马拉维、坦桑尼亚、赞比亚）

Ternicubitermes pallidiceps 灰头三方白蚁（刚果民主共和国、马拉维、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦）

Ternicubitermes subcrenulatus 微齿三方白蚁（加纳、几内亚、科特迪瓦、尼日利亚）

Ternicubitermes undulatus 波颚三方白蚁（南非）

Ternicubitermes weissi 魏斯三方白蚁（刚果（布）、利比里亚）

Ternicubitermes zavattarii 扎瓦塔里三方白蚁（埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚）

胸白蚁属 *Thoracotermes*

Thoracotermes brevinotus 短背胸白蚁（西非、几内亚、科特迪瓦）

Thoracotermes grevillensis 格瑞维勒胸白蚁（安哥拉）

Thoracotermes lusingensis 卢森加胸白蚁（安哥拉、刚果民主共和国、尼日利亚、赞比亚）

**Thoracotermes macrothorax* 大胸胸白蚁（旧热带界、西非、中非、安哥拉、喀麦隆、刚果、刚果民主共和国、加蓬、加纳、几内亚、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚、塞拉利昂）

菱角白蚁属 *Trapellitermes*

**Trapellitermes loxomastax* 弯颚菱角白蚁（西非、科特迪瓦）

爪白蚁属 *Unguitermes*

Unguitermes acutifrons 尖额爪白蚁（非洲热带）

**Unguitermes bidentatus* 双齿爪白蚁（喀麦隆、刚果民主共和国、尼日利亚）

Unguitermes bouilloni 布永爪白蚁（刚果民主共和国）

Unguitermes magnus 大爪白蚁（非洲热带）

Unguitermes proclivifrons 前斜额爪白蚁（赞比亚）

Unguitermes trispinosus 三针爪白蚁（非洲热带）

Unguitermes unidentatus 单齿爪白蚁（纳米比亚）

独角白蚁属 *Unicornitermes*

**Unicornitermes gaerdesi* 盖尔德独角白蚁（纳米比亚、南非）

圆筒白蚁亚科 Cylindrotermitinae

圆筒白蚁亚科由 Hellemans、Engel 与 Bourguignon 于 2024 年建立[21]，模式属为圆筒白蚁属 *Cylindrotermes* Holmgren, 1906；亚科名取自模式属，指其细长圆筒状的头与体躯（希腊文 *kylindros*，圆筒）。本名录收录 2 属 9 种。

两属呈跨大西洋间断分布：头白蚁属 *Cephalotermes* Silvestri 为旧热带界属，直角头白蚁广布西非、中非至东非；圆筒白蚁属 *Cylindrotermes* Holmgren 为新热带界属，所辖 8 种均产新热带界。两属均为木食性，工蚁上颚属典型木食型：头白蚁属筑垅巢、群体庞大，巢中常有一对蚁王与腹极膨胀的蚁后；圆筒白蚁属栖于枯木中、群体较小。形态上兵蚁头部长而呈亚矩形、无额突、体表被短刚毛，上颚短粗、属咬合—劈砍型；工蚁回肠（P1）长管状并在直肠下方形成腹环，肠瓣具六个不等的垫，可与近缘类群区分。工蚁左上颚端齿约等于或短于第一、二合缘齿，第三缘齿发达；头白蚁属 *Cephalotermes* 的腹极膨胀蚁后随群体成熟渐失爬行能力（仅见于 *Cephalotermes* 垅巢群体）。2024 年系统发育基因组学证据表明二者构成独立单系支系，代表本科中非基部、分布却高度间断的狭域孑遗类群。经济上，圆筒白蚁属 *Cylindrotermes nordenskioeldi* 在巴西东北部甘蔗田被判定为有害[51]。



Cylindrotermes macrognathus 长颚圆筒白蚁（https://www.inaturalist.org/photos/449822418）

头白蚁属 *Cephalotermes*

**Cephalotermes rectangularis* 直角头白蚁（旧热带界、西非、中非、贝宁、喀麦隆、刚果、刚果民主共和国、加蓬、几内亚、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚、圣多美和普林西比、坦桑尼亚、乌干达）

圆筒白蚁属 *Cylindrotermes*

Cylindrotermes brevipilosus 短毛圆筒白蚁（新热带界）

Cylindrotermes caata 骨痂圆筒白蚁（新热带界）

Cylindrotermes capixaba 卡皮沙巴圆筒白蚁（新热带界）

Cylindrotermes flangiatus 凸缘圆筒白蚁（新热带界）

Cylindrotermes macrognathus 长颚圆筒白蚁（新热带界）

**Cylindrotermes nordenskioldi* 努登舍尔德圆筒白蚁（新热带界）

Cylindrotermes parvignathus 小颚圆筒白蚁（新热带界）

Cylindrotermes sapiranga 萨皮兰加圆筒白蚁（新热带界）

恩格尔白蚁亚科 Engelitermitinae

恩格尔白蚁亚科由 Romero-Arias、Roisin 与 Scheffrahn 等于 2024 年建立[52]，模式属即恩格尔白蚁属 *Engelitermes*，模式种赞博恩格尔白蚁 *E. zambo*；属名纪念白蚁分类学家 Michael S. Engel。本名录收录 1 属 1 种。

因仅含一属一种，其特征即亚科特征：正模群体[52]采自喀麦隆南部 Nyong 河畔的低地热带雨林，栖于枯死立木与树皮间约 50×60 cm 的空隙内，以黑色软粪质构筑巢腔，群体逾万头而兵蚁极少——四个已知样本中有两次只采到工蚁。工蚁上颚属食土（腐殖质）型，肠瓣垫上仅一枚棘刺且表皮无纹饰，这一组合在白蚁中独一无二；兵蚁罕见、腹部透明无固体食物，头黄橙色、矩形，上颚粗短、近基部各具一枚三角形齿，胫距式 2:2:2。有翅蚁迄今尚未采获。该亚科迄今仅知四个采集点，其发现表明非洲热带雨林中仍有本科独特深层支系有待发现。



Engelitermes zambo 赞博*恩格尔*白蚁(https://novataxa.blogspot.com/2023/12/engelitermes.html)

恩格尔白蚁属 *Engelitermes*

**Engelitermes zambo* 赞博恩格尔白蚁（喀麦隆）

孔白蚁亚科 Foraminitermitinae

孔白蚁亚科由 Holmgren 于 1912 年建立，模式属为孔白蚁属 *Foraminitermes* Holmgren, 1912；亚科名取自模式属（拉丁 *foramen*，指其囟门结构）。本名录收录 3 属 10 种。

分布兼及旧热带界（西非、中非至东非）与东洋界（马来半岛与东南亚）。食性以食土（腐殖质）为主，地下栖居，常活动于其他白蚁旧垅基部，十分稀有。形态上，兵蚁头近长方形、背腹略扁平，额区具一枚明显而稍凹陷的囟门；上颚属大颚型粗壮、缓弯而缘齿清晰，行咀嚼而非弹颚；工蚁上颚为食土型，肠瓣具棘状饰构，为本亚科近缘区分的重要鉴别依据。分类演化地位特殊：部分转录组与线粒体系统发育分析均将本亚科置于本科最基部的分化位置之一[21]，与圆球白蚁亚科及培菌的大白蚁亚科构成近缘的早期分支，是研究本科早期演化（尤其是食性转变与肠道共生微生物区系的起源）的关键狭域孑遗支系。



唇白蚁 *Labritermes Sp.*(https://www.inaturalist.org/photos/461877787)

孔白蚁属 *Foraminitermes*

Foraminitermes coatoni 科顿孔白蚁（安哥拉、刚果民主共和国）

Foraminitermes corniferus 具角孔白蚁（西非、多哥、刚果民主共和国）

Foraminitermes harrisi 哈里斯孔白蚁（刚果民主共和国）

Foraminitermes rhinoceros 犀牛孔白蚁（中非、中非共和国、肯尼亚、苏丹、坦桑尼亚、乌干达）

**Foraminitermes tubifrons* 瘤额孔白蚁（喀麦隆、几内亚、科特迪瓦、尼日利亚）

Foraminitermes valens 强健孔白蚁（中非、喀麦隆、几内亚、科特迪瓦、尼日利亚、坦桑尼亚）

唇白蚁属 *Labritermes*

**Labritermes buttelreepeni* 巴特里彭唇白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Labritermes emersoni 埃默森唇白蚁（马来西亚、印度尼西亚、新加坡）

Labritermes kistneri 基斯特纳唇白蚁（马来西亚、印度尼西亚）

伪小白蚁属 *Pseudomicrotermes*

**Pseudomicrotermes alboniger* 白黑伪小白蚁（喀麦隆、刚果（金）、尼日利亚、津巴布韦、刚果民主共和国）

剪白蚁亚科 Forficulitermitinae

剪白蚁亚科由 Hellemans、Engel 与 Bourguignon 于 2024 年建立[21]，模式属为剪白蚁属 *Forficulitermes* Emerson, 1960；亚科名取自模式属（拉丁 *forfex*，剪刀，指其细长钳状弯曲的上颚）。本名录收录 1 属 1 种。

因仅含一属一种，其特征即亚科特征：工蚁为食土（腐殖质）性；兵蚁头近方形，囟门位于浅凹内、前方两侧各具一道平纵脊并形成浅沟通至唇基基部，囟门与触角窝之间两侧另各有小瘤突，上颚细长无齿、行咬合而非弹击，上唇端缘具中突与尖锐的端侧角；工蚁右下颚第二缘齿发达，四条马氏管成对共同开口于混合节连接处——这些特征可与本科中常见的弹击型兵蚁及白蚁亚科相区别。2024 年分析中它在多数运算里位置不稳[21]（被列为 rogue taxon），但拓扑检验未拒绝其与恩格尔白蚁亚科近缘的假说；其独特的形态组合足以独立成亚科，代表本科中非基部、系统位置未定的又一狭域子遗单型支

系。



Forficulitermes planifrons 扁额剪白蚁（https://www.inaturalist.org/photos/619613456）

剪白蚁属 *Forficulitermes*

**Forficulitermes planifrons* 扁额剪白蚁（中非喀麦隆）

大白蚁亚科 Macrotermitinae

大白蚁亚科由 Kemner 于 1934 年建立[53]，模式属为大白蚁属 *Macrotermes* Holmgren, 1909（希腊文 *makros*，大，叠加 *Termes*）。本名录收录 12 属 373 种。

本亚科是白蚁科中唯一与担子菌蚁巢伞属 *Termitomyces* 专性共生、在巢内培养“菌圃”的类群，共生关系约 3000 万年前起源[54]。年轻工蚁以切碎植物材料与孢子在肠道内混合排出后筑圃，取食真菌分生孢子球以及老熟的菌圃，由此可利用老旧、高木质化植物残体。分布为旧世界热带—亚热带：非洲种类最丰富，东洋界次之（中国南方多特有种），马达加斯加（小白蚁属）与阿拉伯半岛（也门、沙特、阿曼）有少数代表；新热带界与澳洲界无自然分布。本亚科多筑地下巢穴或地上土垅巢，巢内菌圃腔与通道系统兼有通风、温湿度调节功能，非洲稀树草原的 *Macrotermes* 蚁冢可高达数米，是热带景观中最醒目的生态工程结构。本亚科兵蚁额腺发达、头壳内可见其贮囊，额前囟门明显，上颚为粗壮大颚型、端缘钩曲，左上颚多具一齿（以土白蚁属 *Odontotermes* 最显著，属名即由此而来）；成熟蚁后腹部因卵巢极度发育而膨大成巨型腹，以大白蚁属 *Macrotermes* 的蚁后最为庞大，栖于王室腔中专司产卵。有翅蚁与工蚁上唇后部各具一骨化横带、中段由透明膜质分隔，中肠—后肠交界处（混合节前方）具四叶，为本亚科稳定的鉴别特征。

经济上本亚科是旧世界农林业最主要的为害类群：勇猛大白蚁 *M. bellicosus* 与近明大白蚁 *M. subhyalinus* 是非洲农田、可可园与椰园的主要蚁害，大型蚁冢并妨碍机械化耕作与收割；中国南方黑翅土白蚁 *O. formosanus* 是水库、江河堤坝的主要害虫[55]，可致散浸、管涌、跌窝直至溃口，并为害茶、柑橘、桉树、甘蔗等逾百种植物，云南蔗区其与黄翅大白蚁 *M. barneyi* 共同为害甘蔗，可致显著减产[56]；印度胖身土白蚁 *O. obesus* 与奥贝斯小白蚁 *M. obesi* 为害小麦、玉米、甘蔗、茶等多种作物，可致严重减产乃至绝收[57,58]。另一方面，本亚科培养的蚁巢伞菌（鸡枞菌）是亚洲、非洲著名的食用真菌。另有 *Ancistrotermes*、*Hypotermes*、*Pseudacanthotermes*、*Allodontermes* 等属为非洲

与南亚作物害虫[10]。





Macrotermes annandalei 土垄大白蚁

刺白蚁属 *Acanthotermes*

**Acanthotermes acanthothorax* 刺胸刺白蚁（旧热带界、西非、中非、东非）

奇齿白蚁属 *Allodontermes*

Allodontermes rhodesiensis 罗得西亚奇齿白蚁（旧热带界东非、非洲南部）

*_Allodontermes schultzei_ 舒尔茨奇齿白蚁（非洲南部纳米比亚、博茨瓦纳、南非、斯威士兰、赞比亚、津巴布韦）

Allodontermes tenax 执着奇齿白蚁（旧热带界东非、非洲南部）

钩白蚁属 *Ancistrotermes*

Ancistrotermes cavithorax 凹胸钩白蚁（西非、科特迪瓦、塞内加尔、贝宁、冈比亚、喀麦隆、中非、刚果民主共和国、加纳、几内亚、尼日利亚、塞拉利昂、乌干达）

Ancistrotermes crassiceps 厚头钩白蚁（中国云南）

*_Ancistrotermes crucifer_ 十字钩白蚁（旧热带界、西非、中非）

crucifer 指名亚种

diversana 相异亚种

Ancistrotermes dimorphus 小头钩白蚁（中国云南）

Ancistrotermes dubius 可疑钩白蚁（刚果民主共和国）

Ancistrotermes equatorius 赤道钩白蚁（尼日利亚、乌干达）

Ancistrotermes ganlanbaensis 橄榄坝钩白蚁（云南（景洪 500m））

Ancistrotermes guineensis 几内亚钩白蚁（西非、科特迪瓦、贝宁、冈比亚、塞内加尔、喀麦隆、加纳、几内亚、几内亚比绍、尼日利亚）

Ancistrotermes hekouensis 河口钩白蚁（云南（河口 110m））

Ancistrotermes latinotus 宽背钩白蚁（非洲南部、马拉维、南非、赞比亚、安哥拉、中非、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、肯尼亚、莫桑比克、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达、津巴布韦）

Ancistrotermes menglianensis 孟连钩白蚁（云南（孟连 1020m））

Ancistrotermes microdens 小齿钩白蚁（东非、肯尼亚、乌干达）

Ancistrotermes pakistanicus 巴基斯坦钩白蚁（南亚、东南亚、巴基斯坦、泰国、老挝、马来西亚、孟加拉国、喀麦隆、印度、印度尼西亚、缅甸、新加坡、越南）

Ancistrotermes periphrasis 迂回钩白蚁（刚果民主共和国、埃塞俄比亚、加纳、苏丹）

Ancistrotermes wasmanni 沃斯曼钩白蚁（刚果民主共和国）

Ancistrotermes xiai 夏氏钩白蚁（云南（勐腊勐仑 600m））

左转白蚁属 *Euscaiotermes*

*_Euscaiotermes primus_ 第一左转白蚁（非洲热带、印度）

地白蚁属 *Hypotermes*

Hypotermes bawanensis 坝湾地白蚁（中国云南）

Hypotermes makhamensis 玛堪地白蚁（泰国、越南、柬埔寨）

Hypotermes manyunensis 曼允地白蚁（中国云南）

Hypotermes meiziensis 梅子地白蚁（中国云南）

Hypotermes mengdingensis 孟定地白蚁（中国云南）

*_Hypotermes obscuriceps_ 暗头地白蚁（印度、斯里兰卡、越南）

Hypotermes ruiliensis 瑞丽地白蚁（中国云南）

Hypotermes sumatrensis 暗齿地白蚁（印度尼西亚、中国）

Hypotermes wandingensis 畹町地白蚁（中国云南）

Hypotermes wayaoensis 瓦窑地白蚁（中国云南）

Hypotermes winifredi 威尼弗雷德地白蚁（斯里兰卡）

Hypotermes xenotermitis 氙地白蚁（印度、巴基斯坦、孟加拉国、不丹、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、泰国）
Hypotermes yingjiangensis 盈江地白蚁（中国云南）

大白蚁属 *Macrotermes*

Macrotermes acrocephalus 隆头大白蚁（中国云南、瑞丽）
Macrotermes ahmadi 阿哈默德大白蚁（东南亚、马来半岛、印度尼西亚苏门答腊、马来西亚）
Macrotermes aleemi 阿利姆大白蚁（南亚、印度、孟加拉国）
Macrotermes amplus 体大大白蚁（中非、刚果共和国、刚果民主共和国、喀麦隆、中非共和国、安哥拉、加蓬、尼日利亚、苏丹）
Macrotermes annandalei 土垄大白蚁（东南亚、东亚、泰国、越南、柬埔寨、老挝、中国、印度、缅甸）
Macrotermes barneyi 黄翅大白蚁（东亚、中国、中国香港、中国澳门、越南）
Macrotermes beaufortensis 保佛大白蚁（东南亚、新加坡、马来西亚）
Macrotermes bellicosus 勇猛大白蚁（旧热带界、科特迪瓦、塞内加尔、多哥、贝宁、加纳、安哥拉、喀麦隆、中非共和国、刚果、刚果民主共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、几内亚、几内亚比绍、肯尼亚、利比里亚、马拉维、毛里塔尼亚、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞拉利昂、索马里、苏丹、坦桑尼亚、乌干达、也门）
Macrotermes carbonarius 炭色大白蚁（东南亚、东亚、新加坡、马来西亚、泰国、柬埔寨、印度尼西亚、越南）
Macrotermes chaiglomi 蔡格洛姆大白蚁（东南亚、东亚、中国、泰国）
Macrotermes chebalingensis 车八岭大白蚁（中国广东、始兴车八岭）
Macrotermes choui 周氏大白蚁（中国云南、盈江）
Macrotermes constrictus 缢颏大白蚁（中国四川、德昌）
Macrotermes convulsionarius 震撼大白蚁（南亚、印度、斯里兰卡）
Macrotermes declivatus 箕头大白蚁（中国云南、景谷）
Macrotermes denticulatus 细齿大白蚁（中国云南、小勐仑、海南、兴隆、广西、凭祥）
Macrotermes falciger 镰刀大白蚁（旧热带界、西非、东非、非洲南部、贝宁、中非共和国、刚果民主共和国、加纳、几内亚、肯尼亚、马拉维、莫桑比克、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚、津巴布韦）
Macrotermes gilvus 暗黄大白蚁（旧热带界、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、东帝汶、缅甸、越南）
Macrotermes gratus 可爱大白蚁（西非、多哥）
Macrotermes guangxiensis 广西大白蚁（中国广西、南宁）
Macrotermes hainanensis 海南大白蚁（中国海南）
Macrotermes herus 优势大白蚁（旧热带界、西非、东非、埃塞俄比亚、几内亚、肯尼亚、尼日利亚、索马里、苏丹、坦桑尼亚）
Macrotermes hopini 和平大白蚁（缅甸、印度东北部）
Macrotermes incisus 凹缘大白蚁（中国）
Macrotermes ituriensis 伊图里大白蚁（中非、刚果民主共和国）

Macrotermes ivorensis 象牙海岸大白蚁（西非、科特迪瓦、刚果民主共和国、加蓬、几内亚、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂）
Macrotermes jinghongensis 景洪大白蚁（中国云南、景洪）
Macrotermes khajuriai 哈贾瑞大白蚁（印度东北部、不丹）
Macrotermes latignathus 宽颚大白蚁（尼泊尔、马来西亚）
**Macrotermes lilljeborgi* 利勒伯格大白蚁（中非、喀麦隆、刚果共和国、加蓬、刚果民主共和国、尼日利亚、坦桑尼亚）
Macrotermes longiceps 长头大白蚁（中国海南、吊罗山、广西）
Macrotermes longimentis 长颏大白蚁（中国广西、北海）
Macrotermes luokengensis 罗坑大白蚁（中国广东、电白）
Macrotermes maesodensis 湄索德大白蚁（东南亚、越南、泰国）
Macrotermes malaccensis 马六甲大白蚁（东南亚、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、柬埔寨、泰国、越南）
Macrotermes meidoensis 梅多大白蚁（中国西藏、墨脱）
Macrotermes menglongensis 勐龙大白蚁（中国云南、大勐龙）
Macrotermes michaelseni 米夏埃尔森大白蚁（旧热带界、东非、非洲南部、安哥拉、博茨瓦纳、喀麦隆、肯尼亚、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦）
Macrotermes natalensis 纳塔尔大白蚁（旧热带界、西非、中非、东非、非洲南部、安哥拉、博茨瓦纳、中非共和国、乍得、刚果、刚果民主共和国、厄立特里亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦、肯尼亚、利比里亚、马达加斯加、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、塞内加尔、南非、苏丹、坦桑尼亚、多哥、乌干达、赞比亚、津巴布韦）
Macrotermes niger 黑色大白蚁（中非、喀麦隆）
Macrotermes nobilis 闻名大白蚁（中非、喀麦隆、刚果、刚果民主共和国、加蓬）
Macrotermes orthognathus 直颚大白蚁（中国贵州、兴义）
Macrotermes peritrimorphus 近三型大白蚁（中国广西、贺县滑水冲）
Macrotermes planicapitatus 平头大白蚁（中国香港）
Macrotermes probeaufortensis 似保佛大白蚁（马来西亚）
Macrotermes renouxi 勒努大白蚁（喀麦隆、刚果）
Macrotermes serrulatus 细锯齿大白蚁（东南亚、缅甸、孟加拉国、印度）
Macrotermes singaporensis 新加坡大白蚁（新加坡）
Macrotermes subhyalinus 近明大白蚁（旧热带界、肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、塞内加尔、科特迪瓦、安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布隆迪、中非共和国、乍得、刚果民主共和国、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚、马拉维、马里、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、阿曼、卢旺达、沙特阿拉伯、塞拉利昂、索马里、苏丹、多哥、乌干达、也门、赞比亚、津巴布韦）
Macrotermes trapezoides 梯头大白蚁（中国海南、崖县）
Macrotermes trimorphus 三型大白蚁（中国广西、龙州）
Macrotermes ukuzii 乌库兹大白蚁（非洲南部、津巴布韦、南非、斯威士兰、坦桑尼亚）
Macrotermes vikaspurensis 维卡斯布尔大白蚁（印度）
Macrotermes vitrialatus 明翼大白蚁（旧热带界、中非、东非、非洲南部、安哥拉、刚果、刚果民主共和国、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、南非、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦）

Macrotermes yunnanensis 云南大白蚁（中国云南、景洪大勐龙）
Macrotermes zhejiangensis 浙江大白蚁（中国浙江、衢州）
Macrotermes zhui 朱氏大白蚁（中国广西）

大前白蚁属 *Megaprotermes*

**Megaprotermes giffardii* 吉法德大前白蚁（科特迪瓦、中非共和国、刚果民主共和国、冈比亚、加纳、尼日利亚、塞内加尔）

小白蚁属 *Microtermes*

Microtermes aethiopicus 埃塞俄比亚小白蚁（埃塞俄比亚）
Microtermes albinotus 白背小白蚁（分布待核）
Microtermes albopartitus 部白小白蚁（非洲南部、南非、喀麦隆、刚果民主共和国、马拉维、坦桑尼亚）
Microtermes alluaudanus 阿留奥德小白蚁（喀麦隆、肯尼亚、马拉维、坦桑尼亚）
Microtermes aluco 林鸮小白蚁（西非、尼日利亚、喀麦隆、刚果民主共和国、苏丹）
Microtermes baginei 巴吉勒小白蚁（肯尼亚）
Microtermes bharatpurensis 珀勒德布尔小白蚁（南亚、印度拉贾斯坦）
Microtermes bouvieri 布维尔小白蚁（刚果民主共和国）
Microtermes calvus 无毛小白蚁（中非、刚果民主共和国）
Microtermes cherberensis 谢尔贝小白蚁（肯尼亚）
Microtermes chomaensis 乔马小白蚁（赞比亚）
Microtermes congoensis 刚果小白蚁（中非、尼日利亚、喀麦隆、刚果民主共和国、安哥拉）
comprehensa 捕获亚种
congoensis 指名亚种
Microtermes darlingtonae 达林顿小白蚁（肯尼亚）
Microtermes depauperata 矮小小白蚁（喀麦隆）
Microtermes divellens 撕裂小白蚁（马达加斯加）
Microtermes dubius 疑问小白蚁（非洲南部、南非）
Microtermes edwini 埃德温小白蚁（肯尼亚）
Microtermes etiolatus 苍白小白蚁（莫桑比克、南非、赞比亚）
Microtermes feae 菲氏小白蚁（西非、几内亚比绍及几内亚湾岛屿、喀麦隆、赤道几内亚）
Microtermes grassei 格拉塞小白蚁（西非、多哥、冈比亚）
Microtermes havilandi 哈维兰小白蚁（非洲南部、南非）
Microtermes hollandei 霍兰德小白蚁（西非、塞内加尔）
Microtermes imphalensis 英帕尔小白蚁（南亚、印度曼尼普尔）
Microtermes incertoides 似可疑小白蚁（南亚、印度）
**Microtermes incertus* 可疑小白蚁（非洲南部、南非）
Microtermes insperatus 未料小白蚁（东南亚、印度尼西亚）
Microtermes jacobsoni 雅各布森小白蚁（东南亚、印度尼西亚）
Microtermes kairoonae 凯罗娜小白蚁（肯尼亚）
Microtermes kasaiensis 开赛小白蚁（中非、刚果民主共和国、肯尼亚、马拉维、乌干达）
Microtermes kauderni 考登小白蚁（马达加斯加）

Microtermes lepidus 可爱小白蚁（西非、塞内加尔、布基纳法索、冈比亚、马里）
Microtermes logani 洛根小白蚁（马拉维）
Microtermes lokoriensis 洛科里小白蚁（肯尼亚）
Microtermes lounsburyi 劳恩斯伯里小白蚁（非洲南部、南非、马拉维）
Microtermes luteus 橘黄小白蚁（肯尼亚、马拉维、坦桑尼亚、赞比亚）
Microtermes macronotus 大背小白蚁（斯里兰卡）
Microtermes magnocellus 大单眼小白蚁（埃塞俄比亚、马拉维、坦桑尼亚、赞比亚）
Microtermes magnoculus 大眼小白蚁（索马里）
Microtermes mangzhuangensis 曼庄小白蚁（中国云南、勐腊）
Microtermes mariae 玛丽亚小白蚁（肯尼亚）
Microtermes menglunensis 勐仑小白蚁（中国云南、勐仑）
Microtermes mengpengensis 勐捧小白蚁（中国云南、勐捧）
Microtermes microthorax 小胸小白蚁（(country unknown)）
Microtermes mokeetsei 莫凯特兹小白蚁（南非）
Microtermes mulii 穆利小白蚁（肯尼亚）
Microtermes mycophagus 食菌小白蚁（南亚、印度、巴基斯坦、伊朗）
Microtermes najdensis 内志小白蚁（阿拉伯半岛、沙特阿拉伯、也门、苏丹）
Microtermes neghelliensis 内格豪尔小白蚁（埃塞俄比亚）
Microtermes obesi 奥贝斯小白蚁（南亚、东南亚、印度、巴基斯坦、泰国、柬埔寨、伊朗）
Microtermes occidentalis 西部小白蚁（南非）
Microtermes osborni 奥斯本小白蚁（安哥拉、刚果民主共和国、埃塞俄比亚）
Microtermes pallidiventris 白腹小白蚁（刚果民主共和国）
Microtermes pamelae 帕梅拉小白蚁（赞比亚）
Microtermes problematicus 问题小白蚁（塞内加尔）
Microtermes pusillus 极小小白蚁（西非、喀麦隆）
Microtermes redenianus 雷登小白蚁（东非、坦桑尼亚、乍得、刚果民主共和国）
Microtermes sakalava 萨卡拉瓦小白蚁（马达加斯加）
Microtermes sindensis 信德小白蚁（南亚、巴基斯坦信德）
Microtermes sjostedti 舍斯泰特小白蚁（刚果民主共和国）
Microtermes somaliensis 索马里小白蚁（东非、索马里）
Microtermes subhyalinus 近明小白蚁（西非、科特迪瓦、塞内加尔、冈比亚、布基纳法索、沙特阿拉伯、也门）
Microtermes thoracalis 胸突小白蚁（西非、科特迪瓦、苏丹）
Microtermes toumodiensis 图莫迪小白蚁（西非、科特迪瓦、塞内加尔、多哥）
Microtermes tragardhi 特雷高小白蚁（旧热带界、东非、非洲南部）
Microtermes tsavoensis 察沃小白蚁（东非、肯尼亚察沃）
Microtermes unicolor 单色小白蚁（南亚、巴基斯坦、印度）
Microtermes upembae 乌彭巴小白蚁（中非、刚果民主共和国）
Microtermes vadschaggae 瓦斯查嘎小白蚁（东非、坦桑尼亚、塞内加尔）
Microtermes yemenensis 也门小白蚁（阿拉伯半岛、也门、沙特阿拉伯）

土白蚁属 *Odontotermes*

Odontotermes acutidens 尖齿土白蚁（西非科特迪瓦、加纳、几内亚）
Odontotermes adampurensis 阿达姆普尔土白蚁（南亚印度、孟加拉国）
Odontotermes agilis 快捷土白蚁（西非利比里亚）
Odontotermes akengeensis 阿肯土白蚁（中非刚果民主共和国）
Odontotermes amanicus 阿马尼（东非坦桑尼亚、肯尼亚、桑给巴尔）
Odontotermes amaniensis 阿马尼（东非肯尼亚、坦桑尼亚）
Odontotermes anamallensis 安纳马赖土白蚁（南亚印度）
Odontotermes anceps 裂头土白蚁（东非肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚）
Odontotermes angustatus 细窄土白蚁（非洲南部南非）
Odontotermes angustignathus 细颚土白蚁（东南亚越南、中国）
Odontotermes angustipennis 窄翅土白蚁（旧热带界中非、东非、刚果民主共和国）
Odontotermes annulicornis 环角土白蚁（中国云南）
Odontotermes apollo 阿波罗土白蚁（东非肯尼亚、坦桑尼亚）
Odontotermes aquaticus 河边土白蚁（中非喀麦隆、多哥）
Odontotermes assmuthi 阿斯穆斯土白蚁（南亚印度、巴基斯坦、孟加拉国）
Odontotermes aurora 黎明土白蚁（东非坦桑尼亚桑给巴尔）
Odontotermes badius 栗色土白蚁（旧热带界西非、东非、非洲南部）
badius 指名亚种
littoralis 海滨亚种
Odontotermes bellahunisensis 贝拉胡尼斯土白蚁（南亚印度）
Odontotermes bequaerti 贝奎特土白蚁（旧热带界西非、中非、刚果民主共和国、加纳）
Odontotermes bhagwatii 巴格瓦蒂土白蚁（南亚印度）
Odontotermes billitoni 利顿土白蚁（东南亚印度尼西亚、马来西亚）
Odontotermes boetonensis 博顿土白蚁（东南亚印度尼西亚）
Odontotermes bogoriensis 茂物土白蚁（东南亚印度尼西亚）
Odontotermes bomaensis 博马土白蚁（刚果民主共和国）
Odontotermes boranicus 博拉娜土白蚁（东非肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚）
Odontotermes bottegoanus 博泰戈土白蚁（东非埃塞俄比亚）
Odontotermes boveni 博韦土白蚁（南亚印度、尼泊尔）
Odontotermes brunneus 棕色土白蚁（南亚印度、未注明）
Odontotermes buchholzi 巴克霍尔兹土白蚁（中非加蓬、喀麦隆、刚果民主共和国、赤道几内亚、利比里亚）
Odontotermes butteli 巴特土白蚁（东南亚马来西亚、印度尼西亚）
Odontotermes caffrariae 卡夫拉尼亚土白蚁（非洲南部南非、坦桑尼亚）
Odontotermes capensis 好望角土白蚁（旧热带界西非、非洲南部、南非）
Odontotermes celebensis 西里伯斯土白蚁（东南亚印度尼西亚）
Odontotermes ceylonicus 锡兰土白蚁（南亚斯里兰卡、印度）
Odontotermes chicapanensis 希卡帕土白蚁（非洲南部安哥拉）
Odontotermes classicus 无产土白蚁（东非厄立特里亚、埃塞俄比亚、索马里、苏丹）

Odontotermes conignathus 锥颚土白蚁（中国云南）
Odontotermes culturarum 栽培土白蚁（旧热带界西非、东非、刚果民主共和国、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达）
Odontotermes denticulatus 齿小土白蚁（印度尼西亚、马来西亚、新加坡）
Odontotermes diana 黛安娜土白蚁（刚果民主共和国）
Odontotermes dimorphus 双工土白蚁（广西（贺县滑水冲自然保护区）、中国）
Odontotermes distans 遥远土白蚁（印度、尼泊尔）
Odontotermes dives 多产土白蚁（东南亚印度尼西亚、菲律宾、马来西亚）
Odontotermes djampeensis 达扎丕土白蚁（东南亚印度尼西亚、泰国）
Odontotermes ebeni 埃本土白蚁（东非埃塞俄比亚、索马里）
Odontotermes egregius 卓越土白蚁（东非肯尼亚）
Odontotermes elgonensis 埃尔贡土白蚁（东非肯尼亚）
Odontotermes erodens 缺齿土白蚁（分布待核）
Odontotermes erraticus 游荡土白蚁（西非塞内加尔、多哥、冈比亚、尼日尔）
Odontotermes escherichi 埃舍里希土白蚁（南亚、东南亚、东亚印度、斯里兰卡、马来西亚、中国）
Odontotermes fallax 欺诈土白蚁（东非坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚）
Odontotermes feae 菲氏土白蚁（南亚、东南亚印度、泰国、越南、孟加拉国、不丹、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡）
Odontotermes feaeoides 似菲氏土白蚁（印度）
Odontotermes fidens 纤齿土白蚁（喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬、加纳、尼日利亚）
Odontotermes flammifrons 红额土白蚁（西非布基纳法索、刚果民主共和国、马拉维、苏丹、赞比亚）
Odontotermes fockianus 福克土白蚁（纳米比亚）
Odontotermes fontanellus 小囟土白蚁（江苏（镇江）、安徽、云南、中国）
Odontotermes formosanus 黑翅土白蚁（旧热带界中国台湾、中国、中国澳门、中国香港、日本、缅甸、泰国、越南）
Odontotermes foveafrons 凹额土白蚁（云南（大勐龙、橄榄坝、思茅）、中国）
Odontotermes fulleri 富勒土白蚁（东非肯尼亚、中非共和国、刚果民主共和国、乌干达）
Odontotermes fuyangensis 富阳土白蚁（中国浙江）
Odontotermes ganpati 加帕蒂土白蚁（印度）
Odontotermes garambae 加兰巴土白蚁（西非布基纳法索、刚果民主共和国）
Odontotermes giriensis 吉里土白蚁（南亚、东亚中国、印度、孟加拉国、不丹）
Odontotermes girnarensis 吉尔纳尔土白蚁（南亚印度古吉拉特）
Odontotermes globicola 栖球土白蚁（南亚印度、巴基斯坦、斯里兰卡）
Odontotermes grandiceps 大头土白蚁（东南亚印度尼西亚、马来西亚）
Odontotermes grassei 格拉塞土白蚁（科特迪瓦）
Odontotermes gravelyi 粗颚土白蚁（中国云南、缅甸、越南）
Odontotermes guizhouensis 贵州土白蚁（中国贵州）
Odontotermes guptai 古普塔土白蚁（南亚巴基斯坦、印度、孟加拉国）

Odontotermes gurdaspurensis 古达斯普尔土白蚁（南亚印度、巴基斯坦）
Odontotermes hageni 哈根土白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Odontotermes hainanensis 海南土白蚁（南亚、东南亚、东亚中国、越南、马来西亚、泰国、柬埔寨、印度、缅甸）
Odontotermes horai 霍拉土白蚁（南亚印度、巴基斯坦、尼泊尔）
Odontotermes horni 霍恩土白蚁（旧热带界印度、斯里兰卡、尼日利亚、不丹、柬埔寨、越南）
Odontotermes incisus 刃穴土白蚁（印度尼西亚）
Odontotermes indrapurensis 因德拉普拉土白蚁（印度尼西亚）
Odontotermes interveniens 中间土白蚁（非洲南部纳米比亚、安哥拉）
Odontotermes iratus 愤怒土白蚁（加蓬）
Odontotermes javanicus 爪哇土白蚁（东南亚、东亚马来西亚、印度尼西亚、泰国、中国）
javanicus 指名亚种
nymanni 尼曼亚种
Odontotermes kapuri 卡普尔土白蚁（南亚印度、不丹）
Odontotermes karawajevi 卡拉瓦土白蚁（印度尼西亚）
Odontotermes karnyi 卡尼土白蚁（东南亚印度尼西亚）
Odontotermes kepongensis 甲洞土白蚁（马来西亚）
Odontotermes kibarensis 基巴拉土白蚁（东非肯尼亚、安哥拉、苏丹、坦桑尼亚、乌干达）
Odontotermes kistneri 基斯特纳土白蚁（马来西亚）
Odontotermes koenigi 柯尼希土白蚁（斯里兰卡）
Odontotermes kulkarni 库尔坎土白蚁（印度）
Odontotermes lacustris 湖泊土白蚁（旧热带界东非、非洲南部、马拉维、赞比亚）
Odontotermes latericius 似砖土白蚁（旧热带界西非、东非、非洲南部）
latericius 指名亚种
media 中间亚种
Odontotermes latialatus 宽翅土白蚁（中非刚果民主共和国）
Odontotermes latigula 宽颏土白蚁（南亚印度）
Odontotermes latiguloides 拟宽喉土白蚁（印度）
Odontotermes latissimus 极宽土白蚁（东南亚印度尼西亚）
Odontotermes lautus 雅致土白蚁（南非）
Odontotermes lobintactus 叶蛩土白蚁（刚果民主共和国）
Odontotermes longignathus 长颚土白蚁（南亚、东南亚、新热带界中南美洲印度、孟加拉国、马来西亚、泰国）
Odontotermes longigula 长喉土白蚁（西非塞内加尔）
Odontotermes longzhouensis 龙州土白蚁（广西（上林）、中国）
Odontotermes luoyangensis 洛阳土白蚁（中国河南）
Odontotermes maesodensis 湄索德土白蚁（泰国、越南）
Odontotermes magdalenae 马格达莱纳土白蚁（西非尼日利亚、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、几内亚、苏丹）
Odontotermes makassarensis 望加锡土白蚁（东南亚印度尼西亚）
Odontotermes malabaricus 马拉巴尔土白蚁（印度）

Odontotermes malaccensis 马六甲土白蚁（东南亚马来西亚）
Odontotermes maledictus 可恨土白蚁（埃塞俄比亚）
Odontotermes malelaensis 马雷拉土白蚁（中非刚果民主共和国）
Odontotermes maliki 马利克土白蚁（孟加拉国）
Odontotermes matangensis 马登土白蚁（马来西亚）
Odontotermes maximus 最大土白蚁（东南亚印度尼西亚）
Odontotermes mediocris 温和土白蚁（东非肯尼亚、埃塞俄比亚、马拉维、坦桑尼亚）
Odontotermes menadoensis 万鸦东土白蚁（印度尼西亚）
Odontotermes meridionalis 南方土白蚁（中国）
Odontotermes microdentatus 小齿土白蚁（南亚印度）
Odontotermes microps 小眼土白蚁（东非坦桑尼亚）
Odontotermes minutus 小土白蚁（东亚中国、印度尼西亚、马来西亚）
Odontotermes mirganjensis 米尔甘杰土白蚁（孟加拉国、印度）
Odontotermes mohandi 莫汉德土白蚁（印度）
Odontotermes monodon 单齿土白蚁（肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、马拉维、莫桑比克、南非、刚果民主共和国）
lujanus 卢扬亚种
monodon 指名亚种
Odontotermes montanus 高山土白蚁（东非肯尼亚、埃塞俄比亚）
Odontotermes mukimbunginis 穆金本古土白蚁（旧热带界西非、中非、刚果民主共和国）
Odontotermes neodenticulatus 新齿小土白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Odontotermes nilensis 尼罗土白蚁（西非塞内加尔、刚果民主共和国、苏丹）
Odontotermes nolaensis 诺拉土白蚁（东非肯尼亚、安哥拉、喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果民主共和国、塞内加尔、乌干达）
Odontotermes obesus 胖身土白蚁（南亚印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国、不丹、中国、缅甸）
Odontotermes oblongatus 矩形土白蚁（东南亚马来西亚、泰国、印度、印度尼西亚、新加坡）
Odontotermes okahandjae 奥卡汉贾土白蚁（非洲南部纳米比亚）
Odontotermes ostentans 显形土白蚁（圣多美和普林西比）
Odontotermes palmquisti 帕姆奎斯特土白蚁（东非坦桑尼亚、肯尼亚、马拉维）
Odontotermes paradenticulatus 似齿小土白蚁（菲律宾）
Odontotermes paralatigula 近宽颏土白蚁（南亚印度、缅甸）
Odontotermes paralatiguloides 近似宽颏土白蚁（印度）
Odontotermes parallelus 平行土白蚁（广东（大埔）、海南（五指山）、中国）
Odontotermes paraoblongatus 似矩形土白蚁（东南亚马来西亚、泰国）
Odontotermes parvidens 微齿土白蚁（南亚印度、巴基斯坦、孟加拉国、不丹、缅甸）
Odontotermes patruus 伯伯土白蚁（中非刚果民主共和国、肯尼亚、卢旺达、乌干达）
Odontotermes pauperans 小贫土白蚁（西非科特迪瓦、塞内加尔、尼日利亚、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍）
Odontotermes peshawarensis 白沙瓦土白蚁（巴基斯坦）
Odontotermes planiceps 扁头土白蚁（安哥拉、刚果民主共和国）

Odontotermes praevalens 首要土白蚁（马来西亚）
Odontotermes preliminaris 初始土白蚁（南亚斯里兰卡）
Odontotermes pretoriensis 比勒陀利亚土白蚁（非洲南部南非）
Odontotermes prewensis 普鲁士土白蚁（泰国）
Odontotermes prodives 似多产土白蚁（马来西亚、泰国）
Odontotermes profeae 前菲氏土白蚁（南亚印度、巴基斯坦、孟加拉国）
Odontotermes proformosanus 原黑翅土白蚁（东南亚柬埔寨、越南、孟加拉国、印度、泰国）
Odontotermes prolatigula 前宽颏土白蚁（印度）
Odontotermes proximus 最新土白蚁（马来西亚）
Odontotermes pujiangensis 浦江土白蚁（中国浙江）
Odontotermes pyriceps 梨头土白蚁（海南（海口琼海）、中国）
Odontotermes quinquedentatus 五齿土白蚁（贵州（兴义）、中国）
Odontotermes ramulosus 支脉土白蚁（东非坦桑尼亚）
Odontotermes rectanguloides 似直角土白蚁（安哥拉、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、科特迪瓦、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达）
Odontotermes redemanni 雷德曼土白蚁（南亚印度、斯里兰卡、孟加拉国）
Odontotermes rehobothensis 雷霍博特土白蚁（纳米比亚）
Odontotermes robustus 粗壮土白蚁（刚果）
Odontotermes rothschildianus 罗思柴尔德土白蚁（埃塞俄比亚）
Odontotermes salebrifrons 糙额土白蚁（中非刚果民主共和国、东非乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚、索马里）
Odontotermes sarawakensis 砂拉越土白蚁（东南亚马来西亚、印度尼西亚、泰国）
Odontotermes sasangirensis 萨桑吉尔土白蚁（印度）
Odontotermes schmitzi 施米茨土白蚁（西非贝宁、刚果民主共和国、苏丹）
Odontotermes scrutor 探索土白蚁（刚果民主共和国）
Odontotermes sellathorax 鞍胸土白蚁（四川（璧山）、中国）
Odontotermes shixingensis 始兴土白蚁（中国广东）
Odontotermes sikkimensis 锡金土白蚁（印度）
Odontotermes silamensis 锡拉姆土白蚁（马来西亚）
Odontotermes silvaticus 森林土白蚁（西非布基纳法索、喀麦隆）
Odontotermes silvestrii 西尔韦斯特里土白蚁（刚果民主共和国）
Odontotermes simalurensis 锡马卢土白蚁（印度尼西亚）
Odontotermes simplicidens 简齿土白蚁（中非喀麦隆、加蓬）
Odontotermes sinabangensis 锡纳邦土白蚁（印度尼西亚）
Odontotermes singsiti 辛格斯特土白蚁（印度）
Odontotermes sjostedti 舍斯泰特土白蚁（中非刚果民主共和国）
evansi 埃文斯亚种
sjostedti 指名亚种
Odontotermes smeathmani 斯米瑟曼土白蚁（旧热带界西非、东非、刚果民主共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、科特迪瓦、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂、南非、苏丹）

Odontotermes snyderi 斯奈德土白蚁（刚果民主共和国）
Odontotermes somaliensis 索马里土白蚁（东非索马里、埃塞俄比亚）
Odontotermes stanleyvillensis 斯坦利维尔土白蚁（刚果民主共和国）
Odontotermes stercorivorus 食粪土白蚁（东非肯尼亚、坦桑尼亚）
Odontotermes sudanensis 苏丹土白蚁（旧热带界西非、东非、加纳、几内亚、科特迪瓦、尼日利亚、塞内加尔、苏丹）
Odontotermes takensis 来兴土白蚁（东南亚泰国）
Odontotermes tanganicus 坦噶土白蚁（旧热带界东非、非洲南部、肯尼亚、马拉维、坦桑尼亚）
Odontotermes taprobanes 塔普拉班土白蚁（南亚斯里兰卡）
Odontotermes terricola 地栖土白蚁（中非喀麦隆、东非坦桑尼亚、刚果民主共和国、加蓬）
Odontotermes tragardhi 特雷高土白蚁（非洲南部南非）
Odontotermes transvaalensis 德兰士瓦土白蚁（非洲南部南非、博茨瓦纳、埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、津巴布韦）
Odontotermes vaishno 瓦伊什诺土白蚁（南亚印度）
**Odontotermes vulgaris* 常见土白蚁（旧热带界西非、东非、非洲南部、安哥拉、纳米比亚、南非、斯威士兰、津巴布韦）
Odontotermes wallonensis 瓦隆土白蚁（南亚印度）
Odontotermes wuzhishanensis 五指山土白蚁（中国海南）
Odontotermes yadevi 亚德维土白蚁（南亚印度）
Odontotermes yaoi 姚氏土白蚁（中国福建）
Odontotermes yarangensis 亚让土白蚁（西藏（墨脱亚让 1000m）、中国）
Odontotermes yunnanensis 云南土白蚁（中国云南、越南）
Odontotermes zambesiensis 赞比西土白蚁（东非肯尼亚、马拉维、莫桑比克、坦桑尼亚）
Odontotermes ziyangensis 资阳土白蚁（中国陕西）
Odontotermes zulunatalensis 祖鲁纳塔尔土白蚁（非洲南部南非）
Odontotermes zunyiensis 遵义土白蚁（中国贵州）

前白蚁属 *Protermes*

Protermes hirticeps 毛头前白蚁（东非、乌干达、刚果、刚果民主共和国、尼日利亚）
Protermes minimus 最小前白蚁（安哥拉、刚果民主共和国、几内亚、尼日利亚、赞比亚）
Protermes minutus 小前白蚁（西非、科特迪瓦、安哥拉、刚果民主共和国、加蓬、加纳、几内亚、尼日利亚、塞拉利昂、赞比亚）
Protermes mwekerae 穆维盖拉前白蚁（安哥拉、赞比亚）
**Protermes prorepens* 前匍前白蚁（安哥拉、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、加蓬、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚、塞拉利昂）

伪刺白蚁属 *Pseudacanthotermes*

Pseudacanthotermes curticeps 短头伪刺白蚁（刚果民主共和国）
Pseudacanthotermes grandiceps 大头伪刺白蚁（肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达）
Pseudacanthotermes harrisensis 哈里斯伪刺白蚁（苏丹）
**Pseudacanthotermes militaris* 好斗伪刺白蚁（旧热带界、西非、中非、东非、非洲南部）
laticeps 宽头亚种

militaris 指名亚种

Pseudacanthotermes piceus 柏油伪刺白蚁（乌干达、津巴布韦）

Pseudacanthotermes spiniger 具刺伪刺白蚁（旧热带界、西非、中非、东非、非洲南部、安哥拉、喀麦隆、中非共和国、刚果、刚果民主共和国、加蓬、加纳、几内亚、科特迪瓦、肯尼亚、尼日利亚、苏丹、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚）

聚刺白蚁属 *Synacanthotermes*

**Synacanthotermes heterodon* 异齿聚刺白蚁（中非、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国）

Synacanthotermes trilobatus 三裂聚刺白蚁（安哥拉、刚果民主共和国、马拉维、赞比亚）

Synacanthotermes zanzibarensis 桑给巴尔聚刺白蚁（东非、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、肯尼亚）

锯白蚁亚科 Microcerotermitinae

锯白蚁亚科由 Holmgren 于 1910 年建立（*Microcerotermitinae* Holmgren, 1910）[14]，模式属为锯白蚁属 *Microcerotermes* Silvestri, 1901；亚科名源自模式属（希腊语 *mikros*，小，*cero*，角）。它与聚白蚁亚科关系密切，但不能完全确定为姊妹群。本名录收录 2 属 150 种。

本亚科为泛热带分布，广布东洋界、非洲热带与澳洲界等各大区系，倒钩白蚁属主要见于新热带界南锥体。食性属木食—草食广谱类群，多在土壤—木材界面取食朽木与枯草；兵蚁头狭长、额部无突起，上颚为穿刺—劈砍型；兵蚁额前部具一小点状或细缝状囟门；上颚短粗、端缘内弯成钩，左上颚具一小齿、右上颚几无齿，触角 13–14 节，胫距式 2:2:2；工蚁单型。巢多为地下或地表小巢，一般不筑大型显著垄巢。[3]

经济上本亚科含若干重要害虫：不同锯白蚁 *M. diversus* 是伊朗[59]（胡齐斯坦省）、伊拉克、阿曼最具破坏性的建筑木材害虫，并是伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯海枣（*Phoenix dactylifera*）的主要害虫；南美的斯特伦基锯白蚁 *M. strunckii* 为果树林次要害虫[60]，树栖锯白蚁 *M. arboreus* 为百香果次要害虫。



Microcerotermes subtilis 瘦长锯白蚁（https://www.inaturalist.org/observations/231264472）

锯白蚁属 *Microcerotermes*

Microcerotermes acerbus 粗鲁锯白蚁（塞拉利昂）

Microcerotermes algoasinensis 阿尔哥亚湾锯白蚁（非洲南部、南非）
Microcerotermes amboinensis 安汶锯白蚁（东南亚、印度尼西亚）
Microcerotermes annandalei 安嫩代尔锯白蚁（东南亚、泰国、印度、马来西亚、缅甸）
Microcerotermes apricitatis 阳光锯白蚁（非洲南部、南非）
Microcerotermes arboreus 树栖锯白蚁（新热带界、巴拿马、哥伦比亚、巴西、法属圭亚那、玻利维亚、开曼群岛、圭亚那、海地、洪都拉斯、尼加拉瓜、秘鲁、波多黎各、苏里南、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）
Microcerotermes baluchistanicus 俾路支锯白蚁（南亚、巴基斯坦、印度）
Microcerotermes barbertoni 巴伯顿锯白蚁（非洲南部、南非）
Microcerotermes beesoni 比森锯白蚁（南亚、印度、孟加拉国、不丹、巴基斯坦）
Microcerotermes bequaertianus 贝奎特锯白蚁（刚果民主共和国、科特迪瓦）
Microcerotermes biroi 比罗锯白蚁（南亚、大洋洲、澳大利亚、巴布亚新几内亚、印度、印度尼西亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加）
Microcerotermes biswanathae 比斯瓦那塔锯白蚁（南亚、印度）
Microcerotermes boreus 北部锯白蚁（大洋洲、澳大利亚）
Microcerotermes bouilloni 布永锯白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Microcerotermes bouvieri 布维尔锯白蚁（新热带界、巴西、哥伦比亚、墨西哥）
Microcerotermes brachygnathus 短颚锯白蚁（旧热带界、布基纳法索、印度尼西亚、几内亚、南非、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦）
Microcerotermes brevior 狭小锯白蚁（巴布亚新几内亚）
Microcerotermes buettikeri 比特铁克锯白蚁（中东、沙特阿拉伯、伊朗、也门）
Microcerotermes bugnioni 布格尼恩锯白蚁（南亚、斯里兰卡）
Microcerotermes cachani 卡占锯白蚁（马达加斯加）
Microcerotermes cameroni 卡梅伦锯白蚁（南亚、印度、马来西亚）
Microcerotermes cavus 凿洞锯白蚁（大洋洲、澳大利亚）
Microcerotermes celebensis 西里伯斯锯白蚁（东南亚、印度尼西亚）
Microcerotermes chaudhryi 乔德里锯白蚁（南亚、巴基斯坦、伊朗）
Microcerotermes chhotanii 乔塔里锯白蚁（伊朗）
Microcerotermes choanensis 乔安锯白蚁（旧热带界、西非、非洲南部）
Microcerotermes collinsi 柯林斯锯白蚁（南非）
Microcerotermes crassus 大锯白蚁（东南亚、菲律宾、泰国、缅甸、新加坡、孟加拉国、中国、印度、马来西亚、越南）
Microcerotermes cupreiceps 铜头锯白蚁（巴布亚新几内亚）
Microcerotermes cylindriceps 筒头锯白蚁（斯里兰卡）
Microcerotermes dammermani 达梅尔曼锯白蚁（印度尼西亚）
Microcerotermes danieli 丹尼尔锯白蚁（南亚、印度）
Microcerotermes dashlibronensis 达什利布龙锯白蚁（伊朗）
Microcerotermes debilicornis 软角锯白蚁（非洲南部、南非）
Microcerotermes depokensis 德波锯白蚁（东南亚、印度尼西亚）
Microcerotermes distans 遥远锯白蚁（东南亚、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国）

Microcerotermes distinctus 易识锯白蚁（大洋洲、澳大利亚）
Microcerotermes diversus 不同锯白蚁（中东、伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯、阿曼、科威特、也门）
Microcerotermes dolichocephalicus 长头锯白蚁（中国）
Microcerotermes dolichognathus 狭颚锯白蚁（西非、科特迪瓦、喀麦隆、刚果民主共和国、几内亚比绍、尼日利亚、圣多美和普林西比、塞拉利昂）
Microcerotermes dumasensis 杜马斯锯白蚁（印度）
Microcerotermes dumisae 杜米萨锯白蚁（南非）
Microcerotermes duplex 含糊锯白蚁（东南亚、印度尼西亚、马来西亚）
Microcerotermes durbanensis 德班锯白蚁（非洲南部、南非）
Microcerotermes edentatus 缺齿锯白蚁（西非、科特迪瓦、利比里亚、安哥拉、喀麦隆、刚果民主共和国、加纳、尼日利亚、坦桑尼亚、乌干达）
Microcerotermes elegans 苗条锯白蚁（刚果民主共和国）
Microcerotermes eugnathus 真颚锯白蚁（埃及、西奈、突尼斯）
Microcerotermes exiguus 微小锯白蚁（新热带界、哥斯达黎加、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、法属圭亚那、危地马拉、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、特立尼达和多巴哥）
Microcerotermes fletcheri 弗莱彻锯白蚁（南亚、印度）
Microcerotermes flyensis 弗莱锯白蚁（巴布亚新几内亚）
Microcerotermes fuscotibialis 棕胫锯白蚁（旧热带界、西非、中非）
fuscotibialis 指名亚种
libericus 利比里亚亚种
validior 较壮亚种
Microcerotermes gabrielis 加布里埃利斯锯白蚁（南亚、中东、阿富汗、伊朗）
Microcerotermes ganeshi 加内什锯白蚁（印度）
Microcerotermes gracilis 细瘦锯白蚁（新热带界、墨西哥、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜）
Microcerotermes greeni 格林锯白蚁（南亚、斯里兰卡）
Microcerotermes hamatus 具钩锯白蚁（非洲南部、南非、刚果民主共和国）
Microcerotermes havilandi 哈维兰锯白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Microcerotermes heimi 埃姆锯白蚁（南亚、印度、斯里兰卡、巴基斯坦）
Microcerotermes hypaenicus 海帕恩锯白蚁（南非）
Microcerotermes ilalazonatus 伊拉拉佐纳图斯锯白蚁（南非）
Microcerotermes implacidus 易动锯白蚁（大洋洲、澳大利亚）
Microcerotermes indistinctus 模糊锯白蚁（新热带界、巴西、法属圭亚那、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）
Microcerotermes insularis 岛屿锯白蚁（印度）
Microcerotermes kudremukhae 库德雷穆克锯白蚁（印度）
Microcerotermes kwazulu 夸祖鲁锯白蚁（非洲南部、南非）
Microcerotermes labioangulatus 角唇锯白蚁（印度）
labioangulatus 指名亚种
wahkdaitensis 瓦克代特亚种
Microcerotermes lahorensis 拉合尔锯白蚁（南亚、巴基斯坦、印度）

Microcerotermes lateralis 侧移锯白蚁（中非、喀麦隆、塞拉利昂）
Microcerotermes laticeps 宽头锯白蚁（非洲南部、南非）
Microcerotermes laxmi 拉克西米锯白蚁（印度）
Microcerotermes leai 莉锯白蚁（大洋洲、澳大利亚）
Microcerotermes limpopoensis 林波波锯白蚁（南非）
Microcerotermes longiceps 头长锯白蚁（马达加斯加）
Microcerotermes longignathus 长颚锯白蚁（巴基斯坦）
Microcerotermes longimalatus 长腭锯白蚁（刚果民主共和国）
Microcerotermes losbanosensis 洛斯巴尼奥斯锯白蚁（东南亚、菲律宾）
Microcerotermes luluai 卢路亚锯白蚁（巴布亚新几内亚）
Microcerotermes macacoensis 马卡古锯白蚁（刚果民主共和国）
Microcerotermes madurae 马都拉锯白蚁（东南亚、印度尼西亚）
Microcerotermes major 大型锯白蚁（马达加斯加）
Microcerotermes maliki 马利克锯白蚁（巴基斯坦）
Microcerotermes malmesburyi 马姆斯伯里锯白蚁（南非）
Microcerotermes mandibularis 具颚锯白蚁（马达加斯加）
Microcerotermes manjikuli 曼志库尔锯白蚁（泰国）
Microcerotermes marilimbus 海角锯白蚁（海南（万宁、乐东））
Microcerotermes masaiaticus 马赛亚特锯白蚁（肯尼亚、坦桑尼亚）
Microcerotermes minor 小型锯白蚁（印度、斯里兰卡）
Microcerotermes minutus 小泰锯白蚁（中国、泰国）
Microcerotermes mzilikazi 姆兹立卡兹锯白蚁（非洲南部、南非）
Microcerotermes nanulus 短小锯白蚁（贝宁、科特迪瓦）
Microcerotermes nanus 侏儒锯白蚁（大洋洲、澳大利亚）
Microcerotermes nemoralis 树林锯白蚁（坦桑尼亚、赞比亚）
Microcerotermes nervosus 强健锯白蚁（大洋洲、澳大利亚）
Microcerotermes newmani 纽曼锯白蚁（大洋洲、澳大利亚）
Microcerotermes nicobarensis 尼科巴锯白蚁（南亚、印度）
Microcerotermes novaecaledoniae 新喀里多尼亚锯白蚁（大洋洲、新喀里多尼亚）
Microcerotermes pakistanicus 巴基斯坦锯白蚁（南亚、巴基斯坦、印度、伊朗、马来西亚）
Microcerotermes palaearcticus 古北锯白蚁（阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯）
Microcerotermes palestinensis 巴勒斯坦锯白蚁（中东、以色列、印度）
Microcerotermes papuanus 巴布亚锯白蚁（东南亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚）
Microcerotermes paracelebensis 似西里伯斯锯白蚁（马来西亚、泰国）
Microcerotermes parviceps 小头锯白蚁（大洋洲、澳大利亚）
Microcerotermes parvulus 细小锯白蚁（旧热带界、西非、中非、乍得、刚果、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、加纳、几内亚、科特迪瓦、尼日利亚、塞内加尔、坦桑尼亚、阿曼、沙特阿拉伯、也门）
Microcerotermes parvus 小锯白蚁（旧热带界、刚果、科特迪瓦、塞内加尔、多哥、南非、安哥拉、喀麦隆、刚果民主共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加蓬、加纳、肯尼亚、尼日利亚、苏丹、坦桑尼亚、乌干达）

Microcerotermes pauliani 波利昂锯白蚁（马达加斯加）
Microcerotermes peraffinis 近缘锯白蚁（大洋洲、汤加、萨摩亚）
Microcerotermes periminutus 微锯白蚁（海南（琼中））
Microcerotermes philippinensis 菲律宾锯白蚁（菲律宾）
Microcerotermes piliceps 毛头锯白蚁（大洋洲、所罗门群岛、巴布亚新几内亚）
Microcerotermes pondweniensis 庞德文尼锯白蚁（南非）
Microcerotermes prochampioni 近冠锯白蚁（巴基斯坦）
Microcerotermes progrediens 行进锯白蚁（安哥拉、喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬、科特迪瓦、尼日利亚）
Microcerotermes propinquus 近邻锯白蚁（马达加斯加、留尼汪、欧罗巴岛（法国））
Microcerotermes psammophilus 喜沙锯白蚁（南非）
Microcerotermes raja 拉贾锯白蚁（南亚、印度）
Microcerotermes rambanensis 拉姆班锯白蚁（印度）
Microcerotermes remotus 天涯锯白蚁（海南（崖县、东方、乐东、陵水））
Microcerotermes repugnans 抵抗锯白蚁（大洋洲、澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Microcerotermes rhombinidus 菱巢锯白蚁（中国、广东、海南、广西）
Microcerotermes sabaeus 塞巴锯白蚁（沙特阿拉伯、也门）
Microcerotermes sabahensis 沙巴锯白蚁（马来西亚）
Microcerotermes sakarahensis 萨卡拉哈锯白蚁（马达加斯加）
Microcerotermes sakesarensis 瑟盖瑟尔锯白蚁（印度、巴基斯坦）
Microcerotermes sanctaeluciae 圣卢西亚湖锯白蚁（南非）
Microcerotermes saravanensis 萨拉万锯白蚁（伊朗）
Microcerotermes secernens 切割锯白蚁（中非、刚果民主共和国）
Microcerotermes septentrionalis 北方锯白蚁（新热带界、哥斯达黎加、墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、伯利兹、尼加拉瓜）
Microcerotermes serratus 锯锯白蚁（大洋洲、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、泰国）
Microcerotermes shahroudiensis 沙赫鲁德锯白蚁（伊朗）
Microcerotermes sikorae 西科拉锯白蚁（马达加斯加）
Microcerotermes silvestrianus 西尔韦斯特里锯白蚁（刚果民主共和国、坦桑尼亚）
Microcerotermes sistaniensis 锡斯坦锯白蚁（伊朗、锡斯坦-俾路支）
Microcerotermes solidus 坚硬锯白蚁（西非、塞内加尔、安哥拉、喀麦隆、刚果民主共和国、加纳、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦、尼日利亚）
**Microcerotermes strunckii* 斯特伦基锯白蚁（新热带界、巴西、阿根廷、巴拉圭、秘鲁、委内瑞拉）
Microcerotermes subinteger 稍全锯白蚁（马达加斯加）
Microcerotermes subtilis 瘦长锯白蚁（马达加斯加、留尼汪、科摩罗、欧罗巴岛（法国）、格洛里厄斯群岛（法国）、塞舌尔、坦桑尼亚）
Microcerotermes taylori 泰勒锯白蚁（大洋洲、澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Microcerotermes tenuignathus 细颚锯白蚁（印度、巴基斯坦）
Microcerotermes theobromae 可可锯白蚁（赤道几内亚、圣多美和普林西比）

Microcerotermes thermarum 沃姆巴德锯白蚁（南非）
Microcerotermes transiens 经过锯白蚁（西非、利比里亚、喀麦隆）
Microcerotermes turkmenicus 土库曼锯白蚁（土库曼斯坦）
Microcerotermes turneri 特纳锯白蚁（大洋洲、澳大利亚）
Microcerotermes uncatus 钩颚锯白蚁（缅甸）
Microcerotermes unidentatus 单齿锯白蚁（马达加斯加）
Microcerotermes varaminicus 瓦拉明锯白蚁（伊朗）
Microcerotermes zuluensis 祖鲁锯白蚁（旧热带界、西非、非洲南部）
zuluensis 指名亚种
rubriceps 红头亚种
Microcerotermes zuluoides 似祖鲁锯白蚁（非洲南部、南非）

倒钩白蚁属 *Onkotermes*

**Onkotermes brevicorniger* 短角倒钩白蚁（阿根廷、巴西、智利）
Onkotermes corochus 瘤额倒钩白蚁（阿根廷、巴拉圭）

瘤白蚁亚科 Mirocapritermitinae

瘤白蚁亚科由 Kemner 于 1934 年建立（*Mirocapritermitinae* Kemner, 1934），模式属为瘤白蚁属 *Mirocapritermes* Holmgren, 1914。本名录收录 14 属 133 种。

本亚科以东洋界为多样性中心，多数属限于东洋界；近扭白蚁属 *Pericapritermes* 分布最广，东洋界之外还见于非洲热带、澳洲界及古北南缘（日本、韩国）。

食性为土壤（腐殖质）食性或土壤—木材界面取食，属高等白蚁中典型的土栖有机质降解类群。防御上为典型的扭颚类群：兵蚁头矩形，上颚一般左右不对称（左上颚中部扭曲、右上颚呈刀剑状），借上颚形变时储存的弹性势能高速弹击御敌；新渡户近扭白蚁 *P. nitobei*[61] 的高速摄影研究表明其不对称扭颚的击发速度与力量均超过对称弹颚类，前扭白蚁属部分种类上颚近对称。兵蚁头背面一般无额突，囟门小而不显著，仅模式属瘤白蚁属 *Mirocapritermes* 例外，额部具突起。工蚁—有翅蚁型右上颚第二缘齿后缘凹入、臼齿区平滑或仅具弱纹；后肠马氏管两对在近端愈合成组、无马氏管结节，肠瓣由六列褶突构成，为本亚科工蚁后肠的共性鉴别特征。经济上为害记录零散：印度卡纳塔克邦油棕苗圃[62]中近扭白蚁属 *Pericapritermes* sp. 为害袋装幼苗根部，致幼苗生长受阻。



Pericapritermes nitobei 新渡户近扭白蚁（https://www.inaturalist.org/observations/319111630）

突扭白蚁属 *Dicuspiditermes*

Dicuspiditermes achankovili 阿坚柯维尔突扭白蚁（印度）

Dicuspiditermes boseae 鲍斯突扭白蚁（印度、泰米尔纳德）

Dicuspiditermes cacuminatus 尖齿突扭白蚁（马来西亚）

Dicuspiditermes cornutella 小角突扭白蚁（印度）

Dicuspiditermes fissifex 裂开突扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚、新加坡）

Dicuspiditermes fontanellus 小囟突扭白蚁（南亚、印度）

Dicuspiditermes gravelyi 格雷夫利突扭白蚁（印度）

Dicuspiditermes hutsoni 赫特森突扭白蚁（南亚、斯里兰卡）

Dicuspiditermes incola 栖息突扭白蚁（印度、斯里兰卡）

Dicuspiditermes kistneri 基斯特纳突扭白蚁（马来西亚、新加坡）

Dicuspiditermes laetus 明亮突扭白蚁（东南亚、泰国、孟加拉国、柬埔寨、中国、印度、马来西亚、缅甸、越南）

Dicuspiditermes leghugathrae 莱古加思突扭白蚁（印度）

Dicuspiditermes makhamensis 玛堪突扭白蚁（泰国）

Dicuspiditermes minutus 小突扭白蚁（文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加坡）

Dicuspiditermes nemorosus 树荫突扭白蚁（东南亚、马来西亚、印度尼西亚、新加坡）

**Dicuspiditermes obtusus* 迟钝突扭白蚁（印度）

Dicuspiditermes punjabensis 旁遮普突扭白蚁（巴基斯坦）

Dicuspiditermes rothi 罗思突扭白蚁（马来西亚）

Dicuspiditermes santschii 桑特斯基突扭白蚁（东南亚、印度尼西亚、马来西亚）

Dicuspiditermes sisiri 西西尔突扭白蚁（印度、喀拉拉）

Dicuspiditermes spinitibialis 刺胫突扭白蚁（东亚、中国、泰国）

平白蚁属 *Homallotermes*

Homallotermes eleanorae 埃莉诺平白蚁（文莱、印度尼西亚、马来西亚）

Homallotermes exiguus 微小平白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

**Homallotermes foraminifer* 具孔平白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Homallotermes pilosus 多毛平白蚁（印度）

印扭白蚁属 *Indocapritermes*

**Indocapritermes aruni* 阿伦印扭白蚁（南亚、印度）

凯姆勒白蚁属 *Kemneritermes*

**Kemneritermes sarawakensis* 砂拉越凯姆勒白蚁（婆罗洲）

克里希纳扭白蚁属 *Krishnacapritermes*

Krishnacapritermes dineshan 迪内尚克里希纳扭白蚁（印度、喀拉拉邦西高止山）

**Krishnacapritermes maitii* 迈蒂克里希纳扭白蚁（印度、西高止山）

Krishnacapritermes manikandan 马尼坎丹克里希纳扭白蚁（印度、喀拉拉邦）

Krishnacapritermes thakuri 塔库尔克里希纳扭白蚁（南亚、印度）

唇扭白蚁属 *Labiocapritermes*

**Labiocapritermes distortus* 扭曲唇扭白蚁（印度）

Labiocapritermes ghatensis 高止唇扭白蚁（印度）

瘤白蚁属 *Mirocapritermes*

Mirocapritermes concaveus 凹瘤白蚁（泰国）

**Mirocapritermes connectens* 连接瘤白蚁（东南亚、马来西亚、新加坡）

Mirocapritermes hsuchiafui 云南瘤白蚁（中国）

Mirocapritermes jiangchengensis 江城瘤白蚁（中国、云南）

Mirocapritermes latignathus 宽颚瘤白蚁（泰国、马来西亚）

Mirocapritermes prewensis 普鲁瘤白蚁（泰国）

Mirocapritermes snyderi 斯奈德瘤白蚁（孟加拉国）

Mirocapritermes valeriae 瓦莱里瘤白蚁（缅甸）

东扭白蚁属 *Oriencapritermes*

**Oriencapritermes kluangensis* 居銮东扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

近扭白蚁属 *Pericapritermes*

Pericapritermes appellans 定名近扭白蚁（西非科特迪瓦、加纳、几内亚、尼日利亚、塞拉利昂）

Pericapritermes assamensis 阿萨姆近扭白蚁（印度）

Pericapritermes beibengensis 背崩近扭白蚁（中国西藏）

Pericapritermes brachygnathus 短颚近扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Pericapritermes buitenzorgi 比特恩佐格近扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Pericapritermes ceylonicus 锡兰近扭白蚁（印度、斯里兰卡）

Pericapritermes chiasognathus 隐颚近扭白蚁（刚果共和国、安哥拉、喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬、尼日利亚）

Pericapritermes desaegeri 德埃吉近扭白蚁（刚果民主共和国）

Pericapritermes dolichocephalus 长头近扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Pericapritermes dumicola 栖丛近扭白蚁（印度尼西亚、肯尼亚、坦桑尼亚）

Pericapritermes dunensis 德拉敦近扭白蚁（印度、不丹）

Pericapritermes durga 杜尔加近扭白蚁（印度、不丹）

Pericapritermes fuscotibialis 灰胫近扭白蚁（香港。）

Pericapritermes gloveri 格洛弗近扭白蚁（坦桑尼亚、赞比亚）

Pericapritermes gutianensis 古田近扭白蚁（中国福建）

Pericapritermes hepuensis 合浦近扭白蚁（中国广西）

Pericapritermes heteronotus 异背近扭白蚁（刚果民主共和国、几内亚、尼日利亚、塞拉利昂）

Pericapritermes latignathus 多毛近扭白蚁（印度尼西亚、柬埔寨、越南、孟加拉国、中国、马来西亚、泰国）

Pericapritermes machadoi 马查多近扭白蚁（安哥拉）

Pericapritermes magnificus 非凡近扭白蚁（加蓬、喀麦隆、刚果）

Pericapritermes metatus 丈量近扭白蚁（几内亚）

Pericapritermes minimus 最小近扭白蚁（安哥拉、喀麦隆、刚果民主共和国）

Pericapritermes modiglianii 莫迪利亚尼近扭白蚁（印度尼西亚）

Pericapritermes mohri 莫尔近扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Pericapritermes nigerianus 尼日利亚近扭白蚁（科特迪瓦、喀麦隆、冈比亚、加纳、尼日利亚）

Pericapritermes nitobei 新渡户近扭白蚁（韩国、日本、中国台湾、中国、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南）
Pericapritermes paetensis 帕埃特近扭白蚁（菲律宾）
Pericapritermes pallidipes 灰足近扭白蚁（塞拉利昂、喀麦隆）
Pericapritermes papuanus 巴布亚近扭白蚁（巴布亚新几内亚）
Pericapritermes parvus 小型近扭白蚁（印度尼西亚、巴布亚新几内亚）
Pericapritermes pilosus 毛多近扭白蚁（巴布亚新几内亚）
Pericapritermes planiusculus 平扁近扭白蚁（贵州（从江）。）
Pericapritermes schultzei 舒尔茨近扭白蚁（印度尼西亚、澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Pericapritermes semarangi 三宝近扭白蚁（印度、印度尼西亚、孟加拉国、文莱、中国、马来西亚、缅甸、泰国）
Pericapritermes silvestrianus 西尔韦斯特里近扭白蚁（科特迪瓦、利比里亚）
Pericapritermes speciosus 美丽近扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Pericapritermes tetraphilus 大近扭白蚁（广东（汕头、韶关），福建（平和），云南（允景洪 500m、河口 90m、屏边、金平猛喇 370、420、450、680m、墨江 1400m、三台山、思茅、蛮允）；印度；孟加拉国；缅甸）
Pericapritermes topslipensis 托普斯利普近扭白蚁（印度）
**Pericapritermes urgens* 催促近扭白蚁（塞内加尔、冈比亚、几内亚、加纳、科特迪瓦、布基纳法索、尼日利亚、喀麦隆）
confinis 近邻亚种
urgens 指名亚种
Pericapritermes vermai 维尔马近扭白蚁（印度）
Pericapritermes wuzhishanensis 五指山近扭白蚁（中国海南）

前扭白蚁属 *Procapritermes*

Procapritermes atypus 地蛛前扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Procapritermes dakshinae 戴克夏娜前扭白蚁（印度喀拉拉）
Procapritermes holmgreni 霍姆格伦前扭白蚁（孟加拉国、印度）
Procapritermes huananensis 华南前扭白蚁（广西、云南（盈江 870 m）、海南（琼中黎母岭 350 m、五指山 700 m）、中国）
Procapritermes keralai 喀拉拉前扭白蚁（印度）
Procapritermes longignathus 长颚前扭白蚁（泰国）
Procapritermes martyni 马丁前扭白蚁（马来西亚）
Procapritermes minutus 小前扭白蚁（云南（金平猛喇 580 m）、印度尼西亚、马来西亚）
Procapritermes neosetiger 新具毛前扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Procapritermes prosetiger 似具毛前扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚、泰国）
Procapritermes sandakanensis 山打根前扭白蚁（马来西亚）
**Procapritermes setiger* 具毛前扭白蚁（马来西亚、印度尼西亚）
Procapritermes zhangfengensis 章凤前扭白蚁（云南（陇川 890 m）、中国）

伪扭白蚁属 *Pseudocapritermes*

Pseudocapritermes angustignathus 细颚伪扭白蚁（马来西亚）

Pseudocapritermes bhutanensis 不丹伪扭白蚁（不丹）
Pseudocapritermes fletcheri 弗莱彻伪扭白蚁（印度）
Pseudocapritermes jiangchengensis 江城伪扭白蚁（中国云南）
Pseudocapritermes karticki 卡蒂克伪扭白蚁（印度）
Pseudocapritermes kemneri 凯姆勒伪扭白蚁（马来西亚）
Pseudocapritermes kunjepu 昆杰普伪扭白蚁（印度、印度尼西亚）
Pseudocapritermes megacephalus 大头伪扭白蚁（巴基斯坦、马来西亚）
Pseudocapritermes minutus 小伪扭白蚁（云南（金平猛喇 580 m）、中国）
Pseudocapritermes orientalis 东方伪扭白蚁（巴基斯坦、印度、印度尼西亚、马来西亚）
Pseudocapritermes parasilvaticus 似森林伪扭白蚁（印度尼西亚、泰国）
Pseudocapritermes planimentus 平颏伪扭白蚁（云南（建水 1450 m）、中国）
Pseudocapritermes prosilvaticus 近森林伪扭白蚁（马来西亚）
Pseudocapritermes pseudolaetus 隆额伪扭白蚁（云南（金平猛喇 390 m）、中国）
**Pseudocapritermes silvaticus* 森林伪扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Pseudocapritermes sinensis 中华伪扭白蚁（中国）
Pseudocapritermes sowerbyi 圆囟伪扭白蚁（中国）
Pseudocapritermes tikadari 铁卡达伪扭白蚁（印度、不丹）

丽娜扭白蚁属 *Rinacapritermes*

Rinacapritermes abundans 丰富丽娜扭白蚁（印度）
**Rinacapritermes silvius* 林栖丽娜扭白蚁（印度）

华扭白蚁属 *Sinocapritermes*

Sinocapritermes albipennis 白翅华扭白蚁（中国、云南）
Sinocapritermes fujianensis 闽华扭白蚁（中国）
Sinocapritermes guangxiensis 桂华扭白蚁（中国）
Sinocapritermes magnus 大华扭白蚁（中国、贵州、广西、江西、重庆）
Sinocapritermes mushae 台湾华扭白蚁（中国香港、中国台湾、日本）
Sinocapritermes parvulus 小华扭白蚁（中国、海南）
Sinocapritermes planifrons 平额华扭白蚁（中国、云南）
Sinocapritermes pratensis 草地华扭白蚁（中国）
**Sinocapritermes sinensis* 中华华扭白蚁（中国、云南）
Sinocapritermes sinicus 中国华扭白蚁（中国）
Sinocapritermes songtaoensis 松桃华扭白蚁（中国、贵州）
Sinocapritermes tianmuensis 天目华扭白蚁（中国、浙江）
Sinocapritermes vicinus 川华扭白蚁（中国、四川、重庆）
Sinocapritermes xiai 夏氏华扭白蚁（中国）
Sinocapritermes xiushanensis 秀山华扭白蚁（中国、重庆）
Sinocapritermes yunnanensis 滇华扭白蚁（中国、云南）

聚扭白蚁属 *Syncapritermes*

**Syncapritermes greeni* 格林聚扭白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

象白蚁亚科 Nasutitermitinae

象白蚁亚科由 Hare 于 1937 年建立（《Termite phylogeny as evidenced by soldier mandible development》，第 462 页）[63]，模式属为象白蚁属 *Nasutitermes* Dudley, 1890；亚科名取自模式属，*Nasutitermes* 由拉丁语 nasus（鼻）与 termes 组合，指兵蚁头前端延伸成的锥状象鼻。本名录收录 81 属 608 种。

本亚科以象鼻型兵蚁（nasute soldier）为共衍征：头壳前端延伸成锥状象鼻，额腺分泌物经此喷出御敌，上颚显著退化、不再行咬啮，是本科防御方式高度特化的一支。额腺分泌物以单萜类树脂为主，经象鼻喷出后遇空气凝成胶粘物，并兼作报警信息素；其详细组成因属种而异，如薄嘴白蚁属 *Tenuirostritermes* 之 *T. tenuirostris* 分泌物含约 62% 松萜、27% 月桂烯与 11% 柠檬烯 [64]。工蚁为单一态，后唇基明显隆起；肠瓣骨化结构随属分化，象白蚁属 *Nasutitermes* 肠瓣由三对垫状褶突构成、表面覆圆形鳞片。有翅蚁具明显单眼，复眼大。食性涵盖木食、枯枝落叶食、土壤腐殖食与附生藻类等；筑巢有树栖纸质巢、地下巢与地表硬冢巢。本亚科为泛热带分布，以新热带界与旧热带界多样性最高。

经济上，本亚科是热带木结构建筑与经济林木的重要为害类群：锡兰象白蚁 *N. ceylonicus* 在斯里兰卡为害椰子树干 [65]，马唐象白蚁 *N. matangensis* 在印度尼西亚为害民居传统建筑木材。其中具角象白蚁 *Nasutitermes corniger* 天然分布于墨西哥、中美洲、南美北部及西印度群岛诸岛，引入记录载其传入巴哈马、帕劳、巴布亚新几内亚、美国；该种 2001 年在美国佛罗里达州建立美国首个非本土白蚁科野外种群 [4,66]，食谱广及农作物、果园、园林植物与建筑木材。华象白蚁属 *Sinonasutitermes* 与 *Xiaitermes* 在中国危害建筑木材 [67]，*Trinervitermes* 在非洲与印度危害牧场与桉树苗 [10,68]，*Tumulitermes* 在澳大利亚危害牧场，*Hospitalitermes monoceros* 在印度、斯里兰卡为甘蔗主要害虫 [69]。



须白蚁 *Hospitalitermes sp.*

针白蚁属 *Aciculitermes*

**Aciculitermes aciculatus* 针状针白蚁（泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡）

Aciculitermes maymyoensis 眉妙针白蚁（中国、缅甸、泰国）

非锥白蚁属 *Afrosubulitermes*

**Afrosubulitermes congoensis* 刚果非锥白蚁（刚果共和国、安哥拉、喀麦隆、刚果民主共和国、加纳、科特迪瓦、尼日利亚、乌干达）

无颚白蚁属 *Agnathotermes*

Agnathotermes crassinasus 粗鼻无颚白蚁（巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔）

**Agnathotermes glaber* 光秃无颚白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、特立尼达、玻利维亚、厄瓜多尔、特立尼达和多巴哥）

钝颚白蚁属 *Ahmaditermes*

Ahmaditermes choui 周氏钝颚白蚁（香港）

Ahmaditermes crassinasus 粗鼻钝颚白蚁（海南（兴隆））

Ahmaditermes deltocephalus 角头钝颚白蚁（福建（和溪）、海南、云南（金平猛喇 480-680m、南溪、屏边、思茅、勐海、三台山）、泰国）

Ahmaditermes dinghuensis 鼎湖钝颚白蚁（中国、越南）

Ahmaditermes dukouensis 渡口钝颚白蚁（中国四川）

Ahmaditermes emersoni 埃默森钝颚白蚁（不丹、印度）

Ahmaditermes foveafrons 凹额钝颚白蚁（浙江（天目山））

Ahmaditermes guizhouensis 贵州钝颚白蚁（中国贵州）

Ahmaditermes laticephalus 宽头钝颚白蚁（中国、越南、泰国）

Ahmaditermes lipingensis 黎平钝颚白蚁（贵州（黎平））

Ahmaditermes parafulvus 黄色钝颚白蚁（中国、越南）

Ahmaditermes perisinuosus 近丘额钝颚白蚁（广西（贺县滑水冲））

Ahmaditermes pingnanensis 屏南钝颚白蚁（浙江（龙泉）、福建（屏南 850m））

**Ahmaditermes pyricephalus* 梨头钝颚白蚁（湖南（宜章）、孟加拉国、印度）

Ahmaditermes sichuanensis 四川钝颚白蚁（中国四川）

Ahmaditermes sikkimensis 锡金钝颚白蚁（印度）

Ahmaditermes sinensis 中国钝颚白蚁（中国）

Ahmaditermes sinuosus 丘额钝颚白蚁（中国）

Ahmaditermes tianmuensis 天目钝颚白蚁（中国浙江）

Ahmaditermes tiantongensis 天童钝颚白蚁（中国浙江）

Ahmaditermes xiangyunensis 祥云钝颚白蚁（中国云南）

安瓿白蚁属 *Ampoulitermes*

**Ampoulitermes wynaadensis* 维纳德安瓿白蚁（印度）

Ampoulitermes zacharia 扎卡里亚安瓿白蚁（印度）

棱角白蚁属 *Angularitermes*

Angularitermes clypeatus 大唇棱角白蚁（巴西、法属圭亚那、厄瓜多尔）

Angularitermes coninasus 锥鼻棱角白蚁（巴西）

**Angularitermes nasutissimus* 巨鼻棱角白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、圭亚那、特立尼达和多巴哥）

Angularitermes orestes 俄瑞斯忒斯棱角白蚁（巴西）

Angularitermes pinocchio 松果棱角白蚁（巴西、秘鲁）

Angularitermes tiguassu 毛鼻棱角白蚁（巴西）

魔白蚁属 *Anhangatermes*

Anhangatermes anhanguera 魔鬼魔白蚁（巴西）

Anhangatermes eurycephalus 宽头魔白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那）

Anhangatermes juruena 茹鲁埃纳魔白蚁（巴西）

**Anhangatermes macarthuri* 麦克阿瑟魔白蚁（巴西、法属圭亚那）

Anhangatermes pilosus 多毛魔白蚁（巴西）

安的列斯白蚁属 *Antillitermes*

**Antillitermes subtilis* 细瘦安的列斯白蚁（古巴、多米尼加）

阿劳若白蚁属 *Araujotermes*

**Araujotermes caissara* 凯萨拉阿劳若白蚁（巴西、阿根廷）

Araujotermes nanus 侏儒阿劳若白蚁（巴西、哥伦比亚）

Araujotermes parvellus 长毛阿劳若白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）

Araujotermes zeteki 策特克阿劳若白蚁（哥伦比亚、巴西、巴拿马、委内瑞拉）

弧白蚁属 *Arcotermes*

**Arcotermes tubus* 管鼻弧白蚁（中国江西）

阿特拉斯白蚁属 *Atlantitermes*

**Atlantitermes guarinim* 好斗阿特拉斯白蚁（巴西）

Atlantitermes ibitiriguara 具锯阿特拉斯白蚁（巴西）

Atlantitermes kirbyi 柯比阿特拉斯白蚁（尼加拉瓜、巴拿马）

Atlantitermes oculatissimus 巨眼阿特拉斯白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、秘鲁、厄瓜多尔、圭亚那）

Atlantitermes osborni 奥斯本阿特拉斯白蚁（哥伦比亚、巴西、法属圭亚那、玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、委内瑞拉）

Atlantitermes raripilus 少毛阿特拉斯白蚁（巴西、圭亚那、秘鲁）

Atlantitermes snyderi 斯奈德阿特拉斯白蚁（巴西、法属圭亚那、特立尼达、圭亚那、秘鲁、委内瑞拉）

Atlantitermes stercophilus 喜粪阿特拉斯白蚁（巴西、秘鲁）

澳大利亚白蚁属 *Australitermes*

**Australitermes dilucidus* 清晰澳大利亚白蚁（澳大利亚）

Australitermes insignitus 易辨澳大利亚白蚁（澳大利亚）

Australitermes perlevis 极轻澳大利亚白蚁（澳大利亚）

细颈白蚁属 *Baucaliotermes*

**Baucaliotermes hainesi* 海恩斯细颈白蚁（南非、纳米比亚）

瓢白蚁属 *Bulbitermes*

Bulbitermes borneensis 婆罗瓢白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Bulbitermes brevicornis 短角瓢白蚁（菲律宾）

Bulbitermes bulbiceps 瓢头瓢白蚁（南亚、印度阿萨姆）

Bulbitermes busuangae 布桑加瓢白蚁（菲律宾）

Bulbitermes constricticeps 缩头瓢白蚁（菲律宾）
Bulbitermes constrictiformis 类紧缩瓢白蚁（东南亚、印度尼西亚苏门答腊、马来西亚）
Bulbitermes constrictoides 似紧缩瓢白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
**Bulbitermes constrictus* 紧缩瓢白蚁（东南亚、马来西亚、印度尼西亚）
Bulbitermes debadiliporum 德巴迪利普瓢白蚁（东南亚、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、越南）
Bulbitermes durianensis 榴莲岛瓢白蚁（印度尼西亚）
Bulbitermes flavicans 黄色瓢白蚁（东南亚、印度尼西亚、马来西亚）
Bulbitermes fulvus 栗色瓢白蚁（中国）
Bulbitermes gedeensis 格德瓢白蚁（印度尼西亚）
Bulbitermes germanus 常见瓢白蚁（印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国）
Bulbitermes johorensis 柔佛瓢白蚁（马来西亚）
Bulbitermes kraepelini 克雷珀林瓢白蚁（印度尼西亚、新加坡）
Bulbitermes lakshmani 拉克什曼瓢白蚁（印度尼西亚）
Bulbitermes mariveles 马里维勒瓢白蚁（菲律宾）
Bulbitermes mcgregori 麦格雷戈瓢白蚁（菲律宾）
Bulbitermes nasutus 大鼻瓢白蚁（印度尼西亚）
Bulbitermes parapusillus 似极小瓢白蚁（孟加拉国、印度、马来西亚、泰国）
Bulbitermes perpusillus 近极小瓢白蚁（马来西亚、新加坡）
Bulbitermes prabhae 普拉巴瓢白蚁（越南、缅甸、泰国）
Bulbitermes pronasutus 似大鼻瓢白蚁（马来西亚）
Bulbitermes prorosae 似罗莎瓢白蚁（印度尼西亚）
Bulbitermes pusillus 极小瓢白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Bulbitermes pyriformis 梨形瓢白蚁（孟加拉国）
Bulbitermes rosae 罗莎瓢白蚁（印度尼西亚）
Bulbitermes salakensis 萨拉山瓢白蚁（印度尼西亚）
Bulbitermes sarawakensis 砂拉越瓢白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Bulbitermes singaporiensis 新加坡瓢白蚁（东南亚、马来西亚、印度尼西亚）
Bulbitermes subulatus 似锥瓢白蚁（东南亚、印度尼西亚、马来西亚）
Bulbitermes umasumasensis 乌马斯乌马斯瓢白蚁（新加坡、马来西亚）
Bulbitermes vicinus 相似瓢白蚁（印度尼西亚）

林白蚁属 *Caetetermes*

Caetetermes fontesi 丰特斯林白蚁（南美洲、法属圭亚那）
**Caetetermes taquarussu* 塔夸拉林白蚁（南美洲、巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、厄瓜多尔、圭亚那）

加勒比白蚁属 *Caribitermes*

**Caribitermes discolor* 异色加勒比白蚁（多米尼加、波多黎各、古巴、海地、牙买加）

小锡兰白蚁属 *Ceylonitermellus*

**Ceylonitermellus hantanae* 汉塔娜小锡兰白蚁（斯里兰卡）
Ceylonitermellus kotuae 科图瓦小锡兰白蚁（斯里兰卡）

Ceylonitermellus sahyadriensis 萨亚德里小锡兰白蚁（印度）

锡兰白蚁属 *Ceylonitermes*

**Ceylonitermes escherichi* 埃舍里希锡兰白蚁（斯里兰卡）

Ceylonitermes indicola 印度锡兰白蚁（印度、印度尼西亚）

Ceylonitermes nivedita 尼韦迪塔锡兰白蚁（印度）

Ceylonitermes paulosus 保洛斯锡兰白蚁（斯里兰卡、印度）

缩狭白蚁属 *Coarctotermes*

Coarctotermes beharaensis 贝哈拉缩狭白蚁（马达加斯加）

**Coarctotermes clepsydra* 漏壶缩狭白蚁（马达加斯加）

Coarctotermes nasonovi 纳索诺夫缩狭白蚁（马达加斯加）

Coarctotermes pauliani 波利昂缩狭白蚁（马达加斯加）

凸鼻白蚁属 *Coatitermes*

**Coatitermes clevelandi* 克利夫兰凸鼻白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、巴拿马）

Coatitermes kartaboensis 卡尔塔波凸鼻白蚁（巴西、法属圭亚那、圭亚那、秘鲁）

Coatitermes mazaruniensis 马扎鲁尼凸鼻白蚁（圭亚那、厄瓜多尔、法属圭亚那）

Coatitermes pallidus 苍白凸鼻白蚁（哥伦比亚、玻利维亚、厄瓜多尔、秘鲁）

箭猪白蚁属 *Coendutermes*

**Coendutermes tucum* 纤维箭猪白蚁（巴西、哥伦比亚、苏里南）

缩白蚁属 *Constrictotermes*

Constrictotermes cacaoensis 可可缩白蚁（法属圭亚那）

Constrictotermes cavifrons 凹额缩白蚁（巴西、法属圭亚那、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、苏里南、玻利维亚、委内瑞拉）

**Constrictotermes cyphergaster* 弯肠缩白蚁（巴西、巴拉圭、阿根廷、玻利维亚）

Constrictotermes guantanamensis 关塔那摩缩白蚁（加勒比古巴）

Constrictotermes latinotus 宽背缩白蚁（厄瓜多尔、哥伦比亚）

Constrictotermes rupestris 红色缩白蚁（巴西）

凸白蚁属 *Convexitermes*

**Convexitermes convexifrons* 凸额凸白蚁（巴西、哥伦比亚、玻利维亚、厄瓜多尔、秘鲁、巴拉圭、特立尼达）

Convexitermes manni 曼凸白蚁（巴西、法属圭亚那、圭亚那、巴拉圭、苏里南、特立尼达和多巴哥）

利颚白蚁属 *Cortaritermes*

Cortaritermes fulviceps 栗头利颚白蚁（阿根廷、乌拉圭、巴西、巴拉圭）

Cortaritermes intermedius 中间利颚白蚁（巴西、阿根廷、哥伦比亚、法属圭亚那、乌拉圭、委内瑞拉、玻利维亚、巴拉圭、特立尼达、特立尼达和多巴哥）

Cortaritermes piliceps 毛头利颚白蚁（巴西、阿根廷、哥伦比亚、法属圭亚那、乌拉圭、委内瑞拉、玻利维亚、巴拉圭、特立尼达）

Cortaritermes rizzinii 里兹尼利颚白蚁（巴西）

**Cortaritermes silvestrii* 西尔韦斯特里利颚白蚁（巴西、阿根廷、巴拉圭）

葫白蚁属 *Cucurbitermes*

Cucurbitermes parviceps 小葫白蚁（中国）

Cucurbitermes sinensis 中华葫白蚁（中国、广东）

**Cucurbitermes yingdeensis* 英德葫白蚁（中国、广东、江西、湖南）

巨鼻白蚁属 *Cyranotermes*

Cyranotermes caete 卡埃特巨鼻白蚁（巴西、法属圭亚那）

Cyranotermes glaber 无毛巨鼻白蚁（法属圭亚那、巴西）

Cyranotermes karipuna 卡日普纳巨鼻白蚁（巴西）

**Cyranotermes timuassu* 多毛巨鼻白蚁（巴西）

歧白蚁属 *Diversitermes*

Diversitermes castaniceps 栗头歧白蚁（巴西、巴拉圭、玻利维亚）

**Diversitermes diversimiles* 多兵歧白蚁（巴西、阿根廷、法属圭亚那、玻利维亚、巴拉圭）

Diversitermes tiapuan 长筒鼻歧白蚁（巴西、哥伦比亚）

木象白蚁属 *Diwaitermes*

Diwaitermes castanopsis 锥栗木象白蚁（巴布亚新几内亚）

Diwaitermes foi 福阿木象白蚁（巴布亚新几内亚）

**Diwaitermes kanehirai* 凯恩希拉木象白蚁（印度尼西亚、所罗门群岛、澳大利亚、巴布亚新几内亚、瓦努阿图）

埃莉诺白蚁属 *Eleanoritermes*

**Eleanoritermes borneensis* 婆罗埃莉诺白蚁（婆罗洲）

埃默森白蚁属 *Emersonitermes*

**Emersonitermes thekadensis* 卡迪埃默森白蚁（印度）

针筒白蚁属 *Enetotermes*

**Enetotermes bembicoides* 似陀针筒白蚁（赞比亚）

无名白蚁属 *Ereymatermes*

Ereymatermes panamensis 巴拿马无名白蚁（中美洲、巴拿马）

Ereymatermes piquira 短小无名白蚁（南美洲、巴西、秘鲁）

**Ereymatermes rotundiceps* 圆头无名白蚁（南美洲、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔）

小真白蚁属 *Eutermellus*

Eutermellus abruptus 陡峭小真白蚁（非洲热带）

Eutermellus aquilinus 鹰鼻小真白蚁（非洲热带）

Eutermellus bipartitus 两段小真白蚁（非洲热带）

**Eutermellus convergens* 收敛小真白蚁（科特迪瓦、喀麦隆、刚果、赤道几内亚、加蓬、加纳、尼日利亚）

Eutermellus undulans 波纹小真白蚁（西非冈比亚）

富勒白蚁属 *Fulleritermes*

Fulleritermes coatoni 科顿富勒白蚁（非洲南部、南非、津巴布韦）

**Fulleritermes contractus* 收缩富勒白蚁（安哥拉、刚果民主共和国、纳米比亚、南非、赞比亚、津巴布韦）

Fulleritermes mallyi 马利富勒白蚁（南非）

Fulleritermes tenebricus 阴暗富勒白蚁（科特迪瓦、多哥、塞内加尔、布基纳法索、加纳、中非共和国、刚果民主共和国、冈比亚、几内亚、尼日利亚、苏丹）

高跷白蚁属 *Grallatotermes*

Grallatotermes admirabilus 奇妙高跷白蚁（菲律宾）

Grallatotermes africanus 非洲高跷白蚁（莫桑比克、坦桑尼亚、肯尼亚）

**Grallatotermes grallator* 高跷高跷白蚁（巴布亚新几内亚）

Grallatotermes grallatoriformis 似高跷高跷白蚁（印度）

Grallatotermes niger 黑色高跷白蚁（印度）

Grallatotermes splendidus 华美高跷白蚁（菲律宾）

Grallatotermes weyeri 韦耶高跷白蚁（印度尼西亚）

多毛白蚁属 *Hirtitermes*

Hirtitermes brabazoni 布拉巴宗多毛白蚁（印度尼西亚）

**Hirtitermes hirtiventris* 毛腹多毛白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Hirtitermes spinocephalus 刺头多毛白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

须白蚁属 *Hospitalitermes*

Hospitalitermes asahinai 朝比奈须白蚁（泰国）

Hospitalitermes ataramensis 阿特兰须白蚁（柬埔寨、泰国、越南、印度、缅甸）

Hospitalitermes bicolor 双色须白蚁（泰国、柬埔寨、越南、印度尼西亚、马来西亚、新加坡）

Hospitalitermes birmanicus 缅甸须白蚁（缅甸、泰国）

Hospitalitermes blairi 布莱尔须白蚁（印度）

Hospitalitermes brevirostratus 短鼻须白蚁（缅甸）

Hospitalitermes butteli 巴特须白蚁（印度尼西亚）

Hospitalitermes damenglongensis 大勐龙须白蚁（中国云南、景洪大勐龙）

Hospitalitermes diurnus 日常须白蚁（印度尼西亚）

Hospitalitermes ferrugineus 铁锈须白蚁（印度尼西亚）

Hospitalitermes flaviventris 黄腹须白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

Hospitalitermes flavoantennaris 黄触角须白蚁（印度尼西亚）

Hospitalitermes grassii 格拉塞须白蚁（印度尼西亚）

**Hospitalitermes hospitalis* 寄宿须白蚁（文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡）

hospitalis 指名亚种

hospitaloides 似寄宿亚种

Hospitalitermes irianensis 伊里安查亚须白蚁（印度尼西亚）

Hospitalitermes javanicus 爪哇须白蚁（印度尼西亚）

Hospitalitermes jepsoni 杰普森须白蚁（柬埔寨、缅甸、孟加拉国、印度、泰国）

Hospitalitermes jinghongensis 景洪须白蚁（中国云南、景洪）

Hospitalitermes kali 卡尔须白蚁（印度尼科巴群岛）

Hospitalitermes krishnai 克里希纳须白蚁（印度尼西亚、苏门答腊南部楠榜）

Hospitalitermes lividiceps 蓝头须白蚁（印度尼西亚）

Hospitalitermes madrasi 马德拉斯须白蚁（印度）

Hospitalitermes majusculus 大须白蚁（云南（大勐龙、巴卡）、中国）

Hospitalitermes medioflavus 中黄须白蚁（马来西亚、印度尼西亚、新加坡、泰国）
Hospitalitermes moluccanus 摩鹿加须白蚁（印度尼西亚）
Hospitalitermes monoceros 独角须白蚁（斯里兰卡、印度）
Hospitalitermes nemorosus 阴凉须白蚁（印度尼西亚）
Hospitalitermes nicobarensis 尼科巴须白蚁（印度尼科巴群岛）
Hospitalitermes nigriantennalis 黑触角须白蚁（马来西亚、文莱、印度尼西亚）
Hospitalitermes papuanus 巴布亚须白蚁（巴布亚新几内亚）
Hospitalitermes paraschmidti 似施密德须白蚁（马来西亚）
Hospitalitermes proflaviventris 似黄腹须白蚁（马来西亚）
Hospitalitermes rufus 红色须白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Hospitalitermes schmidti 施密德须白蚁（印度尼西亚）
Hospitalitermes seikii 清木须白蚁（新加坡、马来西亚、斯里兰卡、缅甸、泰国、印度尼西亚、柬埔寨、越南、文莱、中国、印度、菲律宾）
Hospitalitermes sharpi 夏普须白蚁（印度尼西亚、马来西亚、新加坡）
Hospitalitermes umbrinus 赭色须白蚁（新加坡、马来西亚、印度尼西亚）

森林白蚁属 *Hyleotermes*

**Hyleotermes brevipilus* 短毛森林白蚁（巴西、圭亚那、哥伦比亚、厄瓜多尔、法属圭亚那、委内瑞拉）

考登白蚁属 *Kaudernitermes*

**Kaudernitermes kaudernianus* 考登考登白蚁（马达加斯加）
Kaudernitermes laticeps 宽头考登白蚁（马达加斯加、马约特）
Kaudernitermes nigritus 黑色考登白蚁（马达加斯加、塞舌尔）
Kaudernitermes salebrithorax 凹胸考登白蚁（马达加斯加、塞舌尔）

怒白蚁属 *Lacessititermes*

Lacessititermes albipes 白足怒白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Lacessititermes atrior 暗黑怒白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Lacessititermes batavus 荷兰怒白蚁（印度尼西亚）
Lacessititermes breviarticulatus 短节怒白蚁（马来西亚）
Lacessititermes cuphus 驼身怒白蚁（越南）
Lacessititermes filicornis 丝角怒白蚁（马来西亚）
Lacessititermes holmgreni 霍姆格伦怒白蚁（菲律宾）
Lacessititermes jacobsoni 雅各布森怒白蚁（印度尼西亚）
Lacessititermes kolapisensis 戈拉皮斯怒白蚁（马来西亚沙巴）
Lacessititermes laborator 耕地怒白蚁（印度尼西亚、苏门答腊、马来西亚）
Lacessititermes lacessitiformis 似紧张怒白蚁（马来西亚）
**Lacessititermes lacessitus* 紧张怒白蚁（马来西亚、新加坡）
Lacessititermes longinasus 长鼻怒白蚁（印度尼西亚、苏门答腊）
Lacessititermes palawanensis 巴拉望怒白蚁（菲律宾）
Lacessititermes piliferus 具毛怒白蚁（印度尼西亚、苏门答腊、马来西亚）
Lacessititermes ransoneti 兰森埃特怒白蚁（新加坡、马来西亚）

Lacessititermes saraiensis 萨赖怒白蚁（中国、印度尼西亚、菲律宾）
Lacessititermes sordidus 肮脏怒白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Lacessititermes thailandicus 泰国怒白蚁（泰国）
Lacessititermes yamanei 山根怒白蚁（印度尼西亚、新加坡、马来西亚、菲律宾）

薄喙白蚁属 *Leptomyxotermes*

**Leptomyxotermes doriae* 多利亚薄喙白蚁（喀麦隆、赤道几内亚、科特迪瓦、刚果民主共和国、加蓬、加纳、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂）

白脸白蚁属 *Leucopitermes*

Leucopitermes leucopiformis 似白脸白脸白蚁（马来西亚）
**Leucopitermes leucops* 白脸白脸白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Leucopitermes paraleucops 近白脸白脸白蚁（马来西亚）
Leucopitermes thoi 索白脸白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

长足白蚁属 *Longipeditermes*

Longipeditermes kistneri 基斯特纳长足白蚁（马来西亚、印度尼西亚）
**Longipeditermes longipes* 长足长足白蚁（马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、文莱）

大锥白蚁属 *Macrosubulitermes*

**Macrosubulitermes greavesi* 格里夫斯大锥白蚁（澳大利亚）

马尔加什白蚁属 *Malagasitermes*

**Malagasitermes milloti* 米约马尔加什白蚁（马达加斯加）

马来白蚁属 *Malaysiotermes*

Malaysiotermes holmgreni 霍姆格伦马来白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
**Malaysiotermes spinocephalus* 刺头马来白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

仿白蚁属 *Mimeutermes*

Mimeutermes binghami 宾厄姆仿白蚁（肯尼亚、赞比亚）
Mimeutermes clypeatus 大唇仿白蚁（津巴布韦）
Mimeutermes edentatus 无齿仿白蚁（加纳、几内亚、尼日利亚）
**Mimeutermes giffardii* 吉法德仿白蚁（喀麦隆、加纳、几内亚、科特迪瓦）
Mimeutermes majusculus 稍大仿白蚁（坦桑尼亚）
Mimeutermes sorex 吻长仿白蚁（喀麦隆、科特迪瓦、加纳、几内亚、尼日利亚）

米勒白蚁属 *Muelleritermes*

**Muelleritermes fritzi* 弗里茨米勒白蚁米勒白蚁（巴西）
Muelleritermes globiceps 球头米勒白蚁（巴西）

鸟嘴白蚁属 *Mycterotermes*

**Mycterotermes meringocephalus* 饼头鸟嘴白蚁（阿曼、也门）

棘象白蚁属 *Nasopilotermes*

**Nasopilotermes jiangxiensis* 江西棘象白蚁（中国江西）

象白蚁属 *Nasutitermes*

Nasutitermes acajutlae 阿卡胡特拉象白蚁（哥伦比亚、波多黎各、美国、法属圭亚那、特立尼达和多巴哥、安提瓜和巴布达、巴巴多斯、蒙特塞拉特、苏里南、委内瑞拉、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛）

Nasutitermes acangussu 头大象白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁）
Nasutitermes acutus 尖锐象白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
Nasutitermes aduncus 弯曲象白蚁（巴西、秘鲁、玻利维亚）
Nasutitermes alticola 高地象白蚁（马来西亚）
Nasutitermes amboinensis 安汶象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes anamalaiensis 安纳马莱象白蚁（印度）
Nasutitermes anjiensis 安吉象白蚁（中国）
Nasutitermes anoniensis 阿诺尼象白蚁（孟加拉国）
Nasutitermes aquilinus 鹰喙象白蚁（巴西、巴拉圭、阿根廷、哥伦比亚）
Nasutitermes araujoi 阿劳若象白蚁（巴西）
Nasutitermes arborum 树生象白蚁（科特迪瓦、喀麦隆、冈比亚、尼日利亚、塞内加尔、多哥、贝宁、刚果（布）、刚果民主共和国、加蓬、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚、塞拉利昂、乌干达）
Nasutitermes arenarius 沙地象白蚁（巴西、苏里南、委内瑞拉）
Nasutitermes aruensis 阿鲁象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes atripennis 黑翅象白蚁（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾）
Nasutitermes aurantius 橙黄象白蚁（巴拿马）
Nasutitermes balingtauagensis 巴林他象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes banksi 班克斯象白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、圭亚那、玻利维亚、秘鲁）
Nasutitermes bannaensis 版纳象白蚁（中国）
Nasutitermes bashanensis 巴山象白蚁（中国）
Nasutitermes benjamini 本杰明象白蚁（毛里求斯）
Nasutitermes bikpelanus 鼻大象白蚁（巴布亚新几内亚）
Nasutitermes bivalens 二价象白蚁（巴西、哥斯达黎加、哥伦比亚、阿根廷）
Nasutitermes boengiensis 博恩象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes boetoni 博顿象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes bolivari 玻利瓦尔象白蚁（玻利维亚、巴西、委内瑞拉）
Nasutitermes bolivianus 玻利维亚象白蚁（玻利维亚）
Nasutitermes brachynasutus 鼻短象白蚁（泰国）
Nasutitermes brevioculatus 小眼象白蚁（巴西、阿根廷、玻利维亚、巴拉圭）
Nasutitermes brevirostris 短吻象白蚁（马绍尔群岛、密克罗尼西亚、帕劳）
Nasutitermes brunneus 棕色象白蚁（印度）
Nasutitermes bulbiceps 葱头象白蚁（马来西亚）
Nasutitermes bulbus 胖头象白蚁（中国）
Nasutitermes callimorphus 硬皮象白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、哥斯达黎加、特立尼达和多巴哥、玻利维亚、厄瓜多尔、瓜德罗普（法）、马提尼克（法）、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、委内瑞拉）
Nasutitermes camerunensis 喀麦隆象白蚁（喀麦隆、尼日利亚）
Nasutitermes carnarvonensis 卡那封象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes castaneus 栗色象白蚁（菲律宾）

Nasutitermes celebensis 西里伯斯象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes centraliensis 中部象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes ceylonicus 锡兰象白蚁（斯里兰卡）
Nasutitermes changningensis 长宁象白蚁（中国）
Nasutitermes chapmani 查普曼象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes chaquimayensis 查基马约象白蚁（巴西、秘鲁、玻利维亚、巴拉圭）
Nasutitermes cherraensis 乞拉象白蚁（印度）
Nasutitermes chhotanii 乔塔里象白蚁（印度）
Nasutitermes choui 周氏象白蚁（中国）
Nasutitermes chrysopleura 金纹象白蚁（喀麦隆）
Nasutitermes coalescens 团结象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes colimae 科利马象白蚁（墨西哥）
Nasutitermes communis 圆头象白蚁（中国）
Nasutitermes comorensis 科摩罗象白蚁（科摩罗）
Nasutitermes comstockae 科姆斯托克象白蚁（哥伦比亚、巴西、法属圭亚那）
**Nasutitermes corniger* 具角象白蚁（巴西、哥斯达黎加、墨西哥、巴拿马、波多黎各、哥伦比亚、安提瓜和巴布达、阿根廷、巴巴多斯、伯利兹、玻利维亚、开曼群岛、古巴、多米尼克、多米尼加、厄瓜多尔、法属圭亚那、格林纳达、瓜德罗普（法）、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、马提尼克（法）、蒙特塞拉特、荷属安的列斯、尼加拉瓜、巴拉圭、秘鲁、圣基茨和尼维斯、安圭拉、圣卢西亚、圣马丁（法）、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、委内瑞拉、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、引入：巴哈马、引入：帕劳、引入：巴布亚新几内亚、引入：美国）
Nasutitermes corporaali 科尔波弱尔象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes coxipoensis 科西波象白蚁（巴西、法属圭亚那、阿根廷）
Nasutitermes crassicornis 厚角象白蚁（印度）
Nasutitermes crassus 粗颚象白蚁（玻利维亚）
Nasutitermes curtinasus 短鼻象白蚁（中国）
Nasutitermes dasyopsis 毛脸象白蚁（巴拿马）
Nasutitermes dendrophilus 喜树象白蚁（厄瓜多尔、巴西、秘鲁）
Nasutitermes devrayi 德沃瑞象白蚁（印度尼科巴群岛）
Nasutitermes diabolus 魔鬼象白蚁（刚果（布）、科特迪瓦、喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬、尼日利亚、乌干达）
Nasutitermes dimorphus 二型象白蚁（马来西亚、泰国）
Nasutitermes dixoni 迪克森象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes dobonensis 多波象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes dolichorhinos 长鼻象白蚁（中国）
Nasutitermes dudgeoni 香港象白蚁（中国）
Nasutitermes dunensis 德拉敦象白蚁（印度）
Nasutitermes ecuadorianus 厄瓜多尔象白蚁（厄瓜多尔、巴西）
Nasutitermes ehrhardti 埃尔哈特象白蚁（巴西、阿根廷）

Nasutitermes elegantulus 小雅象白蚁（刚果（布）、安哥拉、喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬、加纳、几内亚、尼日利亚、圣多美和普林西比、乌干达）
Nasutitermes emersoni 埃默森象白蚁（印度、孟加拉国）
Nasutitermes ephratae 埃夫拉塔象白蚁（墨西哥、巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、法属圭亚那、巴拿马、伯利兹、玻利维亚、多米尼克、厄瓜多尔、瓜德罗普（法）、危地马拉、洪都拉斯、蒙特塞拉特、尼加拉瓜、巴拉圭、秘鲁、波多黎各、苏里南、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉、美属维尔京群岛）
Nasutitermes eucalypti 桉树象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes exitiosus 破坏象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes fabricii 法布里克象白蚁（印度）
Nasutitermes falciformis 鹰鼻象白蚁（中国）
Nasutitermes fengkaiensis 封开象白蚁（中国）
Nasutitermes ferranti 费朗象白蚁（刚果（金）、安哥拉、刚果（布）、刚果民主共和国、尼日利亚）
Nasutitermes feytaudi 费淘德象白蚁（巴西）
Nasutitermes fletcheri 弗莱彻象白蚁（印度）
Nasutitermes fulleri 富勒象白蚁（刚果（金）、尼日利亚、安哥拉、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、加蓬、几内亚、塞拉利昂、乌干达）
Nasutitermes fumigatus 烟色象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes fuscipennis 暗翅象白蚁（马来西亚、泰国）
Nasutitermes gaigei 盖格象白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、玻利维亚、特立尼达和多巴哥、圭亚那、马提尼克（法）、委内瑞拉）
Nasutitermes gardneri 尖鼻象白蚁（不丹、中国、印度）
Nasutitermes gardneriformis 若尖象白蚁（中国）
Nasutitermes garoensis 山地象白蚁（不丹、中国、印度）
Nasutitermes glabritergus 光背象白蚁（哥斯达黎加、巴拿马、危地马拉、厄瓜多尔）
Nasutitermes globiceps 球头象白蚁（巴西、玻利维亚、哥伦比亚、巴拉圭）
Nasutitermes gracilirostris 细嘴象白蚁（印度尼西亚、巴布亚新几内亚）
Nasutitermes gracilis 细瘦象白蚁（印度尼西亚、菲律宾）
Nasutitermes grandinasus 大鼻象白蚁（中国）
Nasutitermes graveolus 稍重象白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Nasutitermes guayanae 圭亚那象白蚁（哥伦比亚、巴西、法属圭亚那、苏里南、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥斯达黎加、巴拿马、秘鲁、特立尼达和多巴哥）
Nasutitermes guizhouensis 贵州象白蚁（中国）
Nasutitermes haddoensis 哈多象白蚁（印度）
Nasutitermes havilandi 哈维兰象白蚁（新加坡、马来西亚、尼日利亚、印度尼西亚、泰国）
Nasutitermes hejiangensis 合江象白蚁（中国）
Nasutitermes heterodon 异齿象白蚁（中国）
Nasutitermes hexianensis 和县象白蚁（中国）
Nasutitermes hirticeps 毛头象白蚁（圣多美和普林西比）
Nasutitermes horni 霍恩象白蚁（斯里兰卡）

Nasutitermes huangshanensis 黄山象白蚁（中国）
Nasutitermes hubbardi 哈伯德象白蚁（古巴、多米尼加、牙买加、海地）
Nasutitermes inclinasus 倾鼻象白蚁（中国）
Nasutitermes indicola 印度象白蚁（印度）
Nasutitermes infuscatus 暗色象白蚁（刚果（金）、肯尼亚、马拉维、坦桑尼亚、津巴布韦、刚果民主共和国）
Nasutitermes itapocuensis 伊塔波库象白蚁（巴西、阿根廷）
Nasutitermes jacobsoni 雅各布森象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes jalpaigurensis 杰尔拜古里象白蚁（孟加拉国、印度）
Nasutitermes jaraguae 哈拉瓜象白蚁（巴西、阿根廷）
Nasutitermes javanicus 爪哇象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes jiangxiensis 江西象白蚁（中国）
Nasutitermes johoricus 柔佛象白蚁（马来西亚、泰国）
Nasutitermes kali 卡尔象白蚁（印度）
Nasutitermes kemneri 凯姆勒象白蚁（巴西、玻利维亚）
Nasutitermes kempae 肯帕象白蚁（肯尼亚、马拉维、莫桑比克、南非、坦桑尼亚）
Nasutitermes kimberleyensis 金伯利象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes kinoshitai 木下象白蚁（中国台湾）
Nasutitermes koiari 科伊阿瑞象白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Nasutitermes krishna 克里希纳象白蚁（印度）
Nasutitermes lacustris 湖泊象白蚁（斯里兰卡）
Nasutitermes latifrons 宽额象白蚁（刚果（布）、科特迪瓦、喀麦隆、贝宁、加纳、安哥拉、刚果民主共和国、赤道几内亚、加蓬、几内亚、几内亚比绍、尼日利亚、圣多美和普林西比、塞拉利昂、苏丹、多哥、乌干达）
Nasutitermes latus 宽阔象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes leponcei 莱波斯象白蚁（印度尼西亚、巴布亚新几内亚）
Nasutitermes lividus 青色象白蚁（海地、古巴、多米尼加）
Nasutitermes llinquipatensis 林奎帕塔象白蚁（巴西、厄瓜多尔、秘鲁）
Nasutitermes longiarticulatus 显长象白蚁（巴西）
Nasutitermes longinasoides 似鼻长象白蚁（新加坡、印度尼西亚、马来西亚）
Nasutitermes longinasus 鼻长象白蚁（马来西亚、印度尼西亚、新加坡）
Nasutitermes longipennis 长翅象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes longirostratus 喙长象白蚁（玻利维亚、秘鲁）
Nasutitermes longirostris 长喙象白蚁（印度尼西亚、马来西亚）
longirostris 指名亚种
sabahicola 沙巴亚种
Nasutitermes longwangshanensis 龙王山象白蚁（中国）
Nasutitermes lujae 卢哈象白蚁（喀麦隆、尼日利亚、加蓬、乌干达、安哥拉、刚果（布）、刚果民主共和国、加纳、科特迪瓦）
Nasutitermes luzonicus 吕宋象白蚁（印度尼西亚、关岛（美）、马来西亚、菲律宾）

Nasutitermes machengensis 麻城象白蚁（中国）
Nasutitermes macrocephalus 大头象白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷、玻利维亚、巴拉圭、委内瑞拉）
Nasutitermes magnus 巨大象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes maheensis 马埃象白蚁（塞舌尔）
Nasutitermes major 大型象白蚁（巴西、秘鲁、哥伦比亚、玻利维亚）
Nasutitermes makassarensis 望加锡象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes mangshanensis 莽山象白蚁（中国）
Nasutitermes maniseri 马尼塞象白蚁（巴西）
Nasutitermes matangensis 马登象白蚁（孟加拉国、印度、缅甸、泰国、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、越南）
christmasensis 圣诞岛亚种
matangensioides 似马登亚种
matangensis 指名亚种
pyricephalus 梨头亚种
Nasutitermes mauritianus 毛里求斯象白蚁（马达加斯加、毛里求斯）
Nasutitermes maximus 最大象白蚁（秘鲁）
Nasutitermes medoensis 墨脱象白蚁（中国）
Nasutitermes meinerti 迈纳特象白蚁（委内瑞拉）
Nasutitermes meridianus 南方象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes mindanensis 棉兰老岛象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes minimus 最小象白蚁（巴西、秘鲁、玻利维亚）
Nasutitermes minor 小型象白蚁（玻利维亚、巴西）
Nasutitermes mirabilis 奇鼻象白蚁（中国）
Nasutitermes mojosensis 莫霍斯象白蚁（玻利维亚、秘鲁）
Nasutitermes mollis 柔软象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes montanae 大山象白蚁（苏里南）
Nasutitermes moratus 拖延象白蚁（中国、印度）
Nasutitermes motu 易动象白蚁（巴布亚新几内亚）
Nasutitermes muli 柑橘象白蚁（巴布亚新几内亚）
Nasutitermes myersi 迈尔斯象白蚁（巴西）
Nasutitermes neonanus 新鼻象白蚁（马达加斯加）
Nasutitermes neoparvus 新微象白蚁（文莱、印度尼西亚、马来西亚）
Nasutitermes nigriceps 黑头象白蚁（墨西哥、哥伦比亚、巴西、巴拿马、伯利兹、法属圭亚那、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、博奈尔、开曼群岛、哥斯达黎加、库拉索、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、尼加拉瓜、秘鲁、波多黎各、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、委内瑞拉、美属维尔京群岛）
Nasutitermes nomadensis 诺马德象白蚁（巴布亚新几内亚）
Nasutitermes nordenskioldi 努登舍尔德象白蚁（阿根廷、巴拉圭、玻利维亚）
Nasutitermes novarumhebridarum 新赫布里底象白蚁（所罗门群岛、新喀里多尼亚（法）、巴布亚新几内亚、瓦努阿图）

Nasutitermes obscurus 昏暗象白蚁（秘鲁、巴西、法属圭亚那）
Nasutitermes obtusimandibulus 钝颚象白蚁（中国）
Nasutitermes octopilis 八毛象白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、圭亚那、印度、秘鲁、厄瓜多尔、委内瑞拉）
Nasutitermes oculatus 眼显象白蚁（斯里兰卡）
Nasutitermes olidus 臭味象白蚁（斐济）
Nasutitermes orthonasus 直鼻象白蚁（中国）
Nasutitermes oshimai 大岛象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes ovatus 卵头象白蚁（中国、越南）
Nasutitermes ovipennis 椭圆翅象白蚁（马来西亚）
Nasutitermes palaoensis 帕劳象白蚁（密克罗尼西亚）
Nasutitermes panayensis 班乃象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes parviceps 小头象白蚁（中国）
Nasutitermes parvonasutus 小象白蚁（中国台湾）
Nasutitermes parvus 微象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes perparvus 似微象白蚁（越南、马来西亚、泰国）
Nasutitermes peruanus 秘鲁象白蚁（秘鲁、厄瓜多尔、巴西、玻利维亚）
Nasutitermes pictus 着色象白蚁（墨西哥）
Nasutitermes pilosus 多毛象白蚁（巴西、法属圭亚那、玻利维亚）
Nasutitermes pinocchio 皮诺基奥象白蚁（印度尼西亚、巴布亚新几内亚）
Nasutitermes planiusculus 平圆象白蚁（中国）
Nasutitermes pluriarticulatus 多节象白蚁（巴西、阿根廷、乌拉圭）
Nasutitermes pluvialis 招雨象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes princeps 第一象白蚁（澳大利亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚）
Nasutitermes proatripennis 似黑翅象白蚁（马来西亚、泰国）
Nasutitermes profuscipennis 似暗翅象白蚁（孟加拉国、印度、泰国）
Nasutitermes projectus 喷射象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes proximus 最新象白蚁（巴西、乌拉圭）
Nasutitermes qimenensis 祁门象白蚁（中国）
Nasutitermes qingjiensis 庆界象白蚁（中国）
Nasutitermes rectangularis 直角象白蚁（马来西亚）
Nasutitermes regularis 规律象白蚁（马来西亚）
Nasutitermes retus 红色象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes rippertii 里珀特象白蚁（古巴、巴哈马、牙买加）
Nasutitermes roboratus 强壮象白蚁（缅甸）
Nasutitermes rotundatus 圆形象白蚁（巴西、秘鲁、阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔）
Nasutitermes rotundus 球形象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes saleierensis 萨莱尔象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes sanctaeanae 圣安娜象白蚁（巴拉圭、阿根廷）
Nasutitermes sandakensis 山打根象白蚁（马来西亚）

Nasutitermes schoutedeni 斯考特登象白蚁（安哥拉、喀麦隆、刚果（布）、刚果（金）、加蓬、科特迪瓦、尼日利亚、乌干达、刚果民主共和国）
Nasutitermes seghersi 西格象白蚁（坦桑尼亚、巴布亚新几内亚）
malangganus 马兰干亚种
seghersi 指名亚种
Nasutitermes shangchengensis 商城象白蚁（中国）
Nasutitermes simaluris 锡默卢象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes similis 相似象白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、圭亚那、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉）
Nasutitermes simulans 模仿象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes sinensis 中华象白蚁（中国）
Nasutitermes smithi 史密斯象白蚁（澳大利亚）
Nasutitermes stricticeps 缩头象白蚁（巴西、委内瑞拉）
Nasutitermes subtibetanus 亚藏象白蚁（中国）
Nasutitermes subtibialis 亚径象白蚁（中国）
Nasutitermes suknensis 苏克纳象白蚁（印度）
Nasutitermes surinamensis 苏里南象白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、玻利维亚、圭亚那、秘鲁、厄瓜多尔、苏里南、委内瑞拉）
Nasutitermes takasagoensis 高砂象白蚁（日本、关岛、中国台湾、圣诞岛）
Nasutitermes tandoni 坦登象白蚁（印度）
Nasutitermes tatarendae 塔塔恩达象白蚁（巴西、秘鲁、阿根廷、玻利维亚、巴拉圭）
Nasutitermes taylori 泰勒象白蚁（菲律宾）
Nasutitermes thanensis 塔诺象白蚁（印度）
Nasutitermes tianmuensis 天目象白蚁（中国）
Nasutitermes tiantongensis 天童象白蚁（中国）
Nasutitermes tibetanus 西藏象白蚁（中国）
Nasutitermes timoriensis 帝汶象白蚁（印度尼西亚）
Nasutitermes tipuanicus 蒂普阿尼象白蚁（玻利维亚、巴拉圭）
Nasutitermes torresi 托里斯象白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Nasutitermes tredecimarticulatus 十三节象白蚁（巴西、厄瓜多尔）
Nasutitermes triloki 特里洛克象白蚁（印度）
Nasutitermes triodiae 三齿程草象白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Nasutitermes tsaii 蔡氏象白蚁（中国）
Nasutitermes tungsalangensis 通沙朗象白蚁（马来西亚、泰国）
Nasutitermes unduliceps 浪头象白蚁（巴西、法属圭亚那）
Nasutitermes vadoni 瓦东象白蚁（马达加斯加）
Nasutitermes vallis 山谷象白蚁（中国）
Nasutitermes vishnu 维什鲁象白蚁（印度）
Nasutitermes walkeri 沃克象白蚁（澳大利亚、新西兰）
Nasutitermes wheeleri 惠勒象白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那）

Nasutitermes xingshanensis 兴山象白蚁（中国）

凋落白蚁属 *Ngauratermes*

**Ngauratermes arue* 小凋落白蚁（巴西、秘鲁）

新几内亚白蚁属 *Niuginitermes*

Niuginitermes liklik 小新几内亚白蚁（巴布亚新几内亚）

**Niuginitermes variratae* 瓦里拉塔新几内亚白蚁（巴布亚新几内亚）

钝白蚁属 *Obtusitermes*

Obtusitermes formosulus 漂亮钝白蚁（委内瑞拉、巴拿马、特立尼达和多巴哥）

Obtusitermes monomorphus 单型钝白蚁（巴拿马）

**Obtusitermes panamae* 巴拿马钝白蚁（巴拿马、哥斯达黎加、哥伦比亚）

西部白蚁属 *Occasitermes*

**Occasitermes occasus* 西部西部白蚁（澳大利亚）

Occasitermes watsoni 沃森西部白蚁（澳大利亚）

隐白蚁属 *Occultitermes*

Occultitermes aridus 干燥隐白蚁（澳大利亚）

**Occultitermes occultus* 藏隐白蚁（澳大利亚）

东锥白蚁属 *Oriensubulitermes*

**Oriensubulitermes inanis* 缺齿东锥白蚁（印度尼西亚、马来西亚、新加坡）

Oriensubulitermes kemneri 凯姆勒东锥白蚁（马来西亚）

近凸白蚁属 *Paraconvexitermes*

Paraconvexitermes acangapua 圆头近凸白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、委内瑞拉）

Paraconvexitermes junceus 细长近凸白蚁（巴西、圭亚那、厄瓜多尔）

**Paraconvexitermes nigricornis* 黑角近凸白蚁（哥伦比亚、法属圭亚那、巴西、秘鲁）

微白蚁属 *Parvitermes*

Parvitermes aequalis 类似微白蚁（古巴）

Parvitermes antillarum 安的列斯微白蚁（海地、多米尼加）

Parvitermes bacchanalis 酒神微白蚁（巴西）

**Parvitermes brooksi* 布鲁克斯微白蚁（古巴、巴哈马）

Parvitermes collinsae 柯林斯微白蚁（多米尼加）

Parvitermes dominicanae 多米尼加微白蚁（多米尼加）

Parvitermes flaveolus 微黄微白蚁（多米尼加、海地）

Parvitermes mesoamericanus 中美洲微白蚁（危地马拉、尼加拉瓜、洪都拉斯）

Parvitermes mexicanus 墨西哥微白蚁（墨西哥）

Parvitermes pallidiceps 灰头微白蚁（多米尼加、海地）

Parvitermes toussainti 图森特微白蚁（多米尼加、海地）

Parvitermes wolcotti 沃尔科特微白蚁（波多黎各、美国、英属维尔京群岛）

Parvitermes yucatanus 尤卡坦微白蚁（危地马拉、墨西哥、伯利兹）

近针白蚁属 *Periaciculitermes*

**Periaciculitermes menglunensis* 勐仑近针白蚁（中国）

后锥白蚁属 *Postsubulitermes*

*_Postsubulitermes parviconstrictus_ 微缩后锥白蚁（刚果（金）、刚果（布）、喀麦隆、加蓬）

锥形白蚁属 *Rhadinotermes*

*_Rhadinotermes coarctatus_ 压缩锥形白蚁（津巴布韦、马达加斯加、博茨瓦纳、刚果民主共和国、马拉维、纳米比亚、南非、坦桑尼亚、赞比亚）

鲁恩沃白蚁属 *Roonwalitermes*

*_Roonwalitermes wadhwai_ 沃德瓦鲁恩沃白蚁（印度）

圆白蚁属 *Rotunditermes*

Rotunditermes bragantinus 布拉干提纳圆白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁）

*_Rotunditermes rotundiceps_ 圆头圆白蚁（巴西、哥伦比亚、秘鲁）

胖白蚁属 *Rounditermes*

*_Rounditermes dechambrei_ 德尚布尔胖白蚁（法属圭亚那）

沙巴白蚁属 *Sabahitermes*

Sabahitermes leuserensis 勒塞尔沙巴白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

*_Sabahitermes malakuni_ 马拉昆沙巴白蚁（马来西亚）

桑兹白蚁属 *Sandsitermes*

*_Sandsitermes robustus_ 粗壮桑兹白蚁（秘鲁、巴西、哥伦比亚）

华象白蚁属 *Sinonasutitermes*

Sinonasutitermes admirabilis 奇异华象白蚁（中国）

*_Sinonasutitermes dimorphus_ 二型华象白蚁（中国）

Sinonasutitermes erectinasus 翘鼻华象白蚁（中国）

Sinonasutitermes guangxiensis 广西华象白蚁（中国）

Sinonasutitermes hainanensis 海南华象白蚁（中国）

Sinonasutitermes mediocris 居中华象白蚁（中国）

Sinonasutitermes planinasus 平鼻华象白蚁（中国）

Sinonasutitermes platycephalus 扁头华象白蚁（中国）

Sinonasutitermes trimorphus 三型华象白蚁（中国）

Sinonasutitermes xiai 夏氏华象白蚁（中国）

Sinonasutitermes yui 尤氏华象白蚁（中国）

鼻大白蚁属 *Sinqasapatermes*

*_Sinqasapatermes sachae_ 森林鼻大白蚁（哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁）

匙白蚁属 *Spatulitermes*

*_Spatulitermes coolingi_ 库林匙白蚁（非洲南部、纳米比亚、赞比亚）

似锥白蚁属 *Subulioiditermes*

Subulioiditermes borneensis 婆罗似锥白蚁（马来西亚）

Subulioiditermes emersoni 埃默森似锥白蚁（马来西亚）

*_Subulioiditermes subulioides_ 似锥似锥白蚁（印度尼西亚、马来西亚）

锥白蚁属 *Subulitermes*

Subulitermes angusticeps 窄头锥白蚁（玻利维亚）

Subulitermes baileyi 贝利锥白蚁（巴西、委内瑞拉、法属圭亚那、哥伦比亚、哥斯达黎加、特立尼达和多巴哥、玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那）
Subulitermes constricticeps 缩头锥白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚）
Subulitermes denisae 丹尼斯锥白蚁（巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜）
**Subulitermes microsoma* 体小锥白蚁（巴西、玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷、巴拉圭）
Subulitermes thompsonae 汤普森锥白蚁（秘鲁、厄瓜多尔）

慢白蚁属 *Tarditermes*

**Tarditermes contracolor* 反色慢白蚁（刚果（金）、刚果民主共和国）

薄嘴白蚁属 *Tenuirostritermes*

Tenuirostritermes briciae 布瑞西亚薄嘴白蚁（墨西哥、尼加拉瓜、伯利兹、危地马拉、洪都拉斯）
Tenuirostritermes cinereus 灰白薄嘴白蚁（美国、墨西哥）
Tenuirostritermes incisus 切割薄嘴白蚁（墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜）
Tenuirostritermes strenuus 活跃薄嘴白蚁（墨西哥）
**Tenuirostritermes tenuirostris* 薄嘴薄嘴白蚁（美国、墨西哥）

暗鼻白蚁属 *Tiunatermes*

**Tiunatermes mariuzani* 马里乌赞暗鼻白蚁（南美洲、巴西）
Tiunatermes tapirape 塔皮拉佩暗鼻白蚁（南美洲、巴西）

三角白蚁属 *Triangularitermes*

**Triangularitermes triangulariceps* 三角头三角白蚁（巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁）

三脉白蚁属 *Trinervitermes*

Trinervitermes arabiae 阿拉伯三脉白蚁（沙特阿拉伯、也门）
Trinervitermes bettonianus 贝顿三脉白蚁（纳米比亚、刚果（布）、肯尼亚、刚果民主共和国、马拉维、莫桑比克、尼日利亚、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚、津巴布韦）
Trinervitermes biformis 二型三脉白蚁（印度、巴基斯坦、斯里兰卡）
Trinervitermes dispar 不同三脉白蚁（厄立特里亚、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、肯尼亚、马拉维、纳米比亚、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚、津巴布韦）
Trinervitermes disparatus 分离三脉白蚁（越南）
Trinervitermes fletcheri 弗莱彻三脉白蚁（印度）
Trinervitermes geminatus 成对三脉白蚁（科特迪瓦、塞内加尔、多哥、加纳、尼日利亚、布基纳法索、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、马里、毛里塔尼亚、塞拉利昂、苏丹、乌干达）
Trinervitermes gratiosus 常见三脉白蚁（安哥拉、布隆迪、刚果（金）、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚、刚果民主共和国）
Trinervitermes indicus 印度三脉白蚁（印度）
Trinervitermes nigrirostris 黑鼻三脉白蚁（印度）
Trinervitermes occidentalis 西部三脉白蚁（科特迪瓦、塞内加尔、多哥、布基纳法索、尼日利亚、中非、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、加纳、几内亚比绍、塞拉利昂、乌干达）
Trinervitermes oeconomus 根三脉白蚁（科特迪瓦、多哥、布基纳法索、贝宁、中非、乍得、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、加纳、马里、尼日利亚、塞内加尔、苏丹、乌干达）
Trinervitermes rabidus 狂猛三脉白蚁（斯里兰卡、印度）

Trinervitermes rapulum 蔓菁三脉白蚁（南非、埃塞俄比亚、马拉维、坦桑尼亚、津巴布韦）
Trinervitermes rhodesiensis 罗得西亚三脉白蚁（科特迪瓦、安哥拉、博茨瓦纳、中非、刚果共和国、刚果民主共和国、纳米比亚、南非、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦）
Trinervitermes saudiensis 沙特三脉白蚁（沙特阿拉伯、也门）
Trinervitermes sensarmai 森萨尔马三脉白蚁（印度）
Trinervitermes sudanicus 苏丹三脉白蚁（马里）
Trinervitermes togoensis 多哥兰三脉白蚁（科特迪瓦、塞内加尔、多哥、布基纳法索、印度、尼日尔、贝宁、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加纳、几内亚、马里、尼日利亚、塞拉利昂、苏丹、乌干达）
* *Trinervitermes trinervius* 三脉三脉白蚁（塞内加尔、科特迪瓦、布基纳法索、尼日利亚、南非、冈比亚、中非、乍得、刚果民主共和国、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚、乌干达）
Trinervitermes trinervoides 似三脉三脉白蚁（南非、纳米比亚、刚果（金）、刚果民主共和国、莱索托、莫桑比克、斯威士兰、津巴布韦）

冢白蚁属 *Tumulitermes*

Tumulitermes apiocephalus 蜂头冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes comatus 长毛冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes curtus 缩短冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes dalbiensis 多尔比冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes hastilis 甘蔗冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes kershawi 克肖冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes marcidus 凋零冢白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Tumulitermes mareebensis 马里巴冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes nichollsi 尼科尔斯冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes pastinator 挖掘冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes peracutus 锐利冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes petilus 修长冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes pulleinei 普雷勒冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes recalvus 无毛冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes subaquilus 稍暗冢白蚁（澳大利亚）
* *Tumulitermes tumuli* 土垄冢白蚁（澳大利亚）
Tumulitermes westraliensis 西澳冢白蚁（澳大利亚）

快白蚁属 *Velocitermes*

Velocitermes aporeticus 怀疑快白蚁（巴西）
Velocitermes barrocoloradensis 巴罗科罗拉多快白蚁（巴拿马）
Velocitermes beebei 毕比快白蚁（巴西、法属圭亚那、圭亚那、厄瓜多尔、委内瑞拉）
Velocitermes glabrinotus 光背快白蚁（巴西、哥伦比亚）
* *Velocitermes heteropterus* 异翅快白蚁（巴西、哥伦比亚、巴拉圭、阿根廷、委内瑞拉）
Velocitermes laticephalus 宽头快白蚁（玻利维亚、厄瓜多尔、秘鲁）
Velocitermes melanocephalus 黑头快白蚁（阿根廷、玻利维亚、巴西、法属圭亚那）
Velocitermes paucipilis 少毛快白蚁（巴西、厄瓜多尔、委内瑞拉）
Velocitermes uniformis 单型快白蚁（巴西、玻利维亚、委内瑞拉）

Velocitermes velox 快速快白蚁（巴西、玻利维亚、秘鲁）

疣白蚁属 *Verrucositermes*

Verrucositermes hirtus 多毛疣白蚁（喀麦隆）

**Verrucositermes tuberosus* 多疣疣白蚁（喀麦隆、刚果（金）、刚果民主共和国、加蓬）

夏氏白蚁属 *Xiaitermes*

Xiaitermes tiantaiensis 天台夏氏白蚁（中国）

**Xiaitermes yinxianensis* 鄞县夏氏白蚁（中国）

新扭白蚁亚科 Neocapritermitinae

新扭白蚁亚科由 Hellemans、Engel 与 Bourguignon 于 2024 年建立[21]，模式属为新扭白蚁属 *Neocapritermes* Holmgren, 1912；亚科名源自模式属名（neo-，“新” + *Capritermes*）。本名录收录 3 属 20 种。

本亚科为新热带界特有类群，分布以巴西为中心，北达中美洲（巴拿马、哥斯达黎加），南至阿根廷北部、巴拉圭，西抵秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、玻利维亚，东及圭亚那诸国、委内瑞拉与特立尼达和多巴哥；不对称白蚁属迄今仅知法属圭亚那一种。本亚科无已知引入或入侵记录。食性为腐朽木食或木材—土壤界面取食。防御上，兵蚁具不对称扭颚，头矩形、额部无突起；与旧世界瘤白蚁亚科相比，其右下颚第二缘齿后缘平直、臼齿区具明显脊纹、肠瓣由三道褶构成（后者为六道），可资区分。工蚁—有翅蚁型左上颚端齿短于第一、二缘齿之和，为本亚科齿式上的鉴别点；后肠混合节长，远端膨大成一对中肠囊（仅见于新扭白蚁属 *Neocapritermes* 与不对称白蚁属 *Schievitermes*），膨大室（P3）壁密被细刺；马氏管两对在前端愈合成一点、无结节。本亚科最著名的生物学记录来自新扭白蚁属：塔拉夸新扭白蚁 *N. taracua* 的老龄工蚁在胸腹部交界处形成含蓝色蛋白结晶的囊，御敌时体壁破裂、与唾腺分泌物混合发生自体爆裂[70]，为白蚁中最复杂的工蚁防御机制之一。经济上，新扭白蚁属 *Neocapritermes opacus* 在巴西圣保罗州甘蔗田为最常见白蚁种类[71]。



塔拉夸新扭白蚁 *N. taracua*（https://www.science.org/doi/10.1126/science.1219129）

新扭白蚁属 *Neocapritermes*

Neocapritermes angusticeps 窄头新扭白蚁（巴西、法属圭亚那、圭亚那、苏里南、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）
Neocapritermes araguaia 阿拉瓜亚新扭白蚁（巴西、法属圭亚那）
Neocapritermes bodkini 博德金新扭白蚁（哥伦比亚、圭亚那、巴西、秘鲁）
Neocapritermes braziliensis 巴西新扭白蚁（巴西、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉）
Neocapritermes centralis 中部新扭白蚁（巴拿马、哥斯达黎加）
Neocapritermes guyana 圭亚那新扭白蚁（法属圭亚那、巴西、圭亚那）
Neocapritermes longinotus 长背新扭白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、委内瑞拉）
Neocapritermes mirim 小型新扭白蚁（巴西）
**Neocapritermes opacus* 发黑新扭白蚁（巴西、阿根廷、玻利维亚、法属圭亚那、乌拉圭、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁）
Neocapritermes parvus 微型新扭白蚁（巴西、巴拉圭）
Neocapritermes pumilis 侏儒新扭白蚁（哥伦比亚、巴西、法属圭亚那、厄瓜多尔）
Neocapritermes talpa 鼹鼠新扭白蚁（巴西、玻利维亚、哥伦比亚、法属圭亚那、秘鲁）
Neocapritermes talpoides 似鼹鼠新扭白蚁（哥伦比亚、巴西、玻利维亚、厄瓜多尔、委内瑞拉）
Neocapritermes taracua 塔拉夸新扭白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、厄瓜多尔、委内瑞拉、秘鲁）
Neocapritermes unicornis 独角新扭白蚁（巴西）
Neocapritermes utiariti 乌蒂亚里蒂新扭白蚁（巴西、哥伦比亚、秘鲁）
Neocapritermes villosus 密毛新扭白蚁（秘鲁、巴西、厄瓜多尔）

平扭白蚁属 *Planicapritermes*

Planicapritermes longilabrum 长唇平扭白蚁（巴西）
**Planicapritermes planiceps* 平头平扭白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、玻利维亚、厄瓜多尔、苏里南、委内瑞拉）

不对称白蚁属 *Schievitermes*

**Schievitermes globicornis* 球角不对称白蚁（法属圭亚那）

前奇白蚁亚科 Promirotermitinae

前奇白蚁亚科由 Hellemans、Engel 与 Bourguignon 于 2024 年建立[21]，模式属为前奇白蚁属 *Promirotermes* Silvestri, 1914；亚科名源自模式属名。本名录收录 2 属 39 种。

食性为腐殖质（土壤）食性，南非克鲁格国家公园环境梯度调查将前奇白蚁属归为土壤—腐殖质取食类群[72]。本亚科广布旧热带界与东洋界，角白蚁属西延至中东，为亚科内的多样化主体。兵蚁头矩形至卵形，上颚为对称弹颚，额部具明显突起——角白蚁属呈尖突、前奇白蚁属呈钝丘——并伴分叉状上唇，是与近似的弓白蚁亚科相区别的重要特征；后肠回肠（P1）常膨大成囊。工蚁—有翅蚁型右上颚第二缘齿发达，可与右上颚第二缘齿退化或缺失的近缘类群相区别；后肠马氏管两对共基愈合，为其工蚁后肠的稳定鉴别特征。



Angulitermes fletcheri 弗莱彻角白蚁（https://www.inaturalist.org/observations/154536789）

角白蚁属 *Angulitermes*

Angulitermes acutus 锋利角白蚁（印度）
Angulitermes akhorisainensis 艾豪瑞赛恩角白蚁（印度）
Angulitermes arabiae 阿拉伯角白蚁（沙特阿拉伯）
Angulitermes asirensis 阿西尔角白蚁（沙特阿拉伯）
Angulitermes bhagsunagensis 珀格苏纳格角白蚁（印度）
Angulitermes braunsi 布劳恩斯角白蚁（南非）
Angulitermes ceylonicus 锡兰角白蚁（斯里兰卡）
Angulitermes dehraensis 德拉敦角白蚁（巴基斯坦、阿富汗、印度）
Angulitermes elsenburgi 埃尔森伯格角白蚁（南非）
Angulitermes emersoni 埃默森角白蚁（孟加拉国）
Angulitermes fletcheri 弗莱彻角白蚁（印度）
**Angulitermes frontalis* 显额角白蚁（博茨瓦纳、南非）
Angulitermes hussaini 侯赛因角白蚁（巴基斯坦）
Angulitermes kashmirensis 克什米尔角白蚁（印度）
Angulitermes keralai 喀拉拉角白蚁（印度）
Angulitermes longifrons 长额角白蚁（印度）
Angulitermes jodhpurensis 焦特布尔角白蚁（印度）
Angulitermes mishrai 米什拉角白蚁（印度）
Angulitermes nepalensis 尼泊尔角白蚁（尼泊尔）
Angulitermes nilensis 尼罗角白蚁（塞内加尔、厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、苏丹、坦桑尼亚）
Angulitermes obtusus 迟钝角白蚁（印度）
Angulitermes paanensis 帕安角白蚁（缅甸）
Angulitermes punjabensis 旁遮普角白蚁（巴基斯坦）
Angulitermes quadriceps 方头角白蚁（以色列、沙特阿拉伯、也门）
Angulitermes ramanii 拉曼角白蚁（印度）
Angulitermes rathorai 拉托拉角白蚁（印度）

Angulitermes resimus 高鼻角白蚁（缅甸）
Angulitermes tilaki 蒂拉克角白蚁（印度）
Angulitermes truncatus 伤残角白蚁（塞内加尔、加纳、肯尼亚、尼日利亚、沙特阿拉伯、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚）

前奇白蚁属 *Promirotermes*

Promirotermes bechuana 贝专纳前奇白蚁（南非）
Promirotermes bellicosi 勇猛前奇白蚁（肯尼亚、坦桑尼亚）
Promirotermes dumisae 杜米萨前奇白蚁（南非）
Promirotermes gracilipes 细足前奇白蚁（刚果民主共和国、刚果共和国、肯尼亚、乌干达）
**Promirotermes holmgreni* 霍姆格伦前奇白蚁（塞内加尔、几内亚比绍、加纳、科特迪瓦、多哥、尼日利亚、喀麦隆）
holmgreni 指名亚种
infera 下亚种
Promirotermes massaicus 马萨前奇白蚁（肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚）
Promirotermes orthoceps 直头前奇白蚁（刚果民主共和国）
Promirotermes pygmaeus 短小前奇白蚁（刚果民主共和国、马拉维、乌干达）
Promirotermes redundans 常见前奇白蚁（喀麦隆、多哥、冈比亚、加纳、几内亚、尼日利亚、塞内加尔）
Promirotermes rotundifrons 圆额前奇白蚁（博茨瓦纳、南非）

始钩白蚁亚科 Protohamitermitinae

始钩白蚁亚科由 Hellemans、Engel 与 Bourguignon 于 2024 年建立[21]，模式属为始钩白蚁属 *Protohamitermes* Holmgren, 1912；亚科名源自模式属名（proto-，“原始” + *Hamitermes*，后者含拉丁语 hamus，“钩”）。本名录收录 2 属 2 种。

本亚科为东洋界特有的寡型类群。两属均分布于东南亚（文莱、马来西亚、印度尼西亚）。两属均无兵蚁，工蚁取食朽木；其长管状回肠（P1）在直肠腹面卷成环，与圆筒白蚁亚科及部分尖白蚁亚科相似，后肠马氏管以两对结节连于混合段。工蚁右上颚第一、二缘齿基部各具一发达的副齿，副齿前缘成角、后缘弧形，为本亚科工蚁最关键的鉴别特征；以此可区别于具兵蚁的圆筒白蚁亚科。因无兵蚁品级、形态特化，该亚科长期分类位置未定；分子分析显示两属构成单系群[21]。作为无兵蚁高等白蚁的东洋界代表，本亚科对理解兵蚁品级丢失的平行演化有一定意义。



Protohamitermes globiceps 球头始钩白蚁
(https://termitesandants.blogspot.com/2012/01/protohamitermes-globiceps.html?google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D82e5a5dc219f5065:TM%3D1792214473:C%3Dr:IP%3D13.113.236.194-:S%3Do9CuddYi7nfZY99409sXOEo%3B+path%3D/%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat,+17-Oct-2026+08:21:13+GMT)

东方白蚁属 *Orientotermes*

**Orientotermes emersoni* 埃默森东方白蚁（文莱、马来西亚）

始钩白蚁属 *Protohamitermes*

**Protohamitermes globiceps* 球头始钩白蚁（文莱、印度尼西亚、马来西亚）

圆球白蚁亚科 Sphaerotermitinae

圆球白蚁亚科由 Engel 与 Krishna 于 2004 年建立[73]，模式属为圆球白蚁属 *Sphaerotermes* Holmgren, 1911；亚科名源自模式属名（希腊语 sphaira，“球”），唯一种圆胸圆球白蚁 *S. sphaerothorax* (Sjöstedt, 1911) 的种名亦指其球形的胸部。本名录收录 1 属 1 种。

本亚科为旧热带界（西非—中非）特有，唯一种的分布涵盖刚果（布）、喀麦隆、中非共和国、安哥拉、刚果民主共和国、加蓬、几内亚与尼日利亚，野外采样集中于喀麦隆低地雨林。生物学上极为特殊：该种构筑地表冢巢，巢内不培植大白蚁亚科那样的真菌菌圃，而是培育富含细菌的“菌圃”作为食物；巢以黏土与细沙混合构筑，结构致密。形态上，兵蚁头两侧浑圆，囟门小而不显著、位于头面中部；上唇两侧圆、前端具透明尖；左上颚近基部具数枚细齿和一枚钝齿，右上颚内缘光滑无齿；前胸背板远窄于头部，前、侧缘平直而无突起的刺。工蚁右上颚咀嚼板具 6–7 条脊，上唇通体骨化、无大白蚁亚科那样的横列骨化带，后唇基强烈隆起并具中纵线；其 P3（胃）与 P4（结肠）交界处着生显著的后向刚毛，为白蚁中仅有一例。有翅蚁囟门浅色、细小如点。系统发育上，多项分子分析表明本亚科为大白蚁亚科的姊妹群，在高等白蚁早期分化中占据关键位置，对理解高等白蚁食性演化有重要意义。生态上，其冢巢是喀麦隆雨林黑猩猩“钓白蚁”行为的主要利用对象之一[74]。





Sphaerotermes sphaerothorax 圆胸圆球白蚁（https://www.inaturalist.org/observations/339437267）

圆球白蚁属 *Sphaerotermes*

**Sphaerotermes sphaerothorax* 圆胸圆球白蚁（刚果（布）、喀麦隆、中非共和国、安哥拉、刚果民主共和国、加蓬、几内亚、尼日利亚）

聚白蚁亚科 Syntermitinae

聚白蚁亚科由 Engel 与 Krishna 于 2004 年建立[73]，模式属为聚白蚁属 *Syntermes* Holmgren, 1909；亚科名源自模式属名。本名录收录 22 属 105 种。

本亚科许多物种兵蚁既具类似象白蚁亚科的象鼻（但不具备喷射能力），又保留发达的咀嚼—劈砍型上颚，为本科中独特的中间防御形态，另一部分物种则只有强大的大颚，并没有象鼻。本亚科为新热

带界特有：北界达墨西哥（弃白蚁属 *Cahuallitermes*）与中美洲（哥斯达黎加、巴拿马、危地马拉、伯利兹、洪都拉斯、尼加拉瓜），南至阿根廷北部、乌拉圭，以巴西为分布中心，玻利维亚、秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉及圭亚那地盾诸国均有代表。多数属行土栖生活，不少种类构筑显著的地表冢巢，在南美稀树草原为优势白蚁类群；食性以土壤—木材界面有机质、腐殖质及枯草为主。工蚁后肠混合段为双叶、重叠于回肠（P1）之外（仅前角白蚁属 *Procornitermes* 退化为单叶），肠瓣内壁鳞膜具棘刺（仅聚白蚁属 *Syntermes* 退化）。兵蚁象鼻发达、顶端平截，额孔宽大明显，上唇狭而简单、前端透明。有翅蚁囟门大而圆、微凹或呈凸板状，后唇基中度至强烈隆起并具中纵线，前翅前缘脉（R1）短，跗端无中垫。[3]

经济上，本亚科是巴西农业与林业的重要地下害虫类群：讨厌聚白蚁 *S. molestus* 为害菠萝、棉花、稻、玉米与桉树人工林幼苗，并有马铃薯根部严重为害的首报记录[75]；成堆角象白蚁 *Cornitermes cumulans* 是南美牧场著名的“cupim-de-montículo”，密集出没牧场、公路边与桉树林，并在巴西马托格罗索州造成柚木（*Tectona grandis*）人工林茎干损伤[76]；前角白蚁属在阿根廷玉米田有发生记录。*Procornitermes* 与 *Labiotermes* 在巴西危害旱稻、玉米[42]。



Rhynchotermes perarmatus 全武喙白蚁（https://www.inaturalist.org/observations/396238969）

漏斗白蚁属 *Acangaobitermes*

**Acangaobitermes krishnai* 克里希纳漏斗白蚁（巴西）

戟白蚁属 *Armitermes*

**Armitermes armiger* 具戟戟白蚁（巴拿马、哥斯达黎加）

Armitermes bidentatus 双齿戟白蚁（巴西）

Armitermes spininotus 刺背戟白蚁（巴西）

班代拉白蚁属 *Bandeiratermes*

**Bandeiratermes silvestrii* 西尔韦斯特里班代拉白蚁（巴西、玻利维亚、巴拉圭）

Bandeiratermes tellustris 大地班代拉白蚁（巴西）

拜拉白蚁属 *Biratermes*

**Biratermes robustus* 粗壮拜拉白蚁（法属圭亚那、巴西）

弃白蚁属 *Cahuallitermes*

Cahuallitermes aduncus 具钩弃白蚁（墨西哥）

**Cahuallitermes intermedius* 中间弃白蚁（墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、伯利兹）

角象白蚁属 *Cornitermes*

Cornitermes acignathus 尖颚角象白蚁（哥斯达黎加、哥伦比亚、巴拿马、厄瓜多尔）

Cornitermes bequaerti 贝奎特角象白蚁（巴西、玻利维亚、巴拉圭）

Cornitermes bolivianus 玻利维亚角象白蚁（巴西、哥伦比亚、玻利维亚、秘鲁、厄瓜多尔、委内瑞拉）

**Cornitermes cumulans* 成堆角象白蚁（巴西、阿根廷、巴拉圭、哥伦比亚、玻利维亚、厄瓜多尔）

Cornitermes falcatus 弯钩角象白蚁（巴西）

Cornitermes incisus 切割角象白蚁（巴西）

Cornitermes ovatus 卵形角象白蚁（巴西、哥伦比亚）

Cornitermes pilosus 多毛角象白蚁（巴西、秘鲁、哥伦比亚、玻利维亚）

Cornitermes pugnax 好斗角象白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、秘鲁、圭亚那、苏里南、厄瓜多尔、委内瑞拉）

Cornitermes silvestrii 西尔韦斯特里角象白蚁（巴西、玻利维亚）

Cornitermes snyderi 斯奈德角象白蚁（巴西、哥伦比亚、玻利维亚、厄瓜多尔）

Cornitermes villosus 密毛角象白蚁（巴西）

Cornitermes walkeri 沃克角象白蚁（哥斯达黎加、巴拿马、哥伦比亚）

Cornitermes weberi 韦伯角象白蚁（巴西、法属圭亚那、圭亚那、苏里南）

曲白蚁属 *Curvitermes*

Curvitermes minor 小型曲白蚁（巴西、玻利维亚）

**Curvitermes odontognathus* 齿颚曲白蚁（巴西、哥伦比亚、玻利维亚、厄瓜多尔）

壶头白蚁属 *Cyrilliotermes*

**Cyrilliotermes angulariceps* 角头壶头白蚁（南美洲、巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、苏里南、秘鲁、厄瓜多尔）

Cyrilliotermes brevidens 短齿壶头白蚁（巴西）

Cyrilliotermes crassinasus 粗鼻壶头白蚁（巴西）

Cyrilliotermes strictinasus 缩鼻壶头白蚁（南美洲、巴西）

生白蚁属 *Embiratermes*

Embiratermes benjamini 本杰明生白蚁（玻利维亚、委内瑞拉）

Embiratermes chagresi 查格雷斯生白蚁（哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜）

**Embiratermes festivellus* 喜庆生白蚁（巴西）

Embiratermes heterotypus 异型生白蚁（巴西、阿根廷、巴拉圭）

Embiratermes latidens 宽齿生白蚁（巴西、玻利维亚、哥伦比亚、巴拉圭、秘鲁、苏里南、委内瑞拉）

Embiratermes neotenicus 幼态生白蚁（秘鲁、巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、苏里南、厄瓜多尔、玻利维亚、圭亚那、委内瑞拉）

Embiratermes snyderi 斯奈德生白蚁（法属圭亚那、圭亚那）
Embiratermes spissus 密实生白蚁（哥伦比亚、秘鲁、巴西、厄瓜多尔、圭亚那、委内瑞拉）
Embiratermes transandinus 安弟斯生白蚁（巴西、厄瓜多尔、委内瑞拉）

膝白蚁属 *Genuotermes*

**Genuotermes spinifer* 具脊膝白蚁（巴西）

地球白蚁属 *Ibitermes*

Ibitermes curupira 长毛地球白蚁（巴西、玻利维亚）
**Ibitermes inflatus* 高唇基地球白蚁（巴西）

厚唇白蚁属 *Labiotermes*

Labiotermes brevilabius 短唇厚唇白蚁（巴西、玻利维亚）
Labiotermes emersoni 埃默森厚唇白蚁（巴西、玻利维亚、阿根廷、巴拉圭）
Labiotermes guasu 大厚唇白蚁（巴西、哥伦比亚、秘鲁）
**Labiotermes labralis* 细唇厚唇白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、特立尼达和多巴哥、玻利维亚）
Labiotermes laticephalus 宽头厚唇白蚁（巴西、玻利维亚、巴拉圭、阿根廷）
Labiotermes leptothrix 纤毛厚唇白蚁（巴西、哥伦比亚）
Labiotermes longilabius 长唇厚唇白蚁（巴西、法属圭亚那、巴拉圭）
Labiotermes oreadicus 山神厚唇白蚁（巴西）
Labiotermes orthocephalus 直头厚唇白蚁（巴西、巴拉圭）
Labiotermes pelliceus 毛头厚唇白蚁（巴西、哥伦比亚、圭亚那、玻利维亚、厄瓜多尔、秘鲁）

马库希白蚁属 *Macuxitermes*

Macuxitermes colombicus 哥伦比亚马库希白蚁（新热带哥伦比亚）
**Macuxitermes triceratops* 三角马库希白蚁（巴西）

红懒白蚁属 *Mapinguaritermes*

Mapinguaritermes grandidens 大齿红懒白蚁（哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、巴西）
Mapinguaritermes marizalensis 马里扎尔红懒白蚁（巴西）
**Mapinguaritermes peruanus* 秘鲁红懒白蚁（秘鲁、新热带界、厄瓜多尔）

努瓦罗白蚁属 *Noirotitermes*

**Noirotitermes noiroti* 努瓦罗努瓦罗白蚁（巴西）

近曲白蚁属 *Paracurvitermes*

**Paracurvitermes manni* 曼近曲白蚁（巴西、玻利维亚）

前角白蚁属 *Procornitermes*

Procornitermes araujoi 阿劳若前角白蚁（巴西）
Procornitermes lespesii 莱佩斯前角白蚁（巴西、玻利维亚、巴拉圭、阿根廷）
Procornitermes romani 罗曼前角白蚁（巴西）
Procornitermes striatus 具沟前角白蚁（阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭）
**Procornitermes triacifer* 三尖唇前角白蚁（巴西、阿根廷、玻利维亚、巴拉圭）

喙白蚁属 *Rhynchotermes*

Rhynchotermes amazonensis 亚马孙喙白蚁（哥伦比亚、巴西）
Rhynchotermes armatus 武装喙白蚁（哥伦比亚）

Rhynchotermes bulbinasus 葱鼻喙白蚁（哥伦比亚）
Rhynchotermes diphyes 黑白喙白蚁（巴西）
Rhynchotermes matraga 马特拉加喙白蚁（巴西）
**Rhynchotermes nasutissimus* 巨鼻喙白蚁（巴西、玻利维亚、巴拉圭、阿根廷、秘鲁）
Rhynchotermes perarmatus 全武喙白蚁（哥斯达黎加、巴拿马、厄瓜多尔、哥伦比亚、伯利兹、危地马拉）
Rhynchotermes piauy 皮奥伊喙白蚁（巴西）

西尔韦斯特里白蚁属 *Silvestritermes*

Silvestritermes almirsateri 阿尔米尔萨特尔西尔韦斯特里白蚁（巴西）
Silvestritermes duende 精灵西尔韦斯特里白蚁（巴西）
**Silvestritermes euamignathus* 真弓颚西尔韦斯特里白蚁（巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、玻利维亚、巴拉圭）
Silvestritermes gnomus 标记西尔韦斯特里白蚁（巴西、厄瓜多尔）
Silvestritermes heyeri 海耶尔西尔韦斯特里白蚁（哥伦比亚、法属圭亚那、巴西、秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）
Silvestritermes lanei 莱恩西尔韦斯特里白蚁（巴西）
Silvestritermes minutus 最小西尔韦斯特里白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁）

聚白蚁属 *Syntermes*

Syntermes aculeosus 胸刺聚白蚁（巴西、秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、法属圭亚那、委内瑞拉、哥伦比亚、苏里南、圭亚那）
Syntermes barbatus 倒钩聚白蚁（巴西）
Syntermes bolivianus 玻利维亚聚白蚁（玻利维亚、阿根廷）
Syntermes brevimalatus 短颚聚白蚁（哥伦比亚、圭亚那）
Syntermes calvus 无毛聚白蚁（巴西、法属圭亚那、圭亚那）
Syntermes cearensis 塞阿腊聚白蚁（巴西、玻利维亚）
Syntermes chaquimayensis 查基马约聚白蚁（哥伦比亚、玻利维亚、巴西、秘鲁、厄瓜多尔）
Syntermes crassilabrum 厚唇聚白蚁（哥伦比亚、巴西）
**Syntermes dirus* 可怕聚白蚁（巴西）
Syntermes grandis 大聚白蚁（巴西、法属圭亚那、苏里南、委内瑞拉、玻利维亚、圭亚那）
Syntermes insidians 隐蔽聚白蚁（巴西）
Syntermes longiceps 长头聚白蚁（巴西、哥伦比亚）
Syntermes magnoculus 大眼聚白蚁（巴西）
Syntermes molestus 讨厌聚白蚁（巴西、哥伦比亚、秘鲁、法属圭亚那、委内瑞拉、玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、苏里南）
Syntermes nanus 侏儒聚白蚁（巴西、哥伦比亚、阿根廷、玻利维亚、巴拉圭）
Syntermes obtusus 迟钝聚白蚁（巴西、巴拉圭、阿根廷、玻利维亚）
Syntermes parallelus 平行聚白蚁（巴西、委内瑞拉、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那）
Syntermes peruanus 秘鲁聚白蚁（巴西、玻利维亚、秘鲁）
Syntermes praecellens 优越聚白蚁（巴西、玻利维亚）

Syntermes spinosus 多刺聚白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、玻利维亚、苏里南、秘鲁、厄瓜多尔、委内瑞拉）
Syntermes tanygnathus 长颚聚白蚁（巴西、哥伦比亚）
Syntermes territus 受惊聚白蚁（哥伦比亚、法属圭亚那、巴西、圭亚那、苏里南、巴拿马、委内瑞拉）
Syntermes wheeleri 惠勒聚白蚁（巴西、巴拉圭）

弯钩白蚁属 *Uncitermes*

Uncitermes almeriae 阿尔梅里弯钩白蚁（秘鲁、厄瓜多尔）
**Uncitermes teevani* 蒂范弯钩白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、玻利维亚、苏里南、委内瑞拉、厄瓜多尔）

瓦宁白蚁属 *Vaninitermes*

Vaninitermes brevinasus 短鼻瓦宁白蚁（法属圭亚那、巴西、圭亚那）
**Vaninitermes ignotus* 忽视瓦宁白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、秘鲁）

白蚁亚科 Termitinae

白蚁亚科与白蚁科同时由 Latreille 于 1802 年建立，模式属为白蚁属 *Termes* Linnaeus, 1758。本名录收录 23 属 106 种。

本亚科大多物种兵蚁为咀嚼型：兵蚁上颚延长、齿少而大，以咬、切方式御敌；其中扭白蚁属 *Capritermes* 等上颚左右不对称，以“弹颚”方式高速击伤入侵者；也有 *Termes marjoriae* 钳白蚁这样对称弹颚的类型。分布概括为四大区系：澳洲界为一大分布区系，十余属主产澳大利亚（部分延及巴布亚新几内亚、所罗门群岛）；新热带界为另一大分布区系，广布墨西哥至南美；旧热带界亦有代表；东洋界仅 *Termes* 属少数种（马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、新加坡，及中国广东、云南景洪）。食性以木食与土壤腐殖食为主；客白蚁属 *Inquilinitermes* 为寄居性（inquiline）类群，栖居于其他白蚁属的巢内。工蚁上颚端齿长于或略短于第一、二缘齿之和，右上颚第二缘齿退化或缺失、后缘平直；两对马氏管并成一共用结节连于混合节，肠瓣（P2）位于腹部左侧（仅角扭白蚁属 *Cornicapritermes* 例外，其回肠在腹面成环、肠瓣位于右侧）。兵蚁头近长方形，额突大小因属而异。[3]

经济上，巴拉圭牧场调查中 *Termes* sp. 的冢巢减少牧场有效利用面积 [77]。伊斯帕尼奥拉白蚁 *Termes hispaniolae* 有引入巴哈马的记录。



Termes hispaniolae 伊斯帕尼奥拉白蚁（https://www.inaturalist.org/observations/104975694）

后肠白蚁属 *Apsenterotermes*

Apsenterotermes aspersus 散乱后肠白蚁（澳大利亚）

Apsenterotermes declinatus 长弯后肠白蚁（澳大利亚）

Apsenterotermes improcerus 粗短后肠白蚁（澳大利亚）

**Apsenterotermes iridipennis* 虹翅后肠白蚁（澳大利亚）

Apsenterotermes stenopronos 细管后肠白蚁（澳大利亚）

扭白蚁属 *Capritermes*

**Capritermes capricornis* 山羊角扭白蚁（科特迪瓦、马达加斯加）

腔白蚁属 *Cavitermes*

Cavitermes parmae 帕尔马腔白蚁（巴西、厄瓜多尔）

Cavitermes parvicavus 小腔腔白蚁（巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔）

Cavitermes rozeni 罗森腔白蚁（巴西、厄瓜多尔）

Cavitermes simplicinervis 简灰腔白蚁（巴西）

**Cavitermes tuberosus* 肉瘤腔白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、特立尼达和多巴哥、玻利维亚、圭亚那、厄瓜多尔、委内瑞拉）

角扭白蚁属 *Cornicapritermes*

**Cornicapritermes mucronatus* 尖锐角扭白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚）

脊突白蚁属 *Cristatitermes*

Cristatitermes arenicola 沙栖脊突白蚁（澳大利亚）

Cristatitermes barretti 巴雷特脊突白蚁（澳大利亚）

**Cristatitermes carinatus* 颏突脊突白蚁（澳大利亚）

Cristatitermes froggatti 弗洛格特脊突白蚁（澳大利亚）

Cristatitermes pineaformis 松球脊突白蚁（澳大利亚）

Cristatitermes tutulatus 毛头脊突白蚁（澳大利亚）

双戟白蚁属 *Dihoplotermes*

**Dihoplotermes inusitatus* 非凡双戟白蚁（南美洲、巴西、法属圭亚那、阿根廷、玻利维亚、巴拉圭、乌拉圭）

Dihoplotermes taurus 公牛双戟白蚁（巴西）

迪维努白蚁属 *Divinotermes*

**Divinotermes allognathus* 异颚迪维努白蚁（巴西）

Divinotermes digitatus 具指迪维努白蚁（巴西）

Divinotermes tuberculatus 小瘤迪维努白蚁（巴西、玻利维亚）

瘤突白蚁属 *Ekphysotermes*

Ekphysotermes jarmuranus 贾穆瘤突白蚁（澳大利亚）

**Ekphysotermes kalgoorliensis* 卡尔古利瘤突白蚁（澳大利亚）

Ekphysotermes ocellaris 眼显瘤突白蚁（澳大利亚）

Ekphysotermes pelatus 脱皮瘤突白蚁（澳大利亚）

Ekphysotermes percomis 可爱瘤突白蚁（澳大利亚）

棒颚白蚁属 *Ephelotermes*

Ephelotermes argutus 清楚棒颚白蚁（澳大利亚）

Ephelotermes cheeli 奇尔棒颚白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）

**Ephelotermes melachoma* 黑垄棒颚白蚁（澳大利亚）

Ephelotermes paleatus 深颏棒颚白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）

Ephelotermes persimilis 相似棒颚白蚁（澳大利亚）

Ephelotermes taylori 泰勒棒颚白蚁（澳大利亚）

络白蚁属 *Hapsidotermes*

**Hapsidotermes harrisi* 哈里斯络白蚁（澳大利亚）

Hapsidotermes labellus 小唇络白蚁（澳大利亚）

Hapsidotermes longius 较长络白蚁（澳大利亚）

Hapsidotermes maideni 梅登络白蚁（澳大利亚）

Hapsidotermes orbus 孤儿络白蚁（澳大利亚）

西澳白蚁属 *Hesperotermes*

**Hesperotermes infrequens* 罕见西澳白蚁（澳大利亚）

客白蚁属 *Inquilinitermes*

**Inquilinitermes fur* 窃贼客白蚁（巴西）

Inquilinitermes inquilinus 旅居客白蚁（巴西、法属圭亚那、哥伦比亚、圭亚那）

Inquilinitermes johnchapmani 约翰查普曼客白蚁（玻利维亚）

Inquilinitermes microcerus 小角客白蚁（巴西）

小脊突白蚁属 *Lophotermes*

Lophotermes aduncus 钩状小脊突白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）

Lophotermes brevicephalus 短头小脊突白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）

Lophotermes crinitus 多毛小脊突白蚁（澳大利亚）

Lophotermes leptognathus 细颚小脊突白蚁（澳大利亚）

Lophotermes parvicornis 小角小脊突白蚁（澳大利亚）

*_Lophotermes pectinatus_ 梳状小脊突白蚁（澳大利亚）
Lophotermes pusillus 极小小脊突白蚁（澳大利亚）
Lophotermes quadratus 方形小脊突白蚁（澳大利亚）
Lophotermes septentrionalis 北方小脊突白蚁（澳大利亚）

长颚白蚁属 *Macrognathotermes*

Macrognathotermes broomensis 布鲁姆长颚白蚁（澳大利亚）
*_Macrognathotermes errator_ 游荡长颚白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚）
Macrognathotermes prolatus 极长长颚白蚁（澳大利亚）
Macrognathotermes sunteri 森特长颚白蚁（澳大利亚）

棕榈白蚁属 *Palmitermes*

*_Palmitermes impostor_ 骗子棕榈白蚁（澳大利亚、巴西、法属圭亚那）

旁扭白蚁属 *Paracapritermes*

Paracapritermes kraepelinii 克雷珀林旁扭白蚁（澳大利亚）
*_Paracapritermes primus_ 第一旁扭白蚁（澳大利亚）
Paracapritermes prolixus 细长旁扭白蚁（澳大利亚）
Paracapritermes secundus 第二旁扭白蚁（澳大利亚）

始扭白蚁属 *Protocapritermes*

*_Protocapritermes krisiformis_ 波颚始扭白蚁（澳大利亚）
Protocapritermes odontomachus 齿颚始扭白蚁（澳大利亚、巴布亚新几内亚、所罗门群岛）

相似白蚁属 *Quasitermes*

*_Quasitermes incisus_ 切割相似白蚁（马达加斯加）

石白蚁属 *Saxatilitermes*

*_Saxatilitermes saxatilis_ 石栖石白蚁（澳大利亚）

针刺白蚁属 *Spinitermes*

Spinitermes brevicornutus 短角针刺白蚁（法属圭亚那、哥伦比亚、阿根廷、玻利维亚、巴西、巴拉圭）
Spinitermes longiceps 长头针刺白蚁（巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔）
Spinitermes nigrostomus 黑嘴针刺白蚁（巴西、委内瑞拉、玻利维亚、圭亚那、秘鲁、苏里南）
Spinitermes robustus 粗壮针刺白蚁（巴西、玻利维亚）
*_Spinitermes trispinosus_ 三针针刺白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、巴拉圭、秘鲁、委内瑞拉）

白蚁属 *Termes*

Termes amaralii 阿马拉利白蚁（圣多美和普林西比）
Termes atlanticus 大西洋白蚁（哥伦比亚）
Termes ayri 艾尔白蚁（巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、法属圭亚那、秘鲁、委内瑞拉）
Termes baculi 巴舍尔白蚁（旧热带界、喀麦隆、尼日利亚、刚果民主共和国、加蓬、几内亚、科特迪瓦、苏丹）
Termes baculiformis 似巴舍尔白蚁（马达加斯加）
Termes bolivianus 玻利维亚白蚁（法属圭亚那、巴西、巴拉圭、玻利维亚、阿根廷、秘鲁）
Termes boultoni 博尔顿白蚁（赞比亚、津巴布韦）
Termes brevicornis 短角白蚁（马来西亚）

Termes capensis 好望角白蚁（南非）
Termes chocoensis 乔科白蚁（哥伦比亚）
Termes comis 友好白蚁（印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南）
**Termes fatalis* 祸根白蚁（新热带界、巴西、哥伦比亚、法属圭亚那等南美北部、玻利维亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉）
Termes hispaniolae 伊斯帕尼奥拉白蚁（新热带界、中美洲及加勒比、南美北部广泛分布、伯利兹、玻利维亚、巴西、开曼群岛、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、格林纳达、瓜德罗普（法）、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、马提尼克（法）、墨西哥、蒙特塞拉特、荷属安的列斯、尼加拉瓜、巴拿马、波多黎各、圣基茨和尼维斯、安圭拉、圣卢西亚、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉、美属维尔京群岛、引入：巴哈马）
Termes hospes 宿主白蚁（旧热带界、刚果民主共和国、塞内加尔、喀麦隆、加蓬、加纳、几内亚、科特迪瓦、肯尼亚、尼日利亚、乌干达）
Termes huayangensis 怀阳白蚁（中国广东、华阳、泰国）
Termes laticornis 宽角白蚁（印度尼西亚、马来西亚、越南）
Termes major 较大白蚁（泰国）
Termes marjoriae 钳白蚁（云南（景洪 500 m）；缅甸、中国）
Termes medioculatus 中推白蚁（巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉、秘鲁）
Termes melindae 梅林达白蚁（中美洲、墨西哥、伯利兹、开曼群岛）
Termes nigritus 黑色白蚁（巴西、阿根廷、巴拉圭）
Termes panamaensis 巴拿马白蚁（哥伦比亚、巴拿马、厄瓜多尔、哥斯达黎加、危地马拉、墨西哥、尼加拉瓜、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉、美属维尔京群岛）
Termes propinquus 邻近白蚁（印度尼西亚、马来西亚、泰国）
Termes riograndensis 里奥格兰德白蚁（阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭）
Termes rostratus 尖鼻白蚁（东南亚、泰国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡）
Termes splendens 明亮白蚁（加纳）

小瘤白蚁属 *Tuberculitermes*

**Tuberculitermes bycanistes* 噪犀鸟小瘤白蚁（旧热带界、塞内加尔等西非）
Tuberculitermes flexuosus 弯曲小瘤白蚁（西非、布基纳法索）
Tuberculitermes guineensis 几内亚小瘤白蚁（喀麦隆、加纳、几内亚、尼日利亚、苏丹）

木堆白蚁属 *Xylochomitermes*

Xylochomitermes aspinosus 无刺木堆白蚁（澳大利亚）
Xylochomitermes melvillensis 梅尔维尔木堆白蚁（澳大利亚）
**Xylochomitermes occidualis* 西部木堆白蚁（澳大利亚）
Xylochomitermes punctillus 点凶木堆白蚁（澳大利亚）
Xylochomitermes reductus 缩小木堆白蚁（澳大利亚）
Xylochomitermes tomentosus 粗毛木堆白蚁（澳大利亚）

参考文献

1. Desneux J. À propos de la phylogénie des Termitides. Ann Soc Entomol Belg. 1904;48(8):278-286.
2. Bourguignon T, Lo N, Cameron SL, Šobotník J, Hayashi Y, Shigenobu S, et al. The evolutionary history of termites as inferred from 66 mitochondrial genomes. Mol Biol Evol. 2015;32(2):406-421. doi: 10.1093/molbev/msu308.
3. Krishna K, Grimaldi DA, Krishna V, Engel MS. Treatise on the Isoptera of the world. Bull Am Mus Nat Hist. 2013;377:1-2704. doi: 10.1206/377.1.
4. Evans TA, Forschler BT, Grace JK. Biology of invasive termites: a worldwide review. Annu Rev Entomol. 2013;58:455-474. doi: 10.1146/annurev-ento-120811-153554.
5. Engel MS, Grimaldi DA, Krishna K. Termites (Isoptera): their phylogeny, classification, and rise to ecological dominance. Am Mus Novit. 2009;3650:1-27. doi: 10.1206/651.1.
6. Oregon State University Extension. Controlling dampwood termites [Internet]. [cited 2026 Oct 16]. Available from: https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/5999n3588
7. Harris WV. Termites of the genus *Anacanthotermes* in North Africa and the Near East (Isoptera: Hodotermitidae). Proc R Entomol Soc Lond B. 1967;36(5-6):79-86. doi: 10.1111/j.1365-3113.1967.tb00540.x.
8. Rouland-Lefèvre C. Termites as pests of agriculture. In: Bignell DE, Roisin Y, Lo N, editors. Biology of termites: a modern synthesis. Dordrecht: Springer; 2011. p. 499-517. doi: 10.1007/978-90-481-3977-4_18.
9. Khamraev AS, Lebedeva NI, Zuginisov TI, Abdullaev II, Rakhmatullaev A, Raina AK. Food preferences of the Turkestan termite *Anacanthotermes turkestanicus* (Isoptera: Hodotermitidae). Sociobiology. 2007;50(2):469-478.
10. Mitchell JD. Termites as pests of crops, forestry, rangeland and structures in southern Africa and their control. Sociobiology. 2002;40(1):47-69.
11. Blattodea Species File. Hodotermopsidae Engel, 2021 [Internet]. [cited 2026 Oct 13]. Available from: https://cockroach.speciesfile.org/otus/1113412/overview
12. GBIF. *Hodotermopsis sjostedti* Holmgren, 1911 [Internet]. [cited 2026 Oct 13]. Available from: https://www.gbif.org/species/9564749
13. 智汇三农. 山林原白蚁 *Hodotermopsis sjostedti* [Internet]. [cited 2026 Oct 16]. Available from: https://www.pwsannong.com/c/2016-03-08/569768.shtml
14. Holmgren N. Das System der Termiten. Zool Anz. 1910;35(9-10):284-286.
15. Artigas JN, Villan L. Resistencia termitica de la madera a *Porotermes quadricollis* (Rambur), termita de la madera humeda (Isoptera, Termopsidae). Gayana (Concepc). 2009;73(1):1-11. doi: 10.4067/S0717-65382009000100001.
16. Engel MS. Family-group names for termites (Isoptera), redux. ZooKeys. 2011;148:171-184. doi: 10.3897/zookeys.148.1682.

17. Chouvenc T, Šobotník J, Engel MS, Bourguignon T. Termite evolution: mutualistic associations, key innovations, and the rise of Termitidae. Cell Mol Life Sci. 2021;78(6):2749-2769. doi: 10.1007/s00018-020-03728-z.

18. University of Florida IFAS Extension. Western drywood termite, *Incisitermes minor* (Hagen) (Insecta: Blattodea: Kalotermitidae) [Internet]. [cited 2026 Oct 13]. Available from: https://edis.ifas.ufl.edu/in526

19. Thirugnanasuntharan K, Jayachandran ICR. Distinctive morphological characters of termites in high and mid grown tea in Sri Lanka. Sri Lanka J Tea Sci. 1989;58(2):104-110.

20. Laffont ER. Daños de *Rugitermes* sp. (Isoptera: Kalotermitidae) en *Ilex paraguariensis*. AgriScientia. 2005;22(1):33-35. doi: 10.31047/1668.298x.v22.n1.2677.

21. Hellemans S, Rocha MM, Wang M, Romero Arias J, Aanen DK, Bagnères AG, et al. Genomic data provide insights into the classification of extant termites. Nat Commun. 2024;15:6724. doi: 10.1038/s41467-024-51028-y.

22. Termite Web. Termite pictures – *Prorhinotermes flavus* [Internet]. [cited 2026 Oct 13]. Available from: https://www.termiteweb.com/termite-pictures-prorhinotermes-flavus/

23. Hebrew University of Jerusalem, Robert H. Smith Faculty of Agriculture. *Psammotermes hypostoma* [Internet]. [cited 2026 Oct 16]. Available from: http://www.agri.huji.ac.il/mepests/pest/Psammotermes_hypostoma/

24. University of Florida IFAS Extension. Cuban subterranean termite, *Prorhinotermes simplex* [Internet]. [cited 2026 Oct 16]. Available from: https://ask.ifas.ufl.edu/publication/IN558

25. ABIS. *Schedorhinotermes* species [Internet]. [cited 2026 Oct 13]. Available from: https://abis.com.au/schedorhinotermes-spp/

26. Šobotník J, Bourguignon T, Hanus R, Sillam-Dussès D, Pflegerová J, Weyda F, et al. Not only soldiers have weapons: evolution of the frontal gland in imagoes of the termite families Rhinotermitidae and Serritermitidae. PLoS One. 2010;5(12):e15761. doi: 10.1371/journal.pone.0015761.

27. Liang WR, Wu CC, Li HF. Discovery of a cryptic termite genus, *Stylotermes* (Isoptera: Stylotermitidae), in Taiwan, with the description of a new species. Ann Entomol Soc Am. 2017;110(4):360-373. doi: 10.1093/aesa/sax034.

28. Wu LW, Bourguignon T, Šobotník J, Wen P, Liang WR, Li HF. Phylogenetic position of the enigmatic termite family Stylotermitidae (Insecta: Blattodea). Invertebr Syst. 2018;32(5):1111-1117. doi: 10.1071/IS17093.

29. Dolejšová K, Krasulová J, Kutalová K, Hanus R. Chemical alarm in the termite *Termitogeton planus* (Rhinotermitidae). J Chem Ecol. 2014;40(11-12):1269-1276. doi: 10.1007/s10886-014-0515-0.

30. Parmentier D, Roisin Y. Caste morphology and development in *Termitogeton* nr. planus (Insecta, Isoptera, Rhinotermitidae). J Morphol. 2003;255(1):69-79. doi: 10.1002/jmor.10047.

31. University of Florida IFAS Extension. Formosan subterranean termite, *Coptotermes formosanus* Shiraki [Internet]. [cited 2026 Oct 13]. Available from: https://entnemdept.ufl.edu/creatures/urban/termites/formosan_termite.htm

32. ISSG; IUCN. Global Invasive Species Database — Species profile: *Coptotermes formosanus* (Formosan subterranean termite) [Internet]. 2006 [cited 2026 Oct 16]. Available from: https://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=61

33. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. SN/T 1105-2014 大家白蚁检疫鉴定方法（Detection and identification of *Coptotermes curvignathus* Holmgren）[Internet]. 2014 [cited 2026 Oct 16]. Available from: https://www.spc.org.cn/online/d4e9d157567ff20cb7b25e6765fa4910.html

34. Constantino R. The pest termites of South America: taxonomy, distribution and status. J Appl Entomol. 2002;126(7-8):355-365. doi: 10.1046/j.1439-0418.2002.00670.x.

35. Bordereau C, Robert A, Van Tuyen V, Peppuy A. Suicidal defensive behaviour by frontal gland dehiscence in *Globitermes sulphureus* Haviland soldiers (Isoptera). Insectes Soc. 1997;44(3):289-297. doi: 10.1007/s000400050049.

36. Bodine MC, Ueckert DN. Effect of desert termites on herbage and litter in a shortgrass ecosystem in west Texas. J Range Manage. 1975;28(5):353-358. doi: 10.2307/3897490.

37. Watson JAL, Perry DH. The Australian harvester termites of the genus *Drepanotermes* (Isoptera, Termitinae). Aust J Zool Suppl Ser. 1981;29(78):1-153.

38. Kumar R. Termite, a new pest of potato in India. Indian Potato J. 1965;7(1):1-49.

39. Abdul Hafiz AM, Abu Hassan A. Foraging population, territory and control of *Globitermes sulphureus* (Isoptera: Termitidae) with fipronil in Penang, Malaysia. Malays Appl Biol. 2012;40(2).

40. Malaka SLO. Economic importance of termites: six case studies in Nigeria and Ghana. Nigerian Field. 1983;47(4):222-230.

41. Grassé PP, Noirot C. *Apicotermes arquieri* (Isoptère): ses constructions, sa biologie. Considérations générales sur la sous-famille des Apicotermitinae nov. Ann Sci Nat Zool. 1955;16(3-4):345-388.

42. Czepak C, Ferreira E, Nogueira SB. Identificação e quantificação de cupins rizófagos na cultura do arroz de sequeiro. Pesqui Agropecu Bras. 1993;28(8):871-875.

43. Amaral-Castro NR, Zanetti R, Moraes JC, Zanuncio JC. Species of soil inhabiting termites (Insecta: Isoptera) collected in *Eucalyptus* plantations in the State of Minas Gerais, Brazil. Sociobiology. 2004;44(3):717-727.

44. Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA/AGROFIT). Cupim (*Aparatermes abbreviatus*) — Controles Registrados [Internet]. [cited 2026 Oct 16]. Available from: https://arquivoagro.com.br/pragas/699

45. Rocha MM, Cuezzo C. Redescription of the monotypic Neotropical genus *Crepititermes* Emerson (Termitidae: Termitinae). Neotrop Entomol. 2015;44(5):457-465. doi:

10.1007/s13744-015-0307-4.

46. Roonwal ML, Verma SC. Evolution and systematic significance of wing micro-sculpturing in termites. IX. Subfamily Termitinae of family Termitidae. Proc Indian Natl Sci Acad B. 1980;46(4):455-469.

47. Mikaelyan A, Dietrich C, Köhler T, Poulsen M, Sillam-Dussès D, Brune A. Diet is the primary determinant of bacterial community structure in the guts of higher termites. Mol Ecol. 2015;24(20):5284-5295. doi: 10.1111/mec.13376.

48. Okwakol MJN. Effects of *Cubitermes testaceus* (Williams) on some physical and chemical properties of soil in a grassland area of Uganda. Afr J Ecol. 1987;25(3):147-153. doi: 10.1111/j.1365-2028.1987.tb01101.x.

49. Friedrich MW, Schmitt-Wagner D, Lueders T, Brune A. Axial differences in community structure of Crenarchaeota and Euryarchaeota in the highly compartmentalized gut of the soil-feeding termite *Cubitermes orthognathus*. Appl Environ Microbiol. 2001;67(10):4880-4890. doi: 10.1128/AEM.67.10.4880-4890.2001.

50. Kooyman C, Onck RFM. The interactions between termite activity, agricultural practices and soil characteristics in Kisii District, Kenya. Agricultural University Wageningen Papers 87-3. Wageningen: Wageningen Agricultural University; 1987.

51. Miranda CS, Vasconcellos A, Bandeira AG. Termites in sugar cane in Northeast Brazil: ecological aspects and pest status. Neotrop Entomol. 2004;33(2):237-241. doi: 10.1590/S1519-566X2004000200015.

52. Romero Arias J, Hellemans S, Kaymak E, Akama PD, Bourguignon T, Roisin Y, et al. Mitochondrial phylogenetics position a new Afrotropical termite species into its own subfamily, the Engelitermitinae (Blattodea: Termitidae). Syst Entomol. 2024;49(1):72-83. doi: 10.1111/syen.12607.

53. ICZN. Opinion 2038 (Case 3155): Macrotermitinae Kemner, 1934 (Insecta, Isoptera): precedence over Acanthotermitinae Sjöstedt, 1926. Bull Zool Nomencl. 2003;60(2):162.

54. Aanen DK, Eggleton P, Rouland-Lefèvre C, Guldberg-Frøslev T, Rosendahl S, Boomsma JJ. The evolution of fungus-growing termites and their mutualistic fungal symbionts. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002;99(23):14887-14892. doi: 10.1073/pnas.222313099.

55. Huang QY, Lei CL, Xue D. Field evaluation of a fipronil bait against subterranean termite *Odontotermes formosanus* (Isoptera: Termitidae). J Econ Entomol. 2006;99(2):455-461. doi: 10.1603/0022-0493-99.2.455.

56. 李茅苗. 白蚁对甘蔗的为害及防治措施. 植物医生. 2013;(2).

57. Rana A, Chandel RS, Verma KS, Joshi MJ. Termites in important crops and their management. Indian J Entomol. 2021;83(3):486-504. doi: 10.5958/0974-8172.2021.00001.8.

58. Deka B, Babu A, Peter AJ, Kumhar KC, Sarkar S, Rajbongshi H, et al. Potential of the entomopathogenic fungus, Metarhizium anisopliae s.l. in controlling live-wood eating

termite, *Microtermes obesi* (Holmgren) (Blattodea: Termitidae) infesting tea crop. Egypt J Biol Pest Control. 2021;31:132. doi: 10.1186/s41938-021-00477-4.

59. Habibpour B. Laboratory evaluation of Flurox, a chitin synthesis inhibitor, on the termite, *Microcerotermes diversus*. J Insect Sci. 2010;10:2. doi: 10.1673/031.010.0201.

60. Sales MJD, Matos WC, Reis YT, Ribeiro GT. Frequência e riqueza de cupins em áreas de plantio de eucalipto no litoral norte da Bahia. Pesqui Agropecu Bras. 2010;45(12):1351-1356. doi: 10.1590/S0100-204X2010001200003.

61. Kuan KC, Chiu CI, Shih MC, Chi KJ, Li HF. Termite's twisted mandible presents fast, powerful, and precise strikes. Sci Rep. 2020;10:9462. doi: 10.1038/s41598-020-66294-1.

62. Pinnamaneni R, Potineni K. Integrated pest management (IPM) in oil palm, *Elaeis guineensis* Jacq. In: Palm oil – current status and updates. London: IntechOpen; 2023. doi: 10.5772/intechopen.108580.

63. Hare L. Termite phylogeny as evidenced by soldier mandible development. Ann Entomol Soc Am. 1937;30(3):459-486. doi: 10.1093/aesa/30.3.459.

64. Nutting WL, Blum MS, Fales HM. Behavior of the North American termite *Tenuirostritermes tenuirostris*, with special reference to the soldier frontal gland secretion, its chemical composition, and use in defense. Psyche (Camb Mass). 1974;81:167-177. doi: 10.1155/1974/13854.

65. Coconut Research Institute (Sri Lanka). Termites and their control [Internet]. [cited 2026 Oct 13]. Available from: https://cri.gov.lk/wp-content/uploads/2021/10/b6.pdf

66. University of Florida IFAS Extension. Conehead termite, *Nasutitermes corniger* (Motschulsky) (Insecta: Blattodea: Termitidae: Nasutitermitinae) [Internet]. [cited 2026 Oct 13]. Available from: https://edis.ifas.ufl.edu/in1275

67. Ye F, Ke YL, Li ZQ. Revisiting a Chinese Endemic Termite Genus of Building Timber Pests: Mitochondrial Genomic and Morphological Dissection and Phylogenetic Positioning of *Xiaitermes* Gao & He, 1994 (Termitidae: Nasutitermitinae). Insects. 2026;17(6):602. doi: 10.3390/insects17060602.

68. Roonwal ML, Rathore NS. New termite pests of eucalyptus in India and their control. Z Angew Entomol. 1984;98(1-5):225-230. doi: 10.1111/j.1439-0418.1984.tb02705.x.

69. Lovleen, Prerna. Control measures for *Hospitalitermes monoceros*, a major pest of sugarcane by using medicinal plants. J Punjab Acad Forensic Med Toxicol. 2019;19(1):35-38. doi: 10.5958/0974-083X.2019.00007.4.

70. Šobotník J, Bourguignon T, Hanus R, Demianová Z, Pytelková J, Mareš M, et al. Explosive backpacks in old termite workers. Science. 2012;337(6093):436. doi: 10.1126/science.1219129.

71. Junqueira LK, Gonçalves ER, Teixeira LMC. Termite communities in sugarcane plantations in southeastern Brazil: an ecological approach. EntomoBrasilis. 2015;8(2):105-116. doi: 10.12741/ebrasilis.v8i2.502.

72. Lind BM, Hanan NP, Gigliotti LC, Allen RL, McHenry A, Gardiner A. Termite diversity along a catena in southern Kruger National Park, South Africa. Afr J Ecol. 2019;57(1):160-165. doi: 10.1111/aje.12569.

73. Engel MS, Krishna K. Family-group names for termites (Isoptera). Am Mus Novit. 2004;3432:1-9. doi: 10.1206/0003-0082(2004)432<0001:FNFTI>2.0.CO;2.

74. Andres-Bray TC, Smith J, Nichols I, Abwe EE, Gonder MK. Ecological correlates of chimpanzee termite fishing behavior in Mbam & Djerem National Park, Cameroon. Ecol Evol. 2024;14(7):e70080. doi: 10.1002/ece3.70080.

75. Silva GH, Godoi-Junior MA, Martins JVS, Ribeiro LS, Ribeiro JPO, Araújo FF, et al. First report the *Syntermes molestus* Burm. (1839) (Isoptera: Termitidae) causing severe mechanical damage to *Solanum tuberosum* roots. Braz J Biol. 2023;83:e269325. doi: 10.1590/1519-6984.269325.

76. Silva KL, Ladeia S, Nunes W, Santos ICL, Santos A. Occurrence of *Tectona grandis* stem injury caused by *Cornitermes cumulans* termite. Floresta Ambient. 2019;26(3):e20180356. doi: 10.1590/2179-8087.035618.

77. Cabaña Acosta ME, Alonzo Griffith LA, Gaona Mena E, Chamorro Díaz SM, Sarubbi-Orue H, Ruiz Samudio FP, et al. Incidencia y distribución de termiteros sobre pastizal: requisito previo para su manejo y control en condiciones de campo. Rev Investig Estud UNA. 2024;15(1):62-70. doi: 10.57201/ieuna2413372.