

Probabilités

I Langage des probabilités

1) Exemples de situations aléatoires

Situation 1 : On lance une fois un dé cubique non truqué et on note le nombre de points figurant sur la face supérieure lorsque le dé s'est immobilisé.

Situation 2 : On lance une fois un dé cubique non truqué portant un disque vert sur trois faces, un disque rouge sur une face, la lettre H sur une face et le chiffre 2 sur une face ; on note le résultat obtenu sur la face supérieure du dé lorsqu'il s'est immobilisé.

Situation 3 : On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes.

Dans chacune de ces situations on dispose de certaines informations mais le résultat ne peut pas être prévu à l'avance car le hasard intervient : il s'agit

2) Univers

Définition : Dans une expérience aléatoire, l'univers est l'ensemble de tous les résultats possibles.

En général l'univers est noté Ω .

Exemples :

Dans la situation 1 : $\Omega_1 = \dots\dots\dots$

Dans la situation 2 : $\Omega_2 = \dots\dots\dots$

Ω_3 est l'ensemble des 32 cartes du jeu.

3) Évènements

Définition : Un évènement est une partie de l'univers.

Exemple :

Dans la situation 1 « Obtenir un nombre strictement supérieur à 4 » correspond à l'ensemble $A = \dots\dots\dots$

Remarques :

- L'univers Ω est un cas particulier d'évènement, on l'appelle

- L'ensemble vide \emptyset est appelé, aucune issue ne le réalise.

- Certains évènements ne comporte qu'un seul élément on les appelle

Exemple : Dans la situation 1, $\{5\}$ est l'évènement élémentaire « obtenir la face 5 lors du lancer du dé ».

- l'évènement contraire de A est noté \overline{A} et il est constitué des éléments de Ω n'appartenant pas à A .

Exemple : Dans la situation 1 si $A = \{5, 6\}$ alors $\overline{A} = \dots\dots\dots$

II Calcul des probabilités

1) Définitions et exemples

Définition : Soit Ω un univers fini.

Définir une loi de probabilité sur Ω , c'est associer à chaque issue x_i un nombre p_i , positif ou nul de telle façon que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Ce nombre p_i est appelé probabilité de l'issue x_i .

Définition : La probabilité d'un événement A est noté $P(A)$ et est égale à la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

Propriétés :

1) $P(\emptyset) = 0$

2) $P(\Omega) = 1$

3) Pour tout événement A on a $0 \leq P(A) \leq 1$



2) Cas particulier : équiprobabilité

a) Définition :

L'équiprobabilité correspond au cas où tous les événements élémentaires ont la même probabilité.

Exemples : Les situations 1 et 3

La situation 2

b) Probabilité d'un événement élémentaire

Théorème : Dans le cas d'une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement élémentaire est égale à

$$\frac{1}{\text{nombre d'éléments de } \Omega}$$

Exemple : Dans la situation 3 l'événement A : « Obtenir le roi de cœur » a pour probabilité

c) Probabilité d'un événement quelconque

Théorème : Dans le cas d'une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'éléments de } A}{\text{nombre d'éléments de } \Omega} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$


Exemple : Dans la situation 3 l'événement A : « Obtenir un roi » a pour probabilité

3) Propriétés

Définition : Soient A et B deux événements

L'intersection de A et B est l'événement, noté $A \cap B$ formé des issues qui réalisent à la fois l'événement A et l'événement B


La réunion de A et B est l'événement, noté $A \cup B$ formé des issues qui réalisent à la fois l'événement A ou l'événement B , c'est-à-dire au moins l'un des deux.



a) Probabilité de la réunion d'événements disjoints

Définition : Deux événements A et B sont **disjoints** (on dit aussi **incompatibles**) si et seulement si $A \cap B = \emptyset$

Ici A et B sont disjoints



Exemple :

Dans la situation 1 on considère : $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{5, 6\}$ et $C = \{3, 4\}$

A et B sont disjoints car $A \cap B = \emptyset$

Par contre $A \cap C = \{3\}$ donc les événements A et C ne sont pas incompatibles.

On s'intéresse à la probabilité de l'événement $A \cup B$:

On a $A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 6\}$

Donc $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ et on remarque que $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Théorème : Pour tous événements **disjoints** A et B on a $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



b) Probabilité d'un événement contraire

Théorème : Pour tout événement A on a : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

Exemple : Si $P(A) = 0,2$ alors $P(\overline{A}) = 0,8$

c) Cas général

Toujours dans la situation 1 on considère $A = \{1, 2, 3\}$ et $C = \{3, 4\}$.

On a déjà vu que A et C ne sont pas disjoints. $A \cap C = \{3\}$

$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$P(C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$P(A \cap C) = \frac{1}{6}$

On a $A \cup C = \{1, 2, 3, 4\}$

donc $P(A \cup C) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ et on remarque que $P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C)$.

Théorème : Pour tous événements A et B on a $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$