

## Table of Contents

.....	1
Question1Ai) .....	1
Question1Aii) .....	2
Question1aiii) .....	2
Question1b) .....	3
Question2a) .....	4
Question2b) .....	4

```
function sub3
```

```
tol = 10^-5;
```

## Question1Ai)

```
f = @(x) (exp(x) + 2.^-x + 2*cos(x) -6);
I0 = [1,2];
[rootB1,iterationcountB1] = bisectionSearch(f,tol,I0);
[rootF1,iterationcountF1] = RegularfalsiSearch(f,tol,I0);

F=@(x)(exp(x) + 2.^-x + 2*cos(x) -6);
Fprime = @(x)(exp(x) - 2.^-x - 2*sin(x));
x0 = 1;
[rootN1,iterationcountN1] = Newtonmethodscalar(F,Fprime,x0,tol);
disp(' ')
disp('Question1ai)')
disp(' ')
fprintf('%5s %5s %15s\n', '          Method      ', 'root      ', '
Iteration count')
fprintf('%50s\n', '_____') %after
decimal point is how many decimal to include, letter is type, before
decimal is field width
fprintf('%50s\n', '_____')
fprintf('%15s %6.5f %4s %2i\n' , '          Bisection      ',rootB1, '
',iterationcountB1)
fprintf('%15s %6.5f %4s %2i\n' , '          False position',rootF1, '
',iterationcountF1)
fprintf('%15s %6.5f %4s %2i\n' , '          Newton        ',rootN1, '
',iterationcountN1)
```

Question1ai)

<i>Method</i>	<i>root</i>	<i>Iteration count</i>
<i>Bisection</i>	<i>1.82938</i>	<i>15</i>
<i>False position</i>	<i>1.82938</i>	<i>5</i>

## Question1Aii)

```
f = @(x) (1-(2/(x.^2 -2*x +2)));
I0 = [-1,1];
[rootB2,iterationcountB2] = bisectionSearch(f,tol,I0);
[rootF2,iterationcountF2] = RegularfalsiSearch(f,tol,I0);

F=@(x) (1-(2/(x.^2 -2*x +2)));
Fprime = @(x)((2/((x.^2 -2*x +2).^2))*(2*x -2));
x0 = 0.5;
[rootN2,iterationcountN2] = Newtonmethodscalar(F,Fprime,x0,tol);
disp(' ')
disp('Question1aii)')
disp(' ')
fprintf('%5s %5s %15s\n', '          Method      ', 'root      ', '
Iteration count')
fprintf('%50s\n', '_____')
fprintf('%50s\n', '_____')
fprintf('%15s %6.5f %4s %2i\n', '          Bisection      ',rootB2,'
',iterationcountB2)
fprintf('%15s %6.5f %4s %2i\n', '          False position',rootF2,'
',iterationcountF2)
fprintf('%15s %6.5f %4s %2i\n', '          Newton          ',rootN2,'
',iterationcountN2)

Question1aii)
```


Method	root	Iteration count
Bisection	-0.00001	16
False position	-0.00000	6
Newton	0.00000	3

## Question1aiii)

```
f = @(x) (exp(x) + 2.^-x + 2*cos(x) -6);
F=@(x)(exp(x) + 2.^-x + 2*cos(x) -6);
Fprime = @(x)(exp(x) - 2.^-x - 2*sin(x));
x0=1;
I0 = [1,2];

disp(' ')
disp('Question1aiii) (graph on next page)')
disp(' ')
plotting(f,tol,I0,F,Fprime,x0)

Question1aiii) (graph on next page)
```



## Question1b)

```

disp(' ')
disp('Question1b')
disp(' ')

f = @(x) (x - (tan(x)));
I0 = [0,2];
[rootB1,iterationcountB1] = bisectionSearch(f,tol,I0);
I0 = [2,5];
[rootB2,iterationcountB1] = bisectionSearch(f,tol,I0);
I0 = [5,8];
[rootB3,iterationcountB1] = bisectionSearch(f,tol,I0);
I0 = [7,10];
[rootB4,iterationcountB1] = bisectionSearch(f,tol,I0);

disp('Using the Bisection method, the roots are ')
disp(rootB1); disp( rootB2); disp( rootB3);

```

*Question1b)*

*Using the Bisection method, the roots are*  
*7.6294e-06*

---

4.4934

7.7253

## Question2a)

```
disp(' ')
disp('%%Question2a)')
disp(' ')
tol = 10^-5;
x0 = [1;1;1];
F = @(x,y,z)[(sin(x)+y.^2+log(z)-7);(3*x+2.^y-z.^3+1);(x+y+z-5)];
J = @(x,y,z)[cos(x), 2*y , 1/z; 3, log(2)*2.^y, -3*z.^2; 1, 1, 1];
root= Newtonmethodsystem(F,J,x0,tol);
disp('The root is ')
disp(root)

%%Question2a)

The root is
0.5991
2.3959
```

## Question2b)

```
disp(' ')
disp('%%Question2b)')
disp(' ')
F = @(x,y)[(x.^3 - 3*x*y.^2 -1); (3*x.^2*y - y.^3)];
J = @(x,y)[(3*x.^2 - 3*y.^2), -6*x*y; 6*x*y,(3*x.^2 - 3*y.^2)];
x0 = [-0.6;0.6];
root= Newtonmethodsystem(F,J,x0,tol);
disp('The root is ')
disp(root)

%%Question2c)
disp(' ')
disp('%%Question2c)')
disp(' ')
F = @(x,y)[(y - x.^2 +x); (x.^2/16 + y.^2 -1)];
J = @(x,y)[(-2*x +1), 1; x/8 , 2*y];
x0 = [-2;4]

root1 = Newtonmethodsystem(F,J,x0,tol);
x0 = [2;3]
root2 = Newtonmethodsystem(F,J,x0,tol);
disp('The roots are ')
```

---

```

disp(root1)
disp ('and')
disp(root2)

x = -4:0.1:4;
y = x.^2 - x;
figure(2); hold on
    xlabel('x')
ylabel('y')
title('Plot of y vs x for a parabola and ellipse')
plot(x,y);
y1 = sqrt(1 - (x.^2/16));
    y2 = -sqrt(1 - (x.^2/16));
figure(2);
plot(x,y1); hold on
figure(2);
plot(x,y2);
axis([-4 4 -8 20])

%%Question2b)

The root is
    -0.5000
     0.8660

%%Question2c)

x0 =

    -2
     4

x0 =


     2
     3

The roots are
    -0.6127
     0.9882

and
    1.5810
    0.9186

```

---



end

*Published with MATLAB® R2020a*