

10 KM SOUS 1 HEURE

Octobre Rose — dimanche 4 octobre 2026. Le pourquoi du plan, à lire une fois au calme. Le planning semaine par semaine, à cocher, est sur la feuille « Tracker » jointe.

Une seule idée porte tout le plan : **faire tourner les jambes de 160 à 171 pas/min en gardant la même longueur de foulée**. Ça donne 6'00/km, soit 10 km en 59'59 — sans apprendre aucun geste nouveau. Et c'est le même réglage qui protège l'aponévrose plantaire et la bandelette. Le reste de ce carnet explique pourquoi, et comment ne pas se blesser en chemin.

01 Pourquoi la cadence, et pas plus de kilomètres

Le 3 juillet, elle a couru son 10 km en 65 min (6'32/km), à 160 pas/min × 96 cm de foulée, allure parfaitement régulière du premier au dernier kilomètre. Le chrono n'est donc pas un problème de gestion de course : c'est un problème de mécanique. Pour passer à 6'00/km il faut 166,7 m/min, soit **171 × 97,5 cm** — +7 % de cadence, +1,5 cm d'amplitude. C'est tout.

Le test du 23 juillet le confirme : 5 km en 30'40, mais surtout **les quatre derniers kilomètres tenus à 5'48/km** à FC 164 — déjà plus rapide que l'allure objectif. Projeté sur 10 km, cela situe aujourd'hui autour de 62 min. Autrement dit, le point de départ est meilleur qu'au 3 juillet, et le sous-1h n'est plus un pari : c'est le travail des onze semaines qui suivent.

Un seul réglage, trois bénéfices

Aponévrose : cadence plus haute = contact au sol plus court = moins de tension, moins longtemps.

Bandelette (TFL) : foulée plus courte = moins d'adduction de hanche = moins de contrainte. C'est le traitement documenté.

Chrono : la voie la moins coûteuse en fatigue vers 6'00/km.

Installer la cadence sans se blesser

- **Progressif** : 160 → 165 sur S1-S6, puis 165 → 171 dès la S7. Jamais +10 % d'un coup.
- **Métronome, en EF seulement** : 2 × 8 à 10 min par sortie facile. Jamais sur les séances dures.
- **Surveiller la longueur de pas** : si elle tombe sous 94 cm à l'allure objectif, le gain est nul — ralentir la montée.

02 Ce que disent la montre et le pied

Deux ruptures nettes dans les données de la Pixel Watch (mi-mars, fin juin) sont des **recalibrages logiciels**, pas des changements physiques : on ne compare que des séances de la même période, et la référence reste le 10 km du 3 juillet. L'export ne donne pas l'équilibre gauche/droite du contact — cette asymétrie se suit chez le podologue.

MÉTRIQUE	3 JUIL.	CIBLE OCT.	LECTURE
Cadence	160 /min	170-172	Levier n° 1 : chrono, fascia ET bandelette.

Longueur de pas	96 cm	97-98 cm	À garder, voire +1 cm, malgré la cadence.
Contact au sol	314 ms	< 295 ms	Long : tension prolongée sur mollet et voûte.
Oscillation vert.	9,9 cm	< 9,5 cm	Correct, un peu de rebond récupérable.
Ratio vertical	10,3 %	< 9,5 %	Un poil trop de rebond pour la foulée.
FC moyenne	167	dérive < 4 %	Dérive 5,5 % : base aérobie encore à construire.

Le pied (analyse zebris)

L'aponévrose amortit seule — 163 % du poids de corps sur l'avant-pied contre 75-79 % au talon, bascule en 0,01-0,02 s. Couplé aux 314 ms de contact, la tension est longue, ~10 400 fois par 10 km. **L'arche s'affaisse en charge** (~55 % de la force passe par le médio-pied) : les semelles la tiennent passivement, l'excentrique de mollet activement. **L'ouverture de pas droite (8,6°) est fonctionnelle** puisque l'EOS est normale — donc corrigeable, et probablement de la même racine que le TFL : un seul axe de renfo traite les deux.

03 Les allures

Calibrées sur le 10 km du 3 juillet et le 5 km du 23 juillet. À réviser après le test de la S4.

ZONE	ALLURE	FC	SENSATION
Endurance fondamentale	7'30-8'00/km	125-142	Parler en phrases complètes. 75 % du plan.
Seuil	6'05-6'20/km	158-165	Confortablement dur. 3-4 mots à la fois.
10 km du 3 juillet	6'32/km	167	Premier repère.
5 km du 23 juillet	6'08/km	164	Test récent — fin à 5'48/km.
Allure objectif	6'00/km	165-172	À répéter en S7-S10. 59'59 sur 10 km.
VMA	5'25-5'40/km	175+	Tenable 5-6 min maxi.

Le vrai piège : pas le départ de course (elle gère très bien), mais les sorties longues courues trop vite. Avec un TFL récent, c'est la façon la plus fiable de le rallumer. En EF : si on ne peut pas parler en phrases complètes, c'est trop rapide.

04 Muscu — les 3 points à vérifier

Elle a déjà un programme spécifique : rien à changer, juste s'assurer que ces trois choses y figurent, vu le TFL et l'aponévrose.

À VÉRIFIER DANS LE PROGRAMME	DOSE	POURQUOI ICI
------------------------------	------	--------------

Abducteurs de hanche unilatéral + contrôle chute du bassin	3 × / sem.	Facteur n° 1 du TFL. Traite la blessure de mai et l'ouverture de pas droite. Le point à ne pas manquer.
Excentrique de mollet, orteils en extension (Rathleff)	3×12, 1j/ 2	Spécifique à l'aponévrose. Ce sont les orteils en extension qui chargent le fascia — rare dans un programme général.
Contrôle rotationnel de hanche (rot. interne élastique, SDT unipodal)	2-3 × / sem.	Cible l'angle de Fick droit, fonctionnel puisque l'EOS est normale. Seul point à la fois anormal et corrigeable.

Hyperlaxité : ne pas étirer davantage — le problème est le contrôle, pas l'amplitude. Surtout pas de rouleau ni d'étirement passif sur la bandelette (ça n' traite pas la cause et peut irriter). Tempo lent et contrôlé.

Hyrox : deux ateliers à surveiller

- **Traîneau & fentes chargées** : chargent la hanche en latéral et le quadriceps en excentrique — c'est ce qui réveille le TFL. Alléger sur les deux reprises de fin août, et laisser la partenaire en prendre le gros au Doubles du 19.
- **Wall balls & burpee broad jumps** : charge répétée sur mollet et voûte. Si la voûte tire le lendemain, ça vient de là.

05 Foulée

Raccourcir le contact et baisser le pic de charge, **sans changer l'attaque de pied** (passer talon déplacerait la contrainte vers le genou — mauvaise idée avec un TFL).

- **La cadence d'abord** — 80 % du travail technique.
- **Un seul repère par sortie** : « les pieds tournent sous le bassin ».
- **Ne pas croiser la ligne médiane** : courir « sur deux rails », pas « sur un fil ».
- **Lignes droites 6-8 × 20 s** et éducatifs 10 min × 2/sem, après échauffement.

06 Points de contrôle

SEM.	QUAND	CE QU'ON RELÈVE ET CE QU'ON EN FAIT
S0	23 juil. ✓	Fait : 5 km en 30'40, fin à 5'48/km, FC 164. Remplace le test du dimanche. Sous-1h en ligne de mire.
S4	sam. 22 août	Test 5 km, mêmes conditions. Recaler les allures. Cadence en hausse SANS que le contact s'allonge.
S7	mar. 8 sept.	Le 4 × 1000 m à 6'00/km, jambes fraîches : métriques mesurées à l'allure de course. Comparaison au 3 juillet.
S9	jeu. 24 sept.	Séance verdict : 5 × 1000 m à 6'00/km. 5/5 sans décrochage = sous-1h validé. Sinon viser 6'10/km le jour J.

07 Sécurité — les signaux d'alerte

TFL — douleur externe du genou

Apparaît après un temps de course constant, pire en descente, part à l'arrêt.

- **1re fois** : finir en marchant. Deux séances suivantes en EF courte et plate.
- **2e fois en 15 jours** : plafond 24 km, plus de sortie samedi, traîneau/fentes très allégés, doubler les abducteurs. Objectif → 1h02.
- **Entre le 1er et le 19 sept.** : renoncer au Hyrox Doubles ou le faire sans traîneau ni fentes.
- **Douleur au repos / en descendant l'escalier** : consultation, sans attendre.

Aponévrose — règle des 24 h

Douleur de voûte > 3/10 en courant, ou encore là le lendemain matin → séance suivante EF facile ou repos. La douleur aux premiers pas du matin est le signal cardinal : si elle revient, stop progression et podologue.

SI TU NE RETIENS QUE TROIS CHOSES

1

La cadence est le levier.

160 → 171 pas/min. Le chrono, l'aponévrose et le TFL s'améliorent avec ce seul réglage.

2

Sorties longues, lentes.

Trop vite = TFL qui se rallume. Si tu ne peux pas parler en phrases complètes, ralentis.

3

Deux douleurs = stop.

Voûte le matin, ou genou externe en courant : on gèle la progression. Pas d'héroïsme.

Le jour J — 4 octobre

Refaire ce qu'elle sait déjà faire (allure régulière, prouvé le 3 juillet), un cran plus vite.

km 1-3 à 6'05 · km 4-8 à 6'00 · km 9-10 sur ce qui reste. Ne pas se faire emmener par le peloton au départ.

Semelles en place, chaussures rodées, rien de neuf le jour J. Et 59'59 vaut 59'00.