

Tabel 3: Genen en hun verschil in genexpressie bij RA en hun functie.

<i>Gen</i>	<i>Genexpressie bij RA</i>	<i>Functie</i>	<i>Bron</i>
<i>B7, CD28 en MHC-klasse II</i>	Sterk verhoogd	DC zijn antigenen aan het presenteren	(N L Harris, 1999)
<i>IL-4 en IL-6</i>	Sterk verhoogd	Activatie van B-cellen	(N L Harris, 1999)
<i>$\alpha 4\beta 7$ en CCR9</i>	Sterk verhoogd en Verhoogd	Samen zorgen ze ervoor dat de B-cellen naar het slijmvlies van de dunne dam gaan	(Bauerle, 2024), (Eric J Kunkel, 2003)
<i>TACI</i>	Sterk verhoogd	Zorgt voor productie IgA	(Cristian Roberto Smulski, 2018)
<i>BCMA en BAFFR</i>	Sterk verhoogd en Verhoogd	B-cel differentiatie	(Cristian Roberto Smulski, 2018)
<i>CCR10</i>	Sterk verlaagd	Stuurt B-cellen naar de huid, dikkedram en anders slijmvliesen	(Eric J Kunkel, 2003)
<i>TGF- β</i>	Sterk verlaagd	Ontstekingsremmer	(Joanne E Konkel, 2011)