

Tabel 1: De hoogste log2FoldChange met een adjusted p-waarde < 0.05.

| <b>Gen</b>       | <b>baseMean</b> | <b>Log2FoldChange</b> | <b>P adje</b> | <b>Codeert voor</b> |
|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| <i>IGHV3-53</i>  | 358.29          | 11.43                 | 2.06e-16      | Immunoglobuline     |
| <i>IGKV1-39</i>  | 311.80          | 11.21                 | 4.17e-13      | Immunoglobuline     |
| <i>IGKV3D-15</i> | 286.79          | 11.09                 | 2.51e-13      | Immunoglobuline     |

Tabel 2: De laagste log2FoldChange met een adjusted p-waarde <0.05.

| <b>Gen</b>     | <b>baseMean</b> | <b>Log2FoldChange</b> | <b>P adje</b> | <b>Codeert voor</b> |
|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| <i>MXRA7P1</i> | 1.89e+03        | -12.78                | 1.28e-07      | Pseudogen           |
| <i>MT-ND6</i>  | 1.02e+04        | -11.42                | 8.73e-40      | Pseudogen           |
| <i>BOLA2</i>   | 1.04e+02        | -10.72                | 2.35e-03      | Pseudogen           |