

LÓGICA FINAL - CONTROL DE GLICEMIA EN UCI

1. Hipoglucemia:

Si glucemia < 70 mg/dL $\rightarrow$ hipoglucemia.

Conducta: suspender infusión + dextrosa + control en 30 min.

2. Sin infusión:

70–89 $\rightarrow$ en objetivo con alerta

90–180 $\rightarrow$ en rango

>180 una medición $\rightarrow$ hiperglucemia aislada

≥ 180 en 2 consecutivas $\rightarrow$ iniciar insulinización (bolo y tasa = glucemia/100)

3. Con infusión:

70–119 $\rightarrow$ fuera de objetivo por debajo + suspender infusión

120–139 $\rightarrow$ fuera de objetivo por debajo + suspender infusión

140–200 $\rightarrow$ en rango objetivo

>200 $\rightarrow$ hiperglucemia

4. Algoritmos:

Si infusión activa y glucemia ≥ 120 $\rightarrow$ usar algoritmo 1 o 2 para calcular tasa.

5. Ajuste:

2 controles fuera de rango en mismo escalón $\rightarrow +0,5$ UI/h

6. Persistente (Algoritmo 1):

>200 en último escalón sin cambios en 2 mediciones

o

>200 en mismo escalón sin cambios en 3 mediciones

7. Refractaria (Algoritmo 2):

>360 en 2 mediciones consecutivas en último escalón

8. Próximo control:

>400 $\rightarrow$ 1h

300–400 $\rightarrow$ 2h

200–299 $\rightarrow$ 4h

estable >24 h $\rightarrow$ 6h