


Morphine


- Morphine act on **mu** receptor.
- **Morphine**(heroin) **miosis** cause (pinpoint pupil) while cocaine(indirect sympathomimetic) cause mydriasis .
- Enkephaline are peptide similar in action to morphine.
- Morphine cause respiratory depression by acting on respiratory center in brain.
- **Picrotoxin** can treat respiratory depression .
- Morphine used in sever pain from sickle cell anemia .
- Morphine cause constipation .Anti cholinergic also? Narcotic (morphine).
- Ketolac ??




<https://www.facebook.com/groups/477348776664047/?ref=share>

Agonist		Pure antagonist		Mixed agonist/antagonist
<u>Morphine</u>	<u>Methadone</u>	<u>Naloxone</u>	<u>Naltrexone</u>	<u>Pentazocin</u>
 Withdrawal symptoms & dependence	Treatment morphine addiction Why ??	Short acting Antidote for opoid Iv	Long acting Ttt alcohol Dependence oral	Act agonist on k Weak antagonist on mu So .. less respiratory depression less dependence
 Miosis	Long acting Less withdrawal symptoms	For acute toxicity not for addiction why ??		But when take after morphine what happened???
 Constipation Ttt??				
 Over dose Respiratory depression ? How to treat?				

--	--	--	--	--




Note ? the difference



❖ Paracetamol


- Maximum dose adult 4 g
- Max daily dose of paracetamol in children: *75 mg / kg
- Per dose : 10-15 mg/kg Q4-6H so Max doses/day = 75mg/kg
- C₈H₉NO₂ but ethosuximide ?? C₇H₁₁N₂O
- Bond between amine & carboxylic gp ?? **H-bond**
- Antidote ? N-acetylsysteine toxic metabolite?? NAPQI
- Toxicity due to glutathione depletion (((**cysteine, glutamic, glycine**)))
- No anti inflammatory action

<https://www.facebook.com/groups/477348776664047/?ref=share>



Ibuprofen

ibuprofen



Dose OTC 1200 mg priscrption dose 3200mg




Less GIT side effect




Anti inflammatory


Aspirin



Diclofenac



Celecoxib





Aspirin

Irreversible covalent bond between acetyl gp and serine mioty in cox enzyme

Asprin & ibuprofen ?

Mefanamic acid ???

Indomethacin ... semi selective more affinity to cox 2

Iv indomethacin in patent dactus artiosis

NA & water retention not used in heart faliture

Selective cox 2 (coxib) high risk in cvs pt ..

More risk ..celecoxib

Less risk ...naproxen Max dose is 600 mg

Tape worm : praziquintal, niclosamide ,,,, **pomegranate bark**

Pin worm : albendazole , pyrantelpamoate


malaria treatment ■

First line : pyrimethamine+ sulfadoxine/ / artesunate


Second line : Artemether + Lumefantrine

Pregnancy : 1st trimester > Quinine + Clindamycine

2-3 trimester > Quinine + Clindamycine Or artesunate+ pyrimethamine



when quinine is configured



➡ **Primary Prevention** - trying to prevent yourself from getting a disease.

➡ **Secondary Prevention** - trying to detect a disease early and prevent it from getting worse.

➡ **Tertiary Prevention** - trying to improve your quality of life and reduce the symptoms of a disease you already have

What is the secondary prevention?

- ☐ Vaccination
- ☐ Immunization
- ☐ Do exercise
- ☐ Blood test

Which of the following concept that most of public health strategies are based on :

- a) Primary prevention
- b) Secondary prevention



تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية بعد الفتح

الكريم على شكل (علبة). 1 شهر من الفتح.	 	الأقراص والكبسولات التي تأتي بشرط معدني. تاريخ الصلاحية، كما هو موجود على أحد طرفي البشرط المعدني.
مرهم على شكل (أنبوب، ضغط). 6 أشهر من الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.	 	الأقراص والكبسولات التي تأتي بعلبة صرف الصيدلية. 6 أشهر من تاريخ صرفها، إلا إذا أبلغك الصيدلي بغير ذلك.
مرهم على شكل (علبة). 3 أشهر من الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.	 	الإنسولين الفوار التي تأتي بعلبة صرف الصيدلية. شهر واحد من تاريخ صرفها.
قطرات أو مراهم العين، الأذن، الأنف المعقمة. 28 يوماً من الفتح.	 	الأقراص والكبسولات التي تخزن حسب نظام الجرعة اليومية. 8 أسابيع من تاريخ صرفها.
الحقن التسرجية (الاحتمالية). الحقن الفردية المغفظة. تاريخ الصلاحية المكتوب على العبوة.	 	السوائل الفموية وهي السوائل التي يتم تناولها عن طريق الفم. 6 أشهر من الفتح المصنعة الصيدلانية، لا بد من التأكد من الصيغتي من تاريخ الصلاحية إذا لم تكن موضحة على العبوة.
بخاخ الربو تاريخ الصلاحية المكتوب على العبوة.	 	السوائل الخارجية مثل (الشامبو، اللوشن، الزيوت). 6 أشهر من الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.
الإنسولين غير مغفوخ تاريخ الصلاحية المكتوب على العبوة إذا حفظ في درجة حرارة من 2-8 درجات مئوية. بعد الفتح للمرة الأولى 4 أسابيع للغلم أو للأمتولة إذا حفظ في درجة حرارة من 2-8 درجات مئوية.	 	الكريم على شكل (أنبوب، ضغط). 6 أشهر من الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.

* في حال اختلاف تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية بعد الفتح مع النشرة الداخلية يرجى إتباع ما تحتويه النشرة

DR. Kabsha