

Fluoksetin İle İlişkili Akut Ürtiker ve Anjioödem: Bir Olgu Sunumu

Bahar Ezgi Ozturk Kertmen¹ , Artuner Deveci¹

¹Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Fluoksetin, obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Sıkça bildirilmiş yan etkileri gastrointestinal yakınmalar, uykusuzluk, ajitasyon, baş ağrısı ve cinsel işlev bozukluklarıdır. Ürtiker, eritemli, kaşıntılı papüller ve plaklarla karakterize yüzeysel dermiş ödemidir. Ödemin derin dermise yayılmasına anjioödem denir. Akut ürtiker-anjioödem en yaygın tetikleyicileri enfeksiyonlar ve ilaçlardır. Burada, fluoksetin tedavisi sırasında akut ürtiker-anjioödem gelişen bir olguyu ele aldık.

Yöntemler / Olgu Sunumu: Yirmi üç yaşında kadın hasta emin olamama obsesyonları, kontrol kompulsyonları, obsesyonları başlatabilecek eylemlerden kaçınma davranışı, konsantrasyon azalması yakınmalarıyla polikliniğimize başvurdu. DSM-5'e göre obsesif kompulsif bozukluk tanısı konulup, tedricen artırılarak günde fluoksetin 40 mg tedavisi başlandı. Yale-Brown Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği puanı 25 olarak değerlendirildi. Acil servise tüm vücutta kaşıntı, eritemli döküntüler, yüzde şişlik şikayetiyle başvuran hastanın akut ürtiker-anjioödem tanısıyla dermatoloji servisine yatırışı yapıldı. Psikiyatri polikliniğimizden takipli olması ve üç hafta öncesinde obsesif kompulsif bozukluk tanısıyla fluoksetin tedavisi başlanması üzerine ilaç ilişkili advers etki düşünülerek hasta için tarafımızca konsültasyon değerlendirmesi istendi. Hastanın özgeçmişinde ürtiker, anjioödem, gıda ve ilaç alerjisi öyküsü bulunmuyordu. Dört gün öncesinde çemen tüketimi, kedi sevmeye öyküsü mevcuttu. Yakın zamanda geçirilmiş bir enfeksiyona ait bulgu saptanmadı. Güneş ve soğuk maruziyeti, böcek ısırması, egzersiz, kimyasal madde kullanımı dışlandı. Laboratuvar incelemelerinde tam kan sayımında ılımlı lökositoz saptandı. Biyokimya tetkikleri normal sınırlardaydı. Naranjo İlaç Yan Etkisi Olasılık Ölçeği'ne göre 5 puan alması, olası bir fluoksetin ilişkili advers etki olarak değerlendirildi. Fluoksetin ile ilişkili ürtiker-anjioödem tanısıyla fluoksetin kesildi, hastaya intravenöz metilprednizolon ve antihistaminikler başlandı. Tedavinin başlaması sonrası 120 saat içinde bulguların tamamen düzelmesiyle hasta taburcu edildi. Taburculuk sonrası tedavi düzenlenmesi için psikiyatri poliklinik kontrolüne çağrıldı. Olgu sunumu için hastadan onam alınmıştır.

Sonuçlar: Literatürde fluoksetin ile ilişkili ürtiker-anjioödem olgusu erişkinlerde iki kez bildirilmiştir. Olgumuzda, terapötik dozda fluoksetin ile ürtiker-anjioödem gelişmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Fluoksetin ile ilişkili akut ürtiker-anjioödem mekanizması net değildir, olgumuzda fluoksetin ile artan serotonin düzeyinin akut ürtiker-anjioödem gelişiminde rol alabileceği düşünülmektedir. Literatürde diğer SSRI'ların da anjioödem yaptığı bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut Ürtiker , Anjioödem , Fluoksetin