

EYP 2405/EYP 2114
Métodos Estadísticos / Inferencia Estadística
Clase de Ejercicios

1. Se sabe que las fallas que han afectado al metro de Santiago en los últimos días, se producen debido a que ciertos componentes eléctricos dejan de funcionar. Asuma que los componentes son del mismo tipo con distribución común F . Sean, x_1, \dots, x_n tiempos de vida observados de tales componentes. La cantidad de interés en este problema es $S(t) = 1 - F(t)$, $t > 0$ que corresponde a la probabilidad que un componente no falle antes del tiempo t . Suponiendo que los tiempos de vida de los componentes son independientes con distribución exponencial de parámetro λ ,

- a) Escriba el modelo estadístico correspondiente a esta situación
- b) Encuentre un estadístico suficiente minimal para λ .
- c) Pruebe que $T(X) = \sum_{i=1}^n X_i$ es completo.

2. Sea X_{ij} una variable aleatoria que representa la j -ésima medición a la unidad i . Se postula que

$$X_{ij} = \tau + \gamma_j + \epsilon_{ij}, \quad \epsilon_{ij} \sim N(0, 1)$$

en donde τ y γ_j son parámetros de interés definidos en \mathbb{R} . Si las mediciones para cada unidad i se asumen independientes, y considerando una muestra de n unidades y k mediciones

- a) Escriba el modelo estadístico correspondiente y analice si es identificado.
3. Relacionado con el Problema 1, suponga que los tiempos de vida observados fueron medidos con error, por lo que en realidad se observa $x_i - \mu$, $\forall i$. Además, se sabe que el valor de λ es 1. En este nuevo escenario, x_1, \dots, x_n es una muestra aleatoria con distribución exponencial trasladada de densidad dada por

$$f(x|\mu) = \begin{cases} e^{-(x-\mu)} & \text{si } \mu < x \\ 0 & \text{si } \mu \geq x \end{cases}$$

- a) Muestre que $X_{(1)} = \min(X_i)$ es un estadístico suficiente para μ y estudie su ancilaridad.
 - b) Pruebe que $X_{(1)}$ es un estadístico completo.
 - c) Muestre que $E\left(\frac{X_{(1)}}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \left(\mu + \frac{1}{n}\right) \sigma^2$, en donde $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.
4. Sea X_1, \dots, X_n una muestra de una población con densidad

$$f(x|\theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \theta > 0$$

- a) Encuentre un estadístico suficiente minimal para θ .
- b) Encuentre un estadístico completo.

Indicaciones

- a) Recuerde que si f es una función integrable, entonces $\frac{d}{dx} \int_x^c f(t)dt = -f(x)$.
- b) Si X_1, \dots, X_n son i.i.d de una población con media μ y varianza σ^2 , entonces

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad E(S^2) = \sigma^2,$$

$$\text{con } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ y } S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}.$$

- c) Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, entonces $f(x) = \lambda \exp(-\lambda x)$, $x > 0, \lambda > 0$.