

V. Recopiez, sur votre feuille de rédaction, les couples (1,) ; (2,) ; (3,) ; (4,) et adressez à chaque numéro du groupe 1 la lettre lui correspondant du groupe 2. (1 pt)

Groupe 1

1. La chaleur retardée
2. La chaleur initiale
3. La formation du gradient H^+
4. La production du dioxyde de carbone

Groupe 2


- a. réactions d'oxydo-réduction du cycle de Krebs.
- b. réactions d'oxydo-réduction au niveau de la chaîne respiratoire.
- c. synthèse d'ATP à partir des réactions métaboliques aérobiques.
- d. synthèse d'ATP à partir de la phosphocréatine.

Deuxième partie : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (14 pts)

Exercice 1 (4 pts)

Pour étudier le mode de transmission des caractères héréditaires chez le poulet, on propose les données suivantes :

Le document 1 présente le caryotype chez le poulet de la race *Coucou de malines* : la figure (a) présente le caryotype de la poule et la figure (b) présente le caryotype du coq.




1. Comparez les deux caryotypes du document 1 et donnez la formule chromosomique de la poule et du coq. (1.5 pts)

Chez le poulet de race Coucou de Malines, le plumage est soit uni (de couleur noir homogène) ou barrée (rayé noir et blanc). On suppose que chez cette race, le caractère du plumage barré est gouverné par un seul couple d'allèles localisé sur un autosome.


Pour vérifier cette hypothèse, on effectue une série de croisements : les croisements 1 et 3 entre poules et coqs de lignées pures qui diffèrent par leur plumage et les croisements 2 et 4 entre poules et coqs de F₁. Le document 2 donne les résultats de ces croisements.

Croisement 1

Parents



♀
Plumage barré




♂
Plumage uni


×

↓

Génération F₁




♀
50% Plumage uni




♂
50% Plumage barré


Croisement 2 : entre des poules et des coqs de la génération F₁ a donné une génération F₂ composée de :




♀
25% Plumage uni



♀
25% Plumage barré




♂
25% Plumage barré




♂
25% Plumage uni

Croisement 3

Parents



♀
Plumage uni




♂
Plumage barré


×

↓

Génération F₁




♀
50% Plumage barré




♂
50% Plumage barré


Croisement 4 : entre des poules et des coqs de la génération F₁ a donné une génération F₂ composée de :



♀
25% Plumage uni



♀
25% Plumage barré



♂
50% Plumage barré

Document 2

2. En exploitant les données précédentes, **vérifiez** l'hypothèse proposée. Votre réponse doit inclure le mode de transmission du caractère étudié, ainsi que l'interprétation chromosomique des résultats des croisements 1, 2, 3 et 4 à l'aide d'échiquier de croisement. (2.5 pts)

(Utiliser les symboles *B* ou *b* pour le plumage barré et *N* ou *n* pour le plumage uni)


Exercice 2 (4 pts)

Afin de déterminer la relation gène caractère, on propose l'étude de l'hémochromatose, une maladie héréditaire, qui entraîne chez l'Homme une accumulation progressive du fer dans le foie, le pancréas et le cœur.

Le fer est un minéral essentiel, impliqué dans de nombreuses réactions métaboliques, mais il devient toxique lorsque sa concentration dépasse les valeurs normales. Les stocks de fer sont strictement adaptés aux besoins de l'organisme. Cette régulation se fait sous l'effet de l'hépcidine, une protéine sécrétée par le foie, au niveau des cellules intestinales (entérocytes) où s'effectue l'absorption du fer alimentaire.

Le document 1 montre les éléments qui interviennent dans cette régulation.

1. A partir du document 1, décrivez le mécanisme de régulation des stocks de fer au niveau de l'organisme et **déduisez** l'effet de l'hépcidine. (1pt)



La synthèse hépatique de l'hepcidine est déclenchée par la protéine HFE. Cette protéine est codée par le gène HFE localisé sur le chromosome 6. Ce gène existe sous deux formes alléliques :

- L'allèle HFE sauvage codant pour une protéine HFE normale qui permet la synthèse normale de l'hepcidine chez une personne saine.
- L'allèle HFE muté codant pour une protéine HFE anormale qui induit la perturbation de la synthèse de l'hepcidine chez une personne atteinte de l'hémochromatose.

Le document 2 présente les séquences nucléotidiques codantes des deux allèles HFE (brin non transcrit de l'ADN) et le document 3 donne le tableau du code génétique.

Numéro du triplet :	278	279	280	281	282	283	284
Allèle HFE sauvage :	CAG	AGA	TAT	ACG	TGC	CAG	GTG
Allèle HFE muté	CAG	AGA	TAT	ACG	TAC	CAG	GTG

Document 2

	U	C	A	G
U	UUU	UCU	UAU	UGU
	UUC	UCC	UAC	UGC
	UUA	UCA	UAA	UGA
	UUG	UCG	UAG	UGG
C	CUU	CCU	CAU	CGU
	CUC	CCC	CAC	CGC
	CUA	CCA	CAA	CGA
	CUG	CCG	CAG	CGG
A	AUU	ACU	AAU	AGU
	AUC	ACC	AAC	AGC
	AUA	ACA	AAA	AGA
	AUG	ACG	AAG	AGG
G	GUU	GCU	GAU	GGU
	GUC	GCC	GAC	GGC
	GUA	GCA	GAA	GGA
	GUG	GCG	GAG	GGG

Document 3


2. En vous basant sur les documents 2 et 3, **déterminez** la séquence d'acides aminés de la protéine HFE correspondante à l'allèle HFE sauvage et à l'allèle HFE muté. (1 pt)

3. En vous basant sur les données précédentes, **expliquez** l'origine de l'hémochromatose en précisant la relation gène caractère. (2 pts)

Exercice 3 : (6 pts)

La région de Taza, située au nord-est du Maroc, a connu durant ces dernières décennies un développement agricole important et une poussée démographique notable. La décharge publique de la ville de Taza n'est pas contrôlée, et les eaux usées sont rejetées directement dans les oueds Larbâa, Dfali, Jâouna et Taza. Ces eaux sont utilisées dans l'irrigation des cultures maraîchères avoisinantes. Afin d'évaluer les impacts de ces déchets sur l'environnement, l'agriculture et la santé, on propose les données suivantes :

🌀 Le document 1 présente une carte simplifiée montrant l'emplacement de la décharge publique, des rejets des eaux usées et des zones irriguées par ces eaux dans la région de Taza, ainsi que la localisation des sites de prélèvement (OA, OJ, OD et OT) au niveau des différents oueds collecteurs des eaux usées.



Des analyses physicochimiques et microbiologiques des eaux d'irrigation provenant des oueds collecteurs des eaux usées de la ville de Taza (document 1) ont été réalisées en 2012, le tableau du document 2 résume les résultats obtenus.


Paramètres	Sites	OJ (oued Jâouna)	OD (oued Dfali)	OA (oued Larbâa)	OT (oued Taza)	Norme *
Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)		2800	4000	5873	1200	800
DBO5 ($\text{mg O}_2/\text{L}$)		800 - 1300	800 - 1300	1300 - 1800	400 - 800	8
Fer : Fe (mg/L)		4	--	70	22	5
Coliformes fécaux (germes/100mL)		5300	7500	$75 \cdot 10^7$	1600	1000

La conductivité permet d'apprécier la quantité des sels dissous dans l'eau.

*valeurs limites des eaux destinées à l'irrigation en surface selon les normes marocaines.

Document 2

Le diagramme de Wilcox classe les eaux d'irrigation à partir de leur pouvoir alcalinisant (Le taux d'absorption du sodium ou SAR) en fonction de leur conductivité électrique. Le document 3 donne le diagramme de Wilcox des différents sites de prélèvement des affluents qui reçoivent les eaux usées de la ville de Taza.




1.a- En exploitant les documents 1 et 2, **comparez** les paramètres des eaux des oueds collecteurs des eaux usées de la ville de Taza par rapport aux normes. (1.5 pt)

1.b- En exploitant le document 3, **déterminez** la classe des eaux d'irrigations provenant des différents oueds de la ville de Taza. (1 pt)

1.c- Expliquez la qualité des eaux au niveau du site OA. (1 pt)

Au voisinage de la ville de Taza, certains agriculteurs utilisent les eaux usées pour irriguer leurs cultures de plantes potagères. Pour montrer l'impact de cette utilisation des eaux usées sur le rendement agricole et la santé des consommateurs on propose les données suivantes :

Le document 4 donne les résultats des études portant sur le rendement de certaines cultures selon les eaux d'irrigation utilisées (figure a), le dosage des métaux lourds et deux types de bactéries dans les parties consommables de la laitue irriguées par des eaux usées et une autre irriguées par des eaux du barrage (figure b) ainsi que l'état de lieu sur les maladies hydriques dans la province de Taza entre 2001 et 2005 (figure c).



2. En utilisant les figures du document 4 :

a- Montrez l'effet de l'utilisation des eaux usées sur le rendement et la qualité des cultures. (1.5 pt)

b- Expliquez le risque en matière de maladies à transport hydrique relevé à Taza. (0.5 pt)

3. En se basant sur vos réponses précédentes et vos acquis, proposez deux solutions adéquates pour faire face au problème soulevé dans la ville de Taza durant la période 2001 - 2005. (0.5 pt)