



Vai in [Home](#) > [trenometodi](#)

Il pornociclo

Pubblicato il 27 Novembre 2013 19:16

Premessa

Questo modello originale di individuazione della oscillazione ciclica è la seconda versione di un metodo che ho messo a punto tra il 1988 ed il 1992. In questa seconda versione del 1998 ho integrato ed assorbito la nascita del mercato IDEM (*Italian Derivatives Equity Market*).

Il lavoro fatto avrebbe bisogno di essere aggiornato alla terza revisione per integrare il passaggio ai programmi automatizzati di trading e l'introduzione del controllo in successione sull'option pain delle singole scadenze, avevo cominciato a lavorare ma non ho più la voglia e dunque metto questo piccolo contributo a disposizione di tutti.

La teoria

L'analisi tecnica dei mercati finanziari nasce da una tesi di Charles Dow , il quale sosteneva che i prezzi di uno strumento finanziario non sono frutto di fluttuazioni casuali e disordinate ma la loro sequenza esprime una tendenza :

"ogni avanzamento del prezzo raggiunge un livello più alto del rialzo precedente ed in cui ogni reazione secondaria verso il basso si ferma ad un livello superiore a quello della precedente flessione"



l'analisi ciclica dei mercati finanziari nasce da un'idea originale di J.M. Hurst che nel 1975 l'ha descritta in "The Profit Magic Of STOCK TRANSACTION TIMING", egli introduce nella definizione di tendenza la variabile del tempo.

"Quando un prezzo, sale senza interruzioni verso l'alto e poi ridiscende nello stesso modo e nello stesso arco di tempo al punto in basso dal quale era partita, diremo che ha compiuto un «ciclo». Se ripete questa azione, completando il ciclo successivo nello stesso arco temporale di prima, la chiameremo ciclica e periodica"



questi due postulati , quello di DOW e di HURST , sono i punti di partenza per individuare e definire un modello oggettivo che consenta di stabilire in maniera univoca la data di partenza e di fine ciclo. il termine ciclo applicato al grafico di uno strumento finanziario ha sempre generato degli equivoci in chi non ha familiarità con questo metodo. Da oggi lo chiameremo per quello che realmente è un **oscillazione**, la parola ciclo fa pensare ad un movimento regolare armonico nel tempo e nel prezzo.

Un oscillazione è un movimento che, in un tempo (t), parte da un minimo (A) passa per un massimo (B) e finisce con un minimo (C). Di questo movimento noi non conosciamo con precisione ne il tempo (t) ne l'estensione A-B ne l'estensione B-C.



in una oscillazione il punto (A) è sempre inferiore al punto (B) ed il punto (C) è sempre inferiore al punto (B). L'unico elemento che non conosciamo a priori è se il punto (C) sarà superiore o inferiore al punto (A). Quando il punto (C) si mantiene sopra il punto (A) l'oscillazione è al rialzo, viceversa quando il punto (C) scende sotto il punto (A) l'oscillazione è al ribasso.

La comprensione della definizione di minimo è necessaria per evitare errori di individuazione. il punto (C) deve essere il punto più basso dopo il massimo, non è ammesso un minimo più alto del precedente se non si fa un massimo più alto del precedente.

Nel grafico ho messo un esempio di minimo formalmente errato e un esempio di minimo formalmente corretto, nel secondo caso si è fatto un massimo superiore al precedente e il minimo successivo è il più basso dopo il massimo.



La base del metodo è la somma dei due enunciati di dow e di hurst .

"...ogni avanzamento del prezzo raggiunge un livello più alto del rialzo precedente...." "...e poi ridiscende nello stesso modo e nello stesso arco di tempo al punto in basso dal quale era partita, diremo che ha compiuto un «ciclo»."

Il nostro compito è individuare all'interno di queste oscillazioni , composte da un alternanza di massimi e minimi , la ciclicità presunta.

Nel grafico sottostante la ciclicità è **ABC** o **ADE** ?

tutte due le soluzioni sono candidabili in quanto soddisfano le regole di base , bisogna trovare un modello che ci consenta di scegliere una o l'altra ipotesi.



Il modello di individuazione ciclico deve essere :

Semplice :

- assenza di algoritmi complicati da addetti ai lavori
- dati elaborabili senza l'ausilio di piattaforme di trading e totale indipendenza da qualunque oscillavacche e affini .

Oggettivo :

- il tempo ciclico deve essere un elemento certo e misurabile
- il metodo deve individuare il minimo del ciclo in maniera automatica senza lasciare spazio ad interpretazioni personali .

Qui Prodest

Il mercato dei derivati, in cui sono listati futures e opzioni, è stato introdotto in Italia nel novembre del 1994, a garantire la presenza in acquisto e vendita su base continuativa sono i market maker che si obbligano a soddisfare le richieste immesse da tutti gli altri soggetti negozianti.


La domanda a chi serve che si oscilli è retorica, serve ai market maker, questi si ritrovano contratti future long e short, contratti di opzioni short Put e short long ed è naturale che cerchino alla scadenza di

massimizzare il loro profitto agendo sulla volatilità .

mi aiuterò con un grafico di massimo profitto delle opzioni scadenza 16 novembre 2013 di microsoft, diamo per vero che a vendere tutte le opzioni siano stati i market maker, a sinistra ci sono le put vendute (barre rosse) e a destra le call vendute.

il significato è il seguente, se il 16 novembre il titolo microsoft sarà a 35 dollari, la barra più bassa, i market maker realizzeranno il maggior profitto, se invece il prezzo si sposterà a sinistra verso 21\$ o a destra verso 44 \$ realizzeranno la maggiore perdita.

l'interesse teorico dei pezzi di nacchiu, all'interno della stessa scadenza, è di scambiare contratti con prezzi il più possibile lontani tra di loro



Una volta compreso che sono i pezzi di nacchiu ad avere tutto l'interesse a fare oscillare il mercato seguiremo questa traccia per trovare gli elementi di ciclicità.

li chiamo affettuosamente pezzi di nacchiu , in siciliano significa fesso, vendono le opzioni e si assumono un rischio illimitato a fronte di un guadagno limitato e questo agli occhi dei quaquaraquà è un comportamento da fessifaccione che ride.

se andate sul sito di borsaitaliana noterete che ci sono quattro contratti di futures del fituso e precisamente dicembre, marzo, giugno e settembre. ogni terzo venerdì dei rispettivi mesi scade il contratto e si inserisce il

nuovo.

per quanto riguarda i contratti delle opzioni ci sono 12 scadenze che coprono un arco di 5 anni , quattro coincidono con le scadenze del futuro fituso in più ci sono le scadenze di novembre e quella di gennaio, queste due verranno rimpiazzate a novembre con la scadenza febbraio ed a gennaio con la scadenza aprile, quella di dicembre 2013 invece verrà rimpiazzata con la scadenza dicembre 2018 e così via a rotazione.

Il modello

Le settimane di vita di ogni singolo contratto trimestrale, sono mediamente **13** con alcune scadenze di **14** settimane e qualcuna da 12. all'interno del contratto trimestrale si trovano le singole scadenze mensili composte da **4** o **5** settimane .


13	5	20/12/2013
	4	15-nov
	4	18-ott
13	5	20/09/2013
	4	16-ago
	4	19-lug
14	5	21/06/2013
	4	17-mag
	5	19-apr
12	4	15/03/2013
	4	15-feb
	4	18-gen
13	5	21/12/2012
	4	16-nov
	4	19-ott
14	5	21/09/2012
	4	17-ago
	5	20-lug
13	4	15/06/2012

14 settimane equivalgono a poco più di **69** giorni questo è il primo motivo per cui lo chiamo pornociclo, c'è un secondo motivo nascosto ma lo spiegherò al momento opportuno.

La relazione tra la scadenza trimestrale dei derivati e l'oscillazione conseguente non è perfettamente rigida, se ci fosse sempre un minimo alla partenza della scadenza ed un minimo alla fine della stessa sarebbe troppo semplice.


troppa grazia santantonio direbbe il nonno, minerebbe le fondamenta del mercato tutti dalla stessa parte e

tutti in guadagno.




la forma che l'oscillazione può assumere rispetto alla scadenza trimestrale dei derivati è molteplice:


– può essere più corta o più lunga rispetto alla scadenza.




– può avere inizio in qualunque punto della scadenza.



– può spingersi fino a 27 settimane la somma di due scadenze da 13 e 14 settimane.




Ogni singola scadenza trimestrale dei derivati contiene due scadenze mensili e ognuna di queste è composta da 4 o 5 settimane a seconda che la scadenza trimestrale sia di 12 13 o 14 settimane.



Come per la trimestrale la durata dell'oscillazione mensile può essere diversa da quella della scadenza e si può spingere fino a **9 settimane** la somma di due scadenze da 4 e 5 settimane.

13	5	20/09/2013
	4	16-ago
	4	19-lug
		21/06/2013



la durata minima dell'oscillazione trimestrale non può essere inferiore a **9** settimane, la durata massima dell'oscillazione mensile.

Le regole

tra i due triangoli ".....la ciclicità è ABC o ADE ?"



tutte e due le oscillazioni sono composte da un alternanza di massimi e minimi e soddisfano la definizione di ciclo

Un oscillazione è un movimento che, in un tempo (t), parte da un minimo (A) passa per un massimo (B) e finisce con un minimo (C)

la differenza tra i due triangoli è la distanza dal **minimo (A)**

– (C) è distante **46** barre giornaliere

– (E) è distante **69** barre giornaliere

come facciamo a scegliere l'una o l'altra distanza ?, secondo l'enunciato descritto in precedenza.

Il minimo di pornociclo deve essere distante almeno **9** settimane dal minimo di partenza.

La barra del punto **(C)**, sul grafico settimanale del fituso, è distante 9 barre dal minimo **(A)** e rispetta il requisito di minimo di pornociclo.


Questa regola serve ad individuare il tempo **(t)** del ciclo e non è sufficiente da sola a qualificare un minimo di pornociclo.

Come per **A-C** serve una regola per definire la distanza minima tra "...un massimo **(B)**..." e "...un minimo **(C)**...." che ci consenta di qualificare **C** come minimo del pornociclo.



In prima istanza avevo pensato ai rinculi di fibonacci come elemento matematico per misurare una distanza di prezzo. Le possibili alternative erano:

- una percentuale minima di rinculo dal prezzo di massimo, ad esempio il 5% di 17.720
- una percentuale minima di rinculo di C rispetto ad AB, ad esempio il 38,2%



anche se corretta dal punto di vista teorico ho abbandonato questa possibile soluzione per escludere completamente la componente prezzo dalle regole.


Messo da parte il rinculo l'unica strada da seguire era quella di wlacanna che con l'individuazione dei massimi e dei minimi ha rotto la minchia a generazioni di trader

il massone esoterico mister W.D.Gann nel libro *45 Years in Wall Street* al paragrafo *Rule for keeping Up 3-day chart* scrive:


".....Quando il mercato va al rialzo e registra per 3 giorni consecutivi una serie di Minimi e Massimi crescenti rispetto a un minimo, il grafico continua a salire fino a raggiungere il massimo del terzo giorno..."

traduciamo la frase sostituendo 3 giorni con 3 barre settimanali e cominciamo a contare.

Dal minimo A tracciamo il grafico che unisce la barra di minimo, che non si conta, alla terza barra.



il massone aggiunge *"...e continuare a spostare la linea in base al massimo di ogni giorno....."*
 spostiamo la linea del grafico dei 3-giorni su ogni singolo massimo fino alla barra B



"....A questo punto, se l'Indice registrasse reazioni al ribasso per 2 giorni, non dovresti riportarle sul grafico, ma dovresti aspettare che l'Indice superi il Primo Massimo....."


seguendo alla lettera le indicazioni di wlacanna contiamo le barre al ribasso con minimi inferiori, sono due e dunque da non registrare sul grafico che rimane fermo sul massimo.

per aggiornare la linea al rialzo aspettiamo che il fituso superi il primo massimo, in questo caso B.




"....e continuare a spostare la linea in base al massimo di ogni giorno....."

spostiamo la linea del grafico dei 3-giorni su ogni singolo massimo e ci fermiamo fino alla barra di massimo relativo.



".....finché non ci saranno tre giorni di Minimi inferiori. A questo punto dovrai spostare la linea sul minimo del terzo giorno e proseguire in questo modo finché i prezzi non smettono di scendere.....".

la barra di massimo relativo, che ha un massimo superiore ed minimo inferiore alla precedente, aggiorna il grafico al rialzo in quanto il prezzo di chiusura è superiore al minimo della barra precedente, se fosse stato inferiore verrebbe conteggiata come prima barra di minimo ed il grafico rimarrebbe fermo sul massimo della barra precedente.



Applicando alla lettera le regole di mister Gann nessuno dei due segmenti, **BC** e **DE**, possiede le caratteristiche per definirli massimo e minimo di pornociclo.

L'oscillazione di un pornociclo è una pausa del trend prima di riprendere la direzione precedente, probabilmente la teoria del grafico a 3-settimane non è adeguata a rappresentarla.

dopo la settimana di massimo dovrebbero esserci almeno tre settimane con minimi decrescenti, su nove settimane con un trend fortemente direzionale è difficile che questo accada.

Una possibile variante al grafico dei 3-giorni la fornisce lo stesso wlacanna che al paragrafo *Rule for keeping Up 3-day chart* scrive:


".....i movimenti a 2 giorni dovresti sempre ignorarli, se non quando il mercato si avvicina ai prezzi massimi e minimi estremi, nel qual caso dovresti registrarli..."

Riducendo a 2 le settimane di minimi decrescenti la barra **C** si candiderebbe a minimo di pornociclo, in via teorica si potrebbe adottare anche se gann scrive che si dovrebbe adottare nel caso in cui il mercato si avvicina a massimi e minimi estremi, ad esempio sul minimo di giugno 2012 quando il prezzo si avvicinò a quello del minimo di marzo 2009.

Il nonno diceva spesso "...sei una grande testadiminchia..", si lamentava che di pizzo o di canto alla fine faccio di testa mia. Per non smentirlo anche in questa occasione svilupperò la mia teoria manipolando quella originaria partendo dalla semplice frase di mister Gann:

possiamo considerare formato un massimo od un minimo solo dopo tre barre contro il trend principale

Nel grafico fituso sottostante la barra **C** è preceduta da **3 barre con minimo superiore** mentre la barra **E** è preceduta solo da **2 barre con minimo superiore**.
 dunque solo **C** possiede le caratteristiche di minimo di pornociclo.



Le differenze tra questa soluzione che chiamerò regola delle 3barre ed il grafico a 3-giorni di gann sono:

- le **3 barre di minimo non devono necessariamente trovarsi dopo la barra di massimo**.
- le 3 barre possono essere non consecutive.
- il conteggio delle 3 barre include tutte le barre anche quelle interne, dove il massimo ed il minimo sono inferiori alla barra precedente.

dal metodo dei 3-giorni di gann siamo arrivati al metodo trenindegno delle 3barre.

*"la barra di fine pornociclo deve essere preceduta almeno da **3** barre con minimo superiore."*

aggiungendo questa seconda regola alla prima possiamo scrivere che:

La barra di minimo di pornociclo deve essere distante almeno **9** settimane dal minimo di partenza e deve essere preceduta da **3** barre con minimo superiore .

Quella scritta sopra è la condizione sufficiente a decretare il massimo di pornociclo, a condizione che le tre barre di minimo si trovino tutte dopo il massimo.

per avere la certezza che la barra **B** sia il massimo dobbiamo aspettare che ci siano almeno 3 barre sotto il massimo, questo requisito si rende necessario per aver modificato la regola originaria dei 3-giorni di gann in "le tre barre di minimo non devono necessariamente trovarsi dopo la barra di massimo..".

Dopo aver descritto le regole applichamole al triangolo **ABC** del grafico fituso:

- la barra **C** è distante **9** barre da **A**.
- la barra **C** è preceduta da **3** barre con minimo superiore (numeri sotto le barre)
- ci sono **3** barre sotto il massimo **B** (numeri sopra le barre)

la barra **B** è il massimo del pornociclo partito dal minimo **A**, su questo adesso non ci sono dubbi il problema è che siamo partiti per individuare il minimo e ci siamo ritrovati con la regola che individua il massimo, nessun problema scriviamo la regola per non dimenticarla.

un massimo di pornociclo si è formato quando:

La barra corrente è distante almeno **9** settimane dal minimo di partenza ed è preceduta da **3** barre con minimo superiore .



se un massimo si è formato allora un minimo è in formazione:

".....il punto (C) deve essere il punto più basso dopo il massimo, non è ammesso un minimo più alto del precedente se non si fa un massimo più alto del precedente.."

La barra **C** potrebbe diventare il minimo di pornociclo.

69

Tutto è relativo, sosteneva ainstain, anche la direzione di un grafico di quotazioni finanziarie.

se provo a ribaltare il grafico fituso noto che la direzione al rialzo, nella vista ribaltata, è una direzione al ribasso.

i massimi ed il minimo si invertono di ruolo. la barra **A** e la barra **C** sono di massimo mentre la barra **B**, che nel grafico standard era il massimo, adesso diventa minimo.

la classica posizione a **69** del kamasutra, quella della fellatio reciproca tra masculus e fimmina, questo è il motivo per cui lo chiamo Pornociclo.

il **6** è il punto di vista du masculus il **9** è il punto di vista da fimmina, qualunque sia il punto di vista sempre fellatio rimane.



applichiamo le regole per individuare il massimo partendo dal minimo B, un massimo di pornociclo si è formato quando:

La barra corrente è distante almeno **9** settimane dal minimo di partenza ed è preceduta da **3** barre con minimo superiore .

nel grafico sottostante possiamo osservare che la barra **C** diventa massimo di pornociclo la settimana del 14 ottobre quando la barra corrente soddisfa tutti i requisiti.

- è distante **9** barre dal minimo B.
- è preceduta da **3** barre con minimo superiore.
- ci sono **3** barre sotto il massimo.

la barra **C** è il massimo del pornociclo partito dal minimo **B**. eccheminchia direbbe qualcuno ma sempre massimi andiamo cercando.....



tutto è relativo se rigiriamo il nostro grafico fituso in modalità normale.....sorpresa la barra **C** vista così è un minimo.

il minimo del pornociclo standard non è altro che il massimo del pornociclo inverso e per formarsi devono essere soddisfatte le regole di individuazione del massimo.

la barra corrente del 14 ottobre:

- è distante **9** settimane dal massimo **B**
- è preceduta da **3** barre con massimo inferiore

la barra **C** è il minimo del pornociclo partito da **A** ed il triangolo ABC soddisfa pienamente la definizione di ciclo.

“....in una oscillazione il punto (A) è sempre inferiore al punto (B) ed il punto (C) è sempre inferiore al punto (B). L'unico elemento che non conosciamo a priori è se il punto (C) sarà superiore o inferiore al punto (A). Quando il punto (C) **si mantiene sopra il punto (A)** l'oscillazione è **al rialzo** , viceversa quando il punto (C) **scende sotto il punto (A)** l'oscillazione è **al ribasso**.....”



in questo caso, in cui il massimo viene superato al rialzo prima delle 9 settimane, è sufficiente una distanza di **4** barre dal massimo per individuare il minimo.

il 16 settembre, ad una distanza di 5 barre, il massimo viene superato al rialzo e la barra **C** diventa minimo del pornociclo.


se avessimo adottato la regola dei 3-giorni di gann sarebbe stato sufficiente il solo superamento del massimo, sarebbe stato contenuto dalla regola dei 3 giorni dopo il massimo.



Adesso che abbiamo individuato il minimo di pornociclo precedente passiamo alla fase in corso del fituso.

- la barra **C** è distante **11** barre dal precedente minimo **A**. (la regola prevede che ce ne siano almeno 9)
- la barra **C** è preceduta da **4** barre con minimo superiore. (la regola prevede che ce ne siano almeno 3)
- ci sono 3 barre sotto il massimo.

la barra **B** è il massimo di questo pornociclo.



la teoria del **69** dice che il minimo del mascolo sarà il massimo di quello fimmina partito da **B**, le regole le conosciamo.

per diventare minimo fimmina è necessario che la barra corrente:

- sia distante almeno **9** barre, o **4** se lo supera al rialzo, dal precedente massimo **B**.
- sia preceduta da **3** barre con massimo inferiore.

appena la condizione sarà soddisfatta il minimo più basso dopo la barra **B**, in questo momento la barra **C**, diventerà il minimo di pornociclo.



per riassumere in un postulato possiamo affermare che si è formato un minimo di oscillazione porno quando:

La barra corrente è distante almeno **9** barre settimanali dalla barra di **minimo** iniziale e **9** dalla barra di **massimo** o **4** barre se lo ha superato, ed è preceduta da almeno **3** barre con massimo **inferiore** ed in precedenza, prima del minimo, ci siano state **3** barre con minimo **superiore**.

La chiave di questo enunciato è l'alternanza univoca tra porno mascolino e femminina, per ogni minimo standard ci può essere un solo minimo di pornociclo inverso.

ad una prima lettura distratta sembrerebbe che per individuare il minimo bisogna aspettare parecchie settimane, nella realtà tranne pochi casi di oscillazioni laterali, il segnale è distante dal minimo poche settimane.

due esempi sono le oscillazioni di novembre 2012 e quella successiva, il segnale (segmento rosso) si trova a 11 giorni dal minimo nel primo caso e 21 giorni nel secondo.



le regole descritte fino ad ora sono sufficienti ma per maggior scrupolo e per evitare qualche possibile falso segnale introdurremo come strumento di verifica una media mobile.

la durata teorica è 13-14 settimane che tradotti in giorni sono 65-70 per non scontentare nessuno fissiamo la durata a 68 giorni, la media di controllo che utilizzeremo sarà la 34 giorni triangolare calcolata non sul prezzo di chiusura ma sulla media della singola barra $((\text{massimo} + \text{minimo})/2)$, in quanto ci serve contemporaneamente sul ciclo mascolo e sul ciclo fimmina.

la condizione è semplice e vale per il mascolo e per la fimmina.

La barra di minimo deve toccare la media mobile triangolare a 34 giorni calcolata sul valore medio della singole barre.

questo evento è difficile che non si verifichi dopo una correzione di 3-4 settimane, potrebbe starci in un trend fortemente direzionale con correzione profonda di un paio di giorni, sostanzialmente sono cause correttive esterne al mercato.

nell'ultimo pornociclo pur in presenza di trend fortemente direzionale e solo 7 giorni di correzione dal massimo, la barra C è andata leggermente sotto la media ed ha superato la verifica.



per riassumere le regole abbiamo massimi e minimi di un oscillazione porno quando:

- La barra corrente è distante almeno **9** barre settimanali dalla barra di **minimo** iniziale e **9** dalla barra di **massimo** o **4** barre se lo ha superato, ed è preceduta da almeno **3** barre con massimo **inferiore** ed in precedenza, prima del minimo, ci siano state **3** barre con minimo **superiore**.

- La barra di minimo deve toccare la media mobile triangolare a 34 giorni calcolata sul valore medio della singole barre.

questi due enunciati costituiscono un modello di individuazione ciclica **semplice** ed **oggettiva**.

- non comprendono algoritmi matematici complicati
- individuano il minimo ed il massimo del ciclo in maniera automatica senza lasciare spazio ad interpretazioni personali .

Questo metodo oggettivo individua partenza e fine di ogni singolo pornociclo dal 28 novembre 1994, giorno di prima quotazione del mercato dei derivati fitusi.

avevo pensato di chiamare ogni singola oscillazione con il nome delle posizioni del kamasutra, pecorina ventilatore odaliska missionario ecc. ecc., poi ci ho ripensato. troppo seriosi in questo avido microcosmo

finanziario forse è meglio dare un numero progressivo ai singoli pornocicli.

la tabella sottostante contiene la data iniziale di ognuna delle 63 oscillazioni, il numero progressivo, la durata in settimane e la durata in giorni.

Per far comprendere l'efficacia del metodo, in alto a destra e a sinistra ho calcolato la media **Armonica** settimanale e giornaliera, praticamente uguale alla durata delle scadenze trimestrali **14** settimane e **67** giorni.

la seconda tabella contiene la data iniziale di ognuna delle **64** oscillazioni inverse o fimmina. la media armonica è di **13** settimane e di **66** giorni.

oscillazione standard														
67			← Days		Durata (media armonica)			Week →			14			
n°			W	D	n°		w	d	n°			w	d	
					50	27/11/2009	19	99	25	20/02/2002	22	103		
					49	13/07/2009	18	87	24	21/09/2001	9	46		
					48	09/03/2009	14	61	23	18/07/2001	17	81		
					47	05/12/2008	20	101	22	22/03/2001	11	56		
					46	16/07/2008	17	81	21	03/01/2001	12	105		
					45	20/03/2008	17	81	20	03/08/2000	25	75		
					44	21/11/2007	14	68	19	17/04/2000	26	127		
					43	17/08/2007	22	106	18	18/10/1999	11	51		
					42	16/03/2007	15	72	17	06/08/1999	11	59		
					41	01/12/2006	24	121	16	17/05/1999	14	66		
					40	14/06/2006	20	99	15	10/02/1999	18	82		
64					39	23/01/2006	13	60	14	09/10/1998	23	118		
63	28/08/2013	9	46		38	28/10/2005	16	80	13	27/04/1998	9	43		
62	24/06/2013	12	55		37	07/07/2005	10	49	12	24/02/1998	17	79		
61	05/04/2013	20	93		36	29/04/2005	26	130	11	28/10/1997	9	42		
60	16/11/2012	16	82		35	25/10/2004	10	50	10	29/08/1997	12	63		
59	24/07/2012	8	37		34	16/08/2004	21	101	9	02/06/1997	9	40		
58	01/06/2012	27	131		33	24/03/2004	13	61	8	03/04/1997	16	73		
57	25/11/2011	9	45		32	23/12/2003	12	60	7	13/12/1996	14	70		
56	23/09/2011	27	132		31	30/09/2003	8	62	6	05/09/1996	23	112		
55	18/03/2011	15	76		30	03/07/2003	16	78	5	27/03/1996	10	52		
54	30/11/2010	21	106		29	12/03/2003	6	28	4	15/01/1996	12	55		
53	05/07/2010	9	41		28	31/01/2003	16	76	3	23/10/1995	19	92		
52	07/05/2010	12	62		27	10/10/2002	11	55	2	13/06/1995	12	55		
51	08/02/2010	11	47		26	24/07/2002	22	107	1	23/03/1995	14	81		
									0	13/12/1994				

oscillazione inversa												
66		← Days		Durata (media armonica)				Week →		13		
n°		W	D	n°		w	d	n°		w	d	
				50	16/10/2009	19	97	25	06/12/2001	18	89	
				49	03/06/2009	21	103	24	02/08/2001	13	66	
				48	06/01/2009	21	100	23	02/05/2001	15	70	
				47	11/08/2008	13	61	22	19/01/2001	10	49	
				46	16/05/2008	22	104	21	08/11/2000	17	82	
				45	12/12/2007	9	46	20	14/07/2000	18	90	
				44	09/10/2007	20	100	19	07/03/2000	23	113	
				43	21/05/2007	13	62	18	27/09/1999	12	57	
				42	19/02/2007	13	60	17	08/07/1999	15	76	
				41	22/11/2006	36	175	16	22/03/1999	11	52	
				40	16/03/2006	9	45	15	07/01/1999	24	116	
				39	12/01/2006	15	73	14	21/07/1998	15	73	
64	30/10/2013	11	53	38	30/09/2005	15	75	13	07/04/1998	8	39	
63	16/08/2013	12	61	37	16/06/2005	14	67	12	11/02/1998	20	95	
62	22/05/2013	17	78	36	11/03/2005	22	108	11	23/09/1997	9	43	
61	29/01/2013	20	92	35	08/10/2004	14	74	10	23/07/1997	9	45	
60	14/09/2012	10	53	34	28/06/2004	16	78	9	21/05/1997	15	70	
59	02/07/2012	16	75	33	08/03/2004	12	51	8	07/02/1997	10	49	
58	14/03/2012	20	97	32	19/12/2003	14	73	7	25/11/1996	27	133	
57	28/10/2011	25	128	31	09/09/2003	10	52	6	20/05/1996	15	68	
56	02/05/2011	11	49	30	26/06/2003	19	89	5	09/02/1996	5	27	
55	18/02/2011	28	141	29	18/02/2003	11	51	4	03/01/1996	21	96	
54	03/08/2010	6	31	28	02/12/2002	14	69	3	11/08/1995	12	63	
53	21/06/2010	10	47	27	27/08/2002	19	91	2	16/05/1995	16	78	
52	15/04/2010	13	66	26	18/04/2002	19	88	1	23/01/1995	8	37	
51	11/01/2010	13	57						0	01/12/1994		

Qualcuno mi ha chiesto come mai ho deciso di rendere pubblico gratuitamente una parte del mio modello di individuazione ciclica. l'ho sempre fatto mi pare una cosa normale capisco che per molto meno molti di voi hanno sborsato migliaia di euro ma non saprei che farmene, piuttosto che pagare me fate una donazione a chi ne ha effettivamente bisogno e sono veramente tanti.

Esempi

primo esempio con il pornociclo cominciato dal minimo di luglio 2012.

il primo requisito è :

".....la barra corrente è distante almeno **9** barre settimanali dalla barra di **minimo**....."

– la barra del 24 settembre è distante 9 settimane dal minimo precedente A

il secondo requisito è:

".....la barra corrente è preceduta da almeno **3** barre con minimo **superiore**....."

– la barra del 24 settembre è preceduta da 3 minimi superiori.

la barra B sarà massimo di pornociclo se non sarà superata al rialzo dalla barra successiva, è necessario che ci siano almeno 3 barre sotto il massimo



la barra successiva si mantiene sotto il massimo della barra B che da questo momento sarà massimo di questo pornociclo.



il terzo requisito è:

"....La barra corrente è distante almeno **9** barre da quella di **massimo**..."

la barra del 12 novembre è distante 9 barre da quella di massimo ed il minimo è inferiore a tutte le altre.

la barra in corso potrebbe diventare il minimo di questo pornociclo.



Manca solo l'ultimo requisito la barra corrente deve essere:

".....preceduta da almeno **3** barre con massimo **inferiore**.....".

la barra del 26 novembre è preceduta da 3 massimi inferiori.

la barra **C** del 26 novembre 2012 è il minimo del pornociclo



secondo esempio con il pornociclo cominciato la settimana del del 25 Aprile del 2005.

il primo requisito è :


".....la barra corrente è distante almeno **9** barre settimanali dalla barra di **minimo**....."

– la barra del 27 giugno è distante 9 settimane dal minimo precedente A

il secondo requisito è:

".....la barra corrente è preceduta da almeno **3** barre con minimo **superiore**....."

– la barra del 27 giugno è preceduta da 3 minimi superiori.



il terzo requisito è:

“....La barra corrente è distante almeno **9** barre da quella di **massimo** o **4** barre se lo ha superato ...”


la barra del 11 luglio ha superato il precedente massimo ed è distante 4 barre dallo stesso.

l'ultimo requisito, la barra corrente deve essere “.....preceduta da almeno **3** barre con massimo **inferiore.....**”, è automaticamente soddisfatto.

quando mancano le 3 barre sotto il massimo lo stesso viene confermato insieme al minimo.

■

la barra **C** del 4 luglio 2005 è il minimo del pornociclo



© 2022 trenotrading