

TP de Biométrie — Statistiques Semestre 5

Benoît Simon-Bouhet

dimanche 13 septembre 2026

Table des matières

Introduction	4
Objectifs	4
Pré-requis	5
Organisation	6
Volume de travail	6
Modalités d’enseignement	7
Comment communiquer	9
Progression conseillée	10
Quelques mots sur les IA génératives	13
Évaluation(s)	16
Licence	18
 1 Comparaison de la moyenne d’une population à une valeur théorique	 19
1.1 Pré-requis	19
1.2 Contexte	20
1.3 Importation et mise en forme des données	21
1.4 Exploration statistique des données	24
1.4.1 Position et dispersion	24
1.4.2 Incertitude	27
1.5 Exploration graphique des données	28
1.5.1 Histogramme	28
1.5.2 Diagramme de densité	30
1.6 Le test paramétrique	31
1.6.1 Conditions d’application	32
1.6.2 Signification de la p -value	34
1.6.3 Réalisation du test de Student et interprétation	38
1.7 L’alternative non paramétrique	40
1.8 Les notions d’erreur et de puissance statistique	42
1.9 Bilan	44
1.10 Exercice d’application	45
 2 Comparaison de moyennes : deux échantillons appariés	 46
2.1 Pré-requis	46

2.2	Contexte	47
2.3	Importation et mise en forme des données . .	49
2.4	Exploration statistique des données	53
2.5	Exploration graphique des données	55
2.5.1	Avec un stripchart	56
2.5.2	Avec des histogrammes facettés	57
2.5.3	Avec des diagrammes de densité facettés	57
2.5.4	Avec des boîtes à moustaches	58
2.5.5	Avec un nuage de points appariés . . .	60
2.6	Le test paramétrique	62
2.6.1	Procédure	62
2.6.2	Conditions d'application	63
2.6.3	Réalisation du test et interprétation .	66
2.7	L'alternative non paramétrique	68
2.8	Exercice d'application	70
3	Comparaison de moyennes : deux échantillons in-	
	dépendants	71
3.1	Pré-requis	71
3.2	Contexte	72
3.3	Importation et mise en forme des données . .	74
3.4	Exploration statistique des données	76
3.5	Exploration graphique des données	79
3.5.1	Avec un stripchart	79
3.5.2	Avec des histogrammes facettés	80
3.5.3	Avec des diagrammes de densité facettés	81
3.5.4	Avec des boites à moustaches	82
3.6	Le test paramétrique	84
3.6.1	Conditions d'application	84
3.6.2	Réalisation du test et interprétation .	90
3.7	L'alternative non paramétrique	92
3.8	L'autre alternative non paramétrique	93
3.9	Exercices d'application	94
3.9.1	La taille des hommes et des femmes .	94
3.9.2	La longueur du bec des manchots Adélie	94
3.10	Tests bilatéraux et unilatéraux	95
3.10.1	Principe	95
3.10.2	Un exemple pas à pas	97
3.10.3	Exercice d'application	102
	Références	103

Introduction

Objectifs

Ce livre contient l'ensemble du matériel (contenus, exemples, exercices...) nécessaire à la réalisation des travaux pratiques de **Biométrie** de l'EC *Outils pour l'étude et la compréhension du vivant 4* du semestre 5 de la licence Sciences de la Vie de La Rochelle Université.

À la fin du semestre, vous devriez être capables de faire les choses suivantes dans **RStudio** :

- Mettre en forme des tableaux de données : renommer des variables, en créer de nouvelles, modifier des variables existantes, filtrer des lignes, sélectionner des colonnes, etc. (vu au semestre 3)
- Explorer des jeux de données en produisant des graphiques appropriés selon la nature des variables disponibles, leur nombre et l'objectif recherché (vu au semestre 3)
- Explorer des jeux de données en produisant des résumés statistiques de variables de différentes natures (numériques continues ou catégorielles) et pour différentes modalités de facteurs d'intérêt (vu au semestre 4)
- Calculer des indices de position (moyennes, médianes...), de dispersion (écarts-types, variances, IQR...) et d'incertitude (erreurs standard, intervalles de confiance...) pour plusieurs sous-groupes de vos jeux de données, et les représenter sur des graphiques adaptés (vu au semestre 4)
- Choisir et formuler des hypothèses adaptées à la question scientifique posée (hypothèses bilatérales ou unilatérales)
- Choisir les tests statistiques permettant de répondre à une question scientifique précise selon la nature de la question posée et la nature des variables à disposition

- Réaliser les tests usuels de comparaison de moyennes (t de Student à 1 ou 2 échantillons, appariés ou indépendants...)
- Vérifier les conditions d'application des tests (graphiquement et avec des tests appropriés tels que les tests de Shapiro-Wilk et de Levene), et le cas échéant, réaliser des tests non paramétriques équivalents (test de Welch, de Wilcoxon...)
- Interpréter correctement les résultats des tests pour répondre aux questions scientifiques posées
- Identifier des cohortes dans une population et en étudier les caractéristiques et l'évolution temporelle
- Simuler le comportement de populations théoriques simples suivant des modèles démographiques précis (mortalité exponentielle, croissance exponentielle, croissance logistique, système prédateur-proies de Lotka et Volterra, et systèmes de compétition à 2 ou 3 espèces...)
- Simuler, par chaînes de Markov, les successions écologiques dans un écosystème théorique

Pré-requis

Pour atteindre les objectifs fixés ici, et compte tenu du volume horaire restreint qui est consacré aux TP de Biométrie au S5, je suppose que vous possédez un certain nombre de pré-requis. En particulier, vous devriez avoir à ce stade une bonne connaissance de l'interface du logiciel **RStudio**, et vous devriez être capables :

1. de créer un **Rproject** et un script d'analyse dans **RStudio**
2. d'importer des jeux de données issus de tableurs dans **RStudio**
3. d'effectuer des manipulations de données simples (sélectionner des variables, trier des colonnes, filtrer des lignes, créer de nouvelles variables, etc.)
4. de produire des graphiques de qualité, adaptés à la fois aux variables dont vous disposez et aux questions auxquelles vous souhaitez répondre
5. de réaliser une exploration statistique de vos données en calculant des indices de position, de dispersion et

d'incertitude pour plusieurs sous-groupes de vos données

 Si ces pré-requis ne sont pas maîtrisés

Mettez-vous à niveau de toute urgence en lisant attentivement :

- [le livre en ligne de Biométrie du semestre 3](#)
- [le livre en ligne de Biométrie du semestre 4](#)

Vous aurez de toutes façons besoin de vous référer à ces 2 documents régulièrement au cours de ces TP. Donc gardez-les à portée de main et apprenez à naviguer rapidement dans leurs chapitres et sous-chapitres pour retrouver facilement les informations dont vous avez besoin.

Organisation

Volume de travail

Les travaux pratiques de biométrie auront lieu entre le 14 septembre et le 09 décembre 2026. Durant cette période, vous n'aurez jamais plus d'un créneau d'1h30 de TP (pour chaque groupe) par semaine, et deux séances consécutives sont souvent espacées de deux semaines ou plus. Vous devrez donc prendre l'habitude de prévoir, dans vos emplois du temps, des plages de travail personnel régulières, afin de ne pas oublier tout ce que vous avez appris entre deux séances de TP.

Les séances de TP ont lieu soit en salle MSI 217, soit dans les salles du Pôle Communication Multimédia Réseau (PCMR), dans les salles Sc1 à Sc7 ou en salle Info Trans.

Au total, chaque groupe aura 9 séances de TP, soit un total de 13,5 heures prévues dans vos emplois du temps. C'est peu pour atteindre les objectifs fixés et il y aura donc évidemment du travail personnel à fournir en dehors de ces séances. Comme indiqué ci-dessus, vous devrez prévoir du temps, et vos prédécesseurs consacraient en moyenne entre une et trois heures de travail personnel pour chaque séance de TP prévue

dans leur emploi du temps. Comme pour les semestres précédents, Ce travail personnel et régulier est essentiel pour progresser dans cette matière. J'insiste sur l'importance de faire l'effort dès maintenant : vous allez en effet avoir des enseignements qui reposent sur l'utilisation de ces logiciels jusqu'à la fin du S6 (y compris pendant vos stages et, très vraisemblablement, dans vos futurs masters également). C'est donc maintenant qu'il faut acquérir des automatismes, cela vous fera gagner énormément de temps ensuite.

Ces 9 séances de travaux pratiques seront assurées par 2 intervenants : Benoît Simon-Bouhet et Florian Orgeret. La particularité de ces TP de biométrie du semestre 5, c'est qu'ils contiennent deux parties presque indépendantes. Les chapitres 1, 2, et 3 illustrent les cours et les TD de Biométrie. Ils seront assurés par Benoit Simon-Bouhet. Les chapitres 4, 5, 6 et 7 illustrent les cours de Fonctionnement des écosystèmes. Ils seront assurés par Florian Orgeret. Ces deux blocs étant relativement indépendants, ils auront lieu en parallèle sur le semestre. Vous pourrez donc avoir, en alternance, des séances avec ces deux intervenants, mais elles ne sont pas interchangeables, car leurs modalités pédagogiques ne sont pas interchangeables (voir plus bas). Vous devrez donc vérifier sur vos emplois du temps quel intervenant assure chaque séance de TP.

Important

Soyez vigilant : les deux intervenants ne traitent pas les mêmes chapitres, et les modalités pédagogiques qu'ils utilisent ne sont pas les mêmes. Assurez-vous donc que vous avez préparé/travaillé les bons chapitres aux bons moments.

Modalités d'enseignement

Pour suivre cet enseignement, vous pourrez utiliser les ordinateurs de l'université, mais je ne peux que vous encourager à utiliser vos propres ordinateurs, sous Windows, Linux ou MacOS. Lors de vos futurs stages et pour rédiger vos comptes rendus de TP, vous utiliserez le plus souvent vos propres ordinateurs, autant prendre dès maintenant de bonnes habitudes en installant les logiciels dont vous aurez besoin tout au long

de votre licence. Si vous n'avez pas suivi les cours de biométrie de L2 et que les logiciels **R** et **RStudio** ne sont pas encore installés sur vos ordinateurs, suivez [la procédure décrite ici](#). Si vous ne possédez pas d'ordinateur, manifestez-vous rapidement auprès de moi car des solutions existent (prêt par l'université, travail sur tablette ou chromebook via [Posit cloud...](#)).

! Séances assurées par Benoît Simon-Bouhet

L'essentiel du contenu de cet enseignement peut être abordé en autonomie, à distance, grâce à ce livre en ligne, aux ressources mises à disposition sur Moodle et à votre ordinateur personnel. Cela signifie que **la présence physique lors des TP n'est pas obligatoire pour toutes les séances**.

Plus que des séances de TP classiques, considérez plutôt qu'il s'agit de **permanences non-obligatoires** : si vous pensez avoir besoin d'aide, si vous avez des points de blocage ou des questions sur le contenu de ce document ou sur les exercices demandés, alors venez poser vos questions lors des séances de TP. Vous ne serez d'ailleurs pas tenus de rester pendant 1h30 : si vous obtenez une réponse en 10 minutes et que vous préférez travailler ailleurs, vous serez libres de repartir !

De même, si vous n'avez pas de difficulté de compréhension, que vous n'avez pas de problème avec les exercices de ce livre en ligne ni avec les quiz Moodle, votre présence n'est pas requise. Si vous souhaitez malgré tout venir en salle de TP, pas de problème, vous y serez toujours les bienvenus.

Ce fonctionnement très souple a de nombreux avantages :

- vous vous organisez comme vous le souhaitez
- vous ne venez que lorsque vous en avez vraiment besoin
- celles et ceux qui se déplacent reçoivent une aide personnalisée
- vous travaillez sur vos ordinateurs
- les effectifs étant réduits, c'est aussi plus confortable pour moi !

Toutefois, pour que cette organisation fonctionne, cela demande de la rigueur de votre part, en particulier sur la régularité du travail que vous devez fournir. Si la présence en

salle de TP n'est pas requise, **le travail demandé est bel et bien obligatoire** ! Si vous venez en salle de TP sans avoir travaillé en amont, votre venue sera totalement inutile puisque vous n'aurez pas de question à poser et que vous passerez votre séance à lire et suivre ce livre en ligne, choses que vous pouvez très bien faire chez vous. Vous perdrez donc votre temps, celui de vos collègues, et le mien. De même, si vous attendez la 4e semaine pour vous y mettre, vous irez droit dans le mur. Je le répète, outre les heures de TP/TEA prévues dans vos emplois du temps, vous devez prévoir au moins 20 heures de travail personnel supplémentaire.

Je vous laisse donc une grande liberté d'organisation. À vous d'en tirer le maximum et de faire preuve du sérieux nécessaire. Le rythme auquel vous devriez avancer est présenté dans la partie suivante intitulée "Progression conseillée".

! Séances assurées par Florian Orgeret : attention !

Le mode "permanence non obligatoire" n'est valable que pour les 5 séances de TP de Benoît Simon-Bouhet, qui portent sur les tests de comparaison de moyennes. Pour les 4 séances de Florian Orgeret, qui portent sur le cours de fonctionnement des écosystèmes, votre présence physique est requise en salle informatique. Leur contenu étant plus éloigné de ce que vous avez déjà vu dans vos précédents enseignements de biométrie, votre présence en salle de TP est donc **obligatoire**, comme pour un TP classique.

Pensez donc bien à vérifier quel intervenant doit assurer votre prochain TP afin de ne pas commettre d'impair !

Comment communiquer

Lors de vos séances de travail, en cas de question, merci de nous contacter directement par email. Vous pouvez joindre des copies de votre code et de vos éventuels messages d'erreurs, ainsi que des copies d'écran si besoin.

Sachez toutefois qu'afin d'éviter de recevoir les mêmes questions de nombreuses fois, nos réponses pourront être adressées à l'ensemble de la promotion. Ainsi, tout le monde en profite, et tout le monde progresse en même temps.

Ce document est fait pour vous permettre d'avancer en autonomie et vous ne devriez normalement pas avoir beaucoup besoin de nous si votre lecture est attentive. L'expérience montre en effet que la plupart du temps, il suffit de lire correctement les paragraphes précédents et/ou suivants pour obtenir la réponse à ses questions. Lors des séances de TP au format "permanence", j'essaie de rester disponible par mail, mais je réponds évidemment en priorité à celles et ceux qui seront physiquement présents en salle. Cela signifie néanmoins que **même si votre groupe n'est pas en TP, vos questions ont des chances d'être lues et de recevoir des réponses dès que d'autres groupes sont en TP**. Vous pouvez d'ailleurs vous-même envoyer vos questions directement à toute la promotion : vous aurez ainsi plus de chances que quelqu'un vous réponde rapidement.

Progression conseillée

Si vous avez suivi le document de prise en main de R et RStudio lors de l'EC de biométrie du semestre 3 de la licence SV de La Rochelle, vous savez que pour apprendre à utiliser ces logiciels, il faut faire les choses soi-même, ne pas avoir peur des messages d'erreurs (il faut d'ailleurs apprendre à les déchiffrer pour comprendre d'où viennent les problèmes), essayer maintes fois, se tromper beaucoup, recommencer, et surtout, ne pas se décourager. J'utilise ce logiciel presque quotidiennement depuis près de 20 ans et à chaque session de travail, je rencontre des messages d'erreur. Avec suffisamment d'habitude, on apprend à les déchiffrer et on corrige les problèmes en quelques secondes. Ce livre est conçu pour vous faciliter la tâche, mais ne vous y trompez pas, vous rencontrerez des difficultés, et c'est normal. C'est le prix à payer pour profiter de la puissance du meilleur logiciel permettant d'analyser des données, de produire des graphiques de qualité et de réaliser toutes les statistiques dont vous aurez besoin d'ici la fin de vos études et au-delà.

Pour que cet apprentissage soit le moins problématique possible, il convient de prendre les choses dans l'ordre. C'est la raison pour laquelle les chapitres 1, 2 et 3 d'une part, et 4, 5, 6 et 7 d'autre part, doivent être lus dans l'ordre, et les exercices d'application faits au fur et à mesure de la lecture.

Idéalement, voilà les étapes que vous devriez avoir franchies chaque semaine :

1. Les deux premières séances sont consacrées à la comparaison de la moyenne d'une population à une valeur théorique (Chapitre 1). Si vous êtes déjà capable d'importer et manipuler des données dans R, ainsi que de les explorer graphiquement et par le calcul d'indices de statistiques descriptives (indices de position, de dispersion et d'incertitude), les fonctions nouvelles seront peu nombreuses. Mais ce chapitre est l'occasion d'aborder des notions complexes (test paramétrique ou non, hypothèses nulles et alternatives, p -value, décision, erreurs, puissance, etc.) qui demanderont une lecture très attentive. C'est également la première fois que vous serez confronté à toutes les étapes d'une analyse de données : de l'importation des données dans RStudio jusqu'à la réalisation des tests statistiques et leur interprétation, en passant par le calcul des statistiques descriptives appropriées, la réalisation de graphiques exploratoires pertinents, et la vérification des conditions d'application du test. La maîtrise du logiciel n'est donc ici qu'une petite partie de ce qui est demandé : maîtriser les notions et concepts, comprendre la démarche d'analyse, être capable de l'expliquer et de la reproduire, est ici crucial. Évidemment, si vous ne disposez pas des bases essentielles à la compréhension des commandes de ce chapitre, vous devrez trouver le temps de (re)lire les livres en ligne [du semestre 3](#) et [du semestre 4](#). Avant votre troisième séance de TP, vous devriez ainsi avoir atteint la fin du chapitre 1, et vous devriez avoir terminé l'exercice d'application de la section [Section 1.10](#).
2. Les deux séances suivantes sont consacrées à la comparaison de la moyenne de 2 populations, dans deux situations : lorsque les données des deux groupes sont appariées (Chapitre 2) et quand elles sont indépendantes (Chapitre 3). Ces chapitres seront également l'occasion d'aborder la notion de test unilatéral et bilatéral et d'apprendre comment coder des hypothèses alternatives spécifiques dans RStudio. Comme pour les semaines précédentes, vous aurez l'occasion de mettre en œuvre la totalité de la démarche d'analyse

statistique, et dans chaque chapitre, un ou deux exercices d'application vous sont également proposés.

Avant votre cinquième séance de TP, vous devriez donc être capable de choisir la procédure adaptée afin de comparer la moyenne d'une population à une valeur théorique, ou de comparer la moyenne de 2 populations, dans le cas où vous disposez d'échantillons appariés et dans le cas où les échantillons sont indépendants. Dans toutes ces situations, vous devrez être capable de vérifier les conditions d'application des tests paramétriques, et de choisir des tests non-paramétriques équivalents si les conditions d'application ne sont pas vérifiées. Vous devrez évidemment aussi être capables d'interpréter les résultats de ces tests. Et bien sûr, avant de faire chaque type de test, vous devrez aussi toujours penser au préalable à examiner les données graphiquement (à l'aide de graphiques adaptés), et par le biais des statistiques descriptives décrites au semestre 4 et rappelées plus haut (indices de position, de dispersion et d'incertitude).

C'est moi (Benoît Simon-Bouhet) qui assurerai ces 4 séances de TP. Les 3 séances suivantes, assurées par Florian Orgeret, sont consacrées à la mise en pratique des notions vues dans le cours magistral de Population Dynamics (EC "Fonctionnement des Écosystèmes").

3. La cinquième séance est consacrée à l'analyse de cohortes (**?@sec-cohortes**). Avant votre sixième séance de TP, vous devriez être en mesure de réaliser l'analyse de cohorte d'une population étudiée pendant plusieurs années afin de produire les courbes de croissance, de survie et d'Allen d'une cohorte d'intérêt. Vous devrez en particulier importer et mettre en forme des données issues d'un suivi de terrain, produire les structures démographiques instantanées à chaque date d'échantillonnage, faire les décompositions polymodales afin de récupérer les informations utiles au sujet de la cohorte dont on souhaite assurer le suivi et enfin, produire, pour cette cohorte, les courbes de croissance, de mortalité et d'Allen.
4. La sixième séance est consacrée à l'étude des systèmes dynamiques (**?@sec-dynam**). Vous devrez coder différents modèles d'évolution d'une population (mortalité

exponentielle, croissance exponentielle, croissance logistique) ou de plusieurs populations ou espèces (modèle prédateurs-proies, modèle de compétition). Ces modèles généreront des données que vous devrez représenter graphiquement. Vous devrez enfin modifier la valeur de certains paramètres de ces modèles pour comprendre leur influence sur le comportement des systèmes dynamiques étudiés. Pour la première fois, vous utiliserez donc **RStudio** pour produire des données qui suivent un modèle que vous spécifierez, au lieu d'importer des données déjà disponibles. L'objectif est ici de vous montrer comment utiliser le logiciel pour étudier le comportement de modèles théoriques de dynamique des populations, et de vous permettre d'évaluer l'importance et la sensibilité des conditions initiales et des valeurs des paramètres des modèles.

5. La septième et dernière séance est consacrée à l'utilisation des chaînes de Markov dans un contexte d'écologie des communautés (**?@sec-markov**). Vous verrez comment utiliser **RStudio** pour coder une chaîne de Markov permettant d'étudier les successions écologiques et l'atteinte de l'état d'équilibre d'un écosystème abritant plusieurs communautés végétales. Comme pour la semaine précédente, vous devrez coder le système, représenter graphiquement les résultats de simulation, et examiner les conséquences de changements des conditions initiales ou des probabilités de transitions entre communautés. Comme toujours, l'objectif est donc double : vous permettre de découvrir de nouvelles possibilités d'analyses réalisables avec **R** et **RStudio**, et vous permettre de mieux comprendre les notions fondamentales abordées dans les cours magistraux.

Quelques mots sur les IA génératives

J'attire votre attention sur l'utilisation des IA génératives. La plupart des modèles conversationnels (Large Language Models, LLMs) tels que ChatGPT, Gemini, Claude... sont très bons pour générer du code. Je vous mets néanmoins en garde : si vous ne comprenez pas ce qui est expliqué dans ces pages,

vous ne pourrez pas juger de la pertinence du code que les IA pourraient vous fournir. Vous pouvez donc vous faire aider par l'IA pour corriger votre code par exemple, ou pour obtenir des suggestions, mais **il est de votre responsabilité de comprendre ce que vous faites et ce que l'IA fait pour vous** ! Non seulement c'est ce qui vous fera gagner du temps à terme (acceptez de passer du temps maintenant, pour comprendre les notions et concepts, afin de gagner beaucoup de temps plus tard), mais surtout, c'est ce qui vous évitera de faire beaucoup d'erreurs ! Encore cette année, la plupart de nos étudiants de M1 ont utilisé l'IA pour calculer un indice statistique un peu exotique. Presque aucun ne s'est rendu compte que le code produit par l'IA ne faisait pas ce qui était demandé. Par conséquent, toute une partie de leur compte rendu de TP n'avait aucun sens et ils ont donc été lourdement pénalisés à cause de leur confiance aveugle en l'IA. Produire soi-même un code, et demander l'aide de l'IA pour corriger un bug ou demander des améliorations précises, c'est très différent de ne produire aucun code et de demander à l'IA de tout faire. Dans un cas, on fait travailler son cerveau, et l'IA joue le rôle d'un partenaire qui fournit des suggestions souvent pertinentes. Dans l'autre, le cerveau reste au repos, on n'apprend rien, et donc, on perd son temps...

Vous devez donc faire preuve d'esprit critique vis-à-vis de ces outils, qui peuvent être très utiles, mais qui demandent la plus grande vigilance et qui se trompent régulièrement. Or, pour faire preuve d'esprit critique, vous devez être en mesure de comprendre le code fourni par ces IA. Si ça n'est pas le cas, reprenez les explications de ce livre en ligne : tout ce dont vous avez besoin s'y trouve noir sur blanc.

Par ailleurs, **si vous utilisez l'IA pour générer du code, vous devez l'indiquer clairement**, et ça doit rester relativement rare. Quelle(s) partie(s) de vos scripts sont réellement de vous, et quelles parties ont été générées par une IA ? À votre niveau, je vous assure qu'il m'est très facile de savoir si du code a été produit par une IA ou par vous. Si vous n'indiquez pas que du code que vous intégrez à vos scripts n'est pas de vous, c'est de la fraude qui peut faire l'objet de sanctions importantes (passage devant le conseil de discipline de l'établissement par exemple). Donc encore une fois, vous pouvez utiliser ces outils, mais à la double condition que (i) ça soit fait à bon escient (assurez-vous que ce qui est produit par

l'IA est pertinent, que ça a du sens, et que ça reste rare), et (ii), vous indiquiez clairement dans vos scripts quelles lignes ont été produites à l'aide d'une IA (et laquelle).

Enfin, je me permets une dernière mise en garde. De plus en plus d'études démontrent un effet négatif de l'utilisation excessive des LLMs sur la qualité des apprentissages chez les étudiants · es. Par exemple, [cet article \(Stadler et al. 2024\)](#) montre que

Bien que les LLM puissent réduire la charge cognitive associée à la collecte d'informations au cours d'une tâche d'apprentissage, ils ne favorisent pas un engagement profond avec le contenu étudié, pourtant nécessaire à un apprentissage durable et de qualité.

De même, [Kosmyna et al. \(2025\)](#) ont étudié, par électro-encéphalogramme, les performances cognitives de 3 groupes de participants lors d'exercices de productions écrites (rédaction de synthèses scientifiques). Un groupe avait le droit d'utiliser les IA, un groupe était limité à l'utilisation de Google, un autre groupe n'avait aucun accès à ces outils numériques. Globalement, les participants du groupe LLM sont de loin ceux qui obtiennent les moins bons résultats, qui comprennent et retiennent le moins bien ce qu'ils ont fait. Ceux qui n'avaient droit à aucun outil sont ceux qui ont le plus appris car ils ont dû s'investir pleinement dans l'exercice. En particulier, les auteurs soulignent ceci :

Les utilisateurs d'un LLM ont eu du mal à citer correctement leurs propres travaux. Si les LLM offrent une facilité immédiate, nos résultats mettent en évidence des coûts cognitifs potentiels. Sur une période de quatre mois, les utilisateurs d'un LLM ont systématiquement enregistré des résultats inférieurs aux niveaux neuronal, linguistique et comportemental.

Bref, ces outils sont puissants, ils sont parfois très utiles (et ils vont continuer de s'améliorer), mais ils doivent être utilisés intelligemment pour éviter des conséquences très contre-productives pour vos apprentissages. Là encore, c'est à vous de faire preuve de maturité pour en tirer le meilleur !

Évaluation(s)

L'évaluation de la partie "Biométrie" de l'EC "Outils pour l'étude et la compréhension du vivant" aura lieu dans le cadre du travail de stratégie d'échantillonnage que vous mettez en œuvre avec Pierrick Bocher. Une évaluation **formative** servira à évaluer 3 choses :

- les grands principes de stratégie d'échantillonnage abordés par Pierrick Bocher
- la mise en œuvre de méthodes statistiques adaptées pour répondre aux questions scientifiques posées, telles que nous les traitons en Biométrie
- la maîtrise du logiciel **RStudio** pour réaliser les analyses de données pertinentes (de l'importation des données et leur mise en forme dans le logiciel, à la réalisation et l'interprétation correcte des tests statistiques appropriés, en passant par l'exploration des statistiques descriptives et la création de graphiques informatifs). Pour ce dernier volet, vous devrez rendre, en plus de votre compte rendu, votre script d'analyse. C'est ce script qui me permettra d'évaluer votre niveau de compétence et de maîtrise de l'outil, tant sur la forme du script (lisibilité, structure, reproductibilité, etc.) que sur le fond (pertinence des analyses réalisées).


Pour vous aider à comprendre ce qui est attendu, je vous fournis ci-dessous la grille critériée dont je me servirai pour évaluer votre travail. C'est cette même grille qui sera utilisée au semestre 6 dans le cadre de l'évaluation sommative pour la biométrie. Je ne peux donc que vous encourager à lire attentivement les critères d'évaluation ci-dessous et à tenter de vous les approprier. Les séances de TP et de TEA qui viennent doivent vous permettre de vous entraîner à produire des scripts de qualité, et à y intégrer des analyses pertinentes et correctement interprétées.

1. Identifier la ou les méthodes statistiques appropriées pour répondre à cette question
2. Mettre en œuvre ces méthodes dans RStudio
3. Interpréter correctement les résultats obtenus

17

Licence

Ce livre en ligne est sous licence Creative Commons ([CC BY-NC-ND 4.0](#))



Vous êtes autorisé à partager, copier, distribuer et communiquer ce matériel par tous moyens et sous tous formats, tant que les conditions suivantes sont respectées :

① Attribution : vous devez créditer ce travail (donc citer son auteur), fournir un lien vers ce livre en ligne, intégrer un lien vers la licence Creative Commons et indiquer si des modifications du contenu original ont été effectuées. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l’auteur vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son travail.

⊘ Pas d’Utilisation Commerciale : vous n’êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cet ouvrage, ni de tout ou partie du matériel le composant. Cela comprend évidemment la diffusion sur des plateformes de partage telles que studocu.com qui tirent profit d’œuvres dont elles ne sont pas propriétaires, souvent à l’insu des auteurs.

⊖ Pas de modifications : dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l’ouvrage original, vous n’êtes pas autorisé à distribuer ou mettre à disposition l’ouvrage modifié.

🔒 Pas de restrictions complémentaires : vous n’êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser cet ouvrage dans les conditions décrites par la licence.

1 Comparaison de la moyenne d'une population à une valeur théorique

1.1 Pré-requis

Pour travailler dans de bonnes conditions, créez un nouveau dossier sur votre ordinateur, créez un **Rproject** et un script dans ce dossier, et travaillez systématiquement **dans votre script**, et surtout pas directement dans la console. Consultez [le livre en ligne du semestre 3](#) si vous ne savez plus comment faire.

Dans ce chapitre, vous aurez besoin d'utiliser des packages spécifiques et d'importer des données depuis des fichiers externes téléchargeables directement depuis ce document. Les packages dont vous aurez besoin ici et que vous devez donc charger en mémoire, sont :

- le **tidyverse** (Wickham 2023), qui comprend notamment le package **readr** (Wickham, Hester, et Bryan 2026), pour importer facilement des fichiers **.csv** au format **tibble**, le package **dplyr** (Wickham, François, et al. 2026), pour manipuler des tableaux, et le package **ggplot2** (Wickham, Chang, et al. 2026) pour les représentations graphiques.
- **skimr** (Waring et al. 2026), qui permet de calculer des résumés de données très informatifs.

```
library(tidyverse)
library(skimr)
```

⚠ Important

Même si vous avez déjà installé le `tidyverse` ou `dplyr` au semestre précédent, ré-installez `dplyr` avec `install.packages("dplyr")`. Ce package a en effet été mis à jour récemment, et nous aurons besoin d'une version récente ($> v1.1.0$). Chargez-le ensuite en mémoire avec `library(dplyr)`.

! Attention

Pensez à installer tous les packages listés ci-dessous avant de les charger en mémoire si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous ne savez plus comment faire, consultez d'urgence [la section dédiée aux packages dans le livre en ligne de Biométrie du semestre 3](#).

Vous aurez également besoin des jeux de données suivants :

- [Temperature.csv](#)
- [Temperature2.csv](#)

Enfin, je spécifie ici une fois pour toutes le thème que j'utiliserai pour tous les graphiques de ce chapitre. Libre à vous de choisir un thème différent ou de vous contenter du thème proposé par défaut :

```
theme_set(theme_bw())
```

1.2 Contexte

On s'intéresse ici à la température corporelle des adultes en bonne santé. On souhaite examiner la croyance populaire qui veut que cette température vaut en moyenne 37°C . Pour le vérifier, on dispose d'un échantillon de 25 adultes en bonne santé choisis au hasard parmi la population américaine et dont on a mesuré la température. Comme pour toute étude statistique, les étapes que nous allons devoir suivre sont les suivantes (dans l'ordre) :

1. Importer les données dans `RStudio`, les examiner et éventuellement les (re)mettre en forme si besoin.

2. Faire une première exploration des données, grâce au calcul d'indices de statistiques descriptives d'une part, et de représentations graphiques d'autre part.
3. Réaliser un test d'hypothèses en respectant la procédure adéquate (en particulier, la vérification des conditions d'application).

C'est donc ce que nous allons faire dans les sections suivantes.

! À retenir !

Avant de se lancer dans les tests d'hypothèses, il est **toujours indispensable** d'examiner les données dont on dispose à l'aide, d'une part de statistiques descriptives numériques, et d'autre part, de graphiques exploratoires.

Nous avons vu au cours des semestres précédents quels indices statistiques il peut être utile de calculer ([dans le livre en ligne du semestre 4](#)) et quelles représentations graphiques il peut être utile de réaliser ([dans le livre en ligne du semestre 3](#)) afin de pouvoir se lancer dans des tests d'hypothèses sans risquer de grossières erreurs. N'hésitez pas à cliquer sur ces liens pour vous rafraîchir la mémoire !

1.3 Importation et mise en forme des données

Nous allons travailler ici sur les données contenues dans le fichier [Temperature.csv](#). Téléchargez ces données dans votre répertoire de travail (attention : ne les ouvrez pas avec Excel !), puis importez les données dans **RStudio** grâce à l'assistant d'importation. Si vous ne savez plus comment faire, consultez [la section dédiée à l'importation des données dans le livre en ligne de Biométrie du semestre 3](#)

Vous stockerez les données dans un objet que vous nommerez **Temperature**. Après l'importation, tapez son nom dans la console de **RStudio** et vérifiez que vous obtenez bien exactement ce résultat :

Temperature

```
# A tibble: 25 x 2
  individual temperature
      <dbl>         <dbl>
1         1         98.4
2         2         98.6
3         3         97.8
4         4         98.8
5         5         97.9
6         6          99
7         7         98.2
8         8         98.8
9         9         98.8
10        10          99
# i 15 more rows
```

La première chose à faire quand on travaille avec des données inconnues, c'est d'examiner les données brutes. Ici, les données sont importées au format `tibble`, donc seules les premières lignes sont visibles. Pour visualiser l'ensemble du tableau, utilisez la fonction `View()` (avec un `V` majuscule) ou, si vous avez mis en mémoire le `tidyverse`, la fonction `view()` (sans majuscule) :

`View(Temperature)`

Cette commande ouvre un nouvel onglet présentant les données dans un tableur simplifié, en lecture seule. On constate ici 2 choses que nous allons modifier :

1. la première colonne, intitulée `individual`, n'est pas véritablement une variable. Cette colonne ne contient qu'un identifiant sans intérêt pour notre étude et est en fait identique au numéro de ligne. Nous allons donc supprimer cette colonne.
2. les températures sont exprimées en degrés Fahrenheit, ce qui rend leur lecture difficile pour nous qui sommes habitués à utiliser le système métrique et les degrés Celsius. Nous allons donc convertir les températures en degrés Celsius grâce à la formule suivante :

$$C = \frac{F - 32}{1.8}$$

```
Temp_clean <- Temperature |>
  select(-individual) |>      # Suppression de la colonne `individual`
  mutate(                     # Transformation des températures en °Celsius
    temperature = (temperature - 32) / 1.8
  )
```

```
Temp_clean
```

```
# A tibble: 25 x 1
```

```
  temperature
    <dbl>
1      36.9
2      37
3      36.6
4      37.1
5      36.6
6      37.2
7      36.8
8      37.1
9      37.1
10     37.2
# i 15 more rows
```

Il nous est maintenant possible d'examiner à nouveau les données avec la fonction `View()`. Avec des valeurs de températures comprises entre 36.3°C et 37.8°C, il n'y a visiblement pas de données aberrantes.

Examiner les données brutes est donc la première chose que vous devriez prendre l'habitude de faire, et ce de façon systématique, car cela permet de repérer :

- La nature des variables présentes.
- Les variables inutiles qui pourront être supprimées ou négligées.
- Les unités des variables utiles, afin de pouvoir les convertir si nécessaire.
- Les valeurs manquantes, atypiques ou aberrantes qui demanderont toujours une attention particulière.

Maintenant que l'examen préliminaire des données est réalisé, on peut passer au calcul des statistiques descriptives.

1.4 Exploration statistique des données

1.4.1 Position et dispersion

On s'intéresse ici au calcul de grandeurs statistiques nous apportant des renseignements sur la **position** et la **dispersion** des valeurs de l'échantillon. Les questions auxquelles on tente de répondre à ce stade sont les suivantes :

- Quelle est la tendance centrale (moyenne ou médiane) ?
- Quelle est la dispersion des valeurs autour de la tendance centrale (écart-type, variance, intervalle interquartile...) ?

Pour répondre à ces questions, on peut faire appel à de multiples fonctions déjà présentées [dans le livre en ligne du semestre 4](#). Par exemple la fonction `summarise()`, en conjonction avec les fonctions `mean()`, `median()`, `sd()`, `var()`, `min()`, `max()` ou `quantile()`, ou les fonctions `summary()` ou `skim()` (du package `skimr`).

Je prends ici un exemple simple, mais n'hésitez pas à expérimenter avec les méthodes décrites dans le livre en ligne du semestre 4.

```
summary(Temp_clean)
```

```
temperature
Min.      :36.33
1st Qu.:36.67
Median :37.00
Mean     :36.96
3rd Qu.:37.22
Max.     :37.78
```

On constate ici que la moyenne et la médiane sont très proches. La distribution des températures doit donc être à peu près symétrique, avec à peu près autant de valeurs

au-dessus que de valeurs en dessous de la moyenne. Les premier et troisième quartiles sont à peu près aussi éloignés de la médiane l'un que l'autre, ce qui confirme l'apparente symétrie du jeu de données de part et d'autre de la tendance centrale.

La moyenne observée dans l'échantillon vaut 36.96°C, ce qui est très proche de la moyenne théorique de 37°C.

Une autre fonction utile est la fonction `IQR()`, qui renvoie l'étendue de l'intervalle interquartile (la valeur du troisième quartile moins la valeur du premier quartile) :

```
Temp_clean |>
  summarise(IQ_range = IQR(temperature))

# A tibble: 1 x 1
  IQ_range
    <dbl>
1    0.556
```

On constate ici que l'intervalle interquartile a une largeur de 0.56°C. Cela signifie que les 50% des températures les plus centrales de l'échantillon sont situées dans un intervalle d'environ un demi-degré Celsius autour de la médiane.

Enfin, pour obtenir des informations complémentaires, on peut utiliser la fonction `skim()` du package `skimr` :

```
skim(Temp_clean)
```

```
-- Data Summary -----
              Values
Name          Temp_clean
Number of rows      25
Number of columns    1
-----
Column type frequency:
  numeric            1
-----
Group variables      None

-- Variable type: numeric -----
```

	skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
1	temperature	0		1 37.0	0.377	36.3	36.7	37	37.2	37.8	

Tout comme `summary()`, la fonction `skim()` renvoie les valeurs minimales et maximales, les premiers et troisièmes quartiles ainsi que la moyenne et la médiane. Elle nous indique en outre la valeur de l'écart-type de l'échantillon, ainsi que le nombre d'observations et le nombre de données manquantes. Enfin, elle fournit un histogramme très simplifié et sans échelle. Cet histogramme nous permet de nous faire une première idée de la distribution des données et est particulièrement utile pour comparer rapidement un grand nombre de distributions quand il y a plusieurs catégories dans les données (ce qui n'est pas le cas ici).

Outre ces 3 fonctions (`summary()`, `IQR()`, et `skim()`), il est bien sûr possible de calculer toutes ces valeurs manuellement si besoin :

- `mean()` permet de calculer la moyenne.
- `median()` permet de calculer la médiane.
- `min()` et `max()` permettent de calculer les valeurs minimales et maximales respectivement.
- `quantile()` permet de calculer les quartiles.
- `sd()` permet de calculer l'écart-type.
- `var()` permet de calculer la variance.
- `n()` permet de compter le nombre d'observations.

Toutes ces fonctions prennent seulement un vecteur en guise d'argument. Il faut donc procéder comme avec `IQR()` pour les utiliser, en les intégrant à l'intérieur de la fonction `summarise()`. Par exemple, pour calculer la variance, on peut taper :

```
Temp_clean |>
  summarise(variance = var(temperature))

# A tibble: 1 x 1
  variance
  <dbl>
1    0.142
```

ou :

```
Temp_clean |>
  pull(temperature) |>
  var()
```

```
[1] 0.1417901
```

ou encore :

```
var(Temp_clean$temperature)
```

```
[1] 0.1417901
```

À vous d'utiliser la syntaxe qui vous semble la plus simple.

1.4.2 Incertitude

Outre les informations de position et de dispersion, nous avons vu [au semestre 4](#) qu'il était également important d'avoir une idée de l'**incertitude** associée aux estimations de tendance centrale (erreur standard ou intervalle de confiance de la moyenne ou médiane). Ici, nous allons donc calculer l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne. Si vous ne savez plus comment faire, ou que vous ne comprenez pas le code ci-dessous, consultez [le livre en ligne du semestre 4](#) :

```
Temp_clean |>
  reframe(mean_cl_normal(temperature))
```

```
# A tibble: 1 x 3
      y  ymin ymax
<dbl> <dbl> <dbl>
1  37.0  36.8  37.1
```

On constate ici que les bornes inférieure (36.8°C) et supérieure (37.1°C) de l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne sont proches de la valeur de moyenne de l'échantillon. Dans la population générale, la moyenne de la température corporelle chez les adultes en bonne santé a

de bonnes chances de se trouver quelque part entre 36.8°C et 37.1°C. Autrement dit, si la température corporelle des adultes en bonne santé n'est pas exactement de 37°C, l'écart à cette valeur théorique ne doit pas être très important.


1.5 Exploration graphique des données

Ici, puisque nous ne disposons que d'une unique variable numérique et que nous n'avons donc qu'un unique groupe, les représentations graphiques que nous allons réaliser doivent nous permettre d'examiner la **distribution des données**. Pour cela, nous pouvons réaliser soit un histogramme, soit un diagramme de densité.

1.5.1 Histogramme

Voilà comment produire un histogramme de qualité pour les données de températures :

```
Temp_clean |>
  ggplot(aes(x = temperature)) +
  geom_histogram(bins = 10, fill = "firebrick2", color = "grey20",
                 alpha = 0.5) +
  geom_rug() +
  labs(x = "Température (°C)",
       y = "Fréquence",
       title = "Distribution des températures corporelles",
       subtitle = "n = 25 adultes en bonne santé")
```




Si vous ne vous rappelez plus ce qu'est un histogramme ou comment le faire, ou la signification de l'argument `bins`, relisez [la section consacrée aux histogrammes](#) du livre en ligne de Biométrie du semestre 3. Notez que j'ai ajouté une couleur de remplissage et de la transparence pour rendre le graphique plus facile à lire. J'ai également spécifié des titres pour les axes (en précisant l'unité de la variable numérique dont on représente la distribution) ainsi que le titre (et sous-titre) du graphique, qui précise ce qu'on a sous les yeux et la taille de l'échantillon. Il n'est pas toujours nécessaire de spécifier le titre (et le sous-titre) de cette façon : lorsque vous intégrez des graphiques dans un compte rendu ou un rapport, le titre est en général précisé sous la figure, au début d'une légende qui la décrit. Enfin, j'ai ajouté `geom_rug()` pour faire apparaître sous le graphique, le long de l'axe des x , la position des données observées. Cela permet de visualiser les données brutes, et peut donc permettre de mieux comprendre pourquoi un histogramme présente telle ou telle forme.

Ici, la forme de cet histogramme est assez proche de celle présentée plus tôt par l'histogramme très simplifié produit par la fonction `skim()`. Cet histogramme nous apprend qu'en dehors d'un "trou" autour de la température 36.75°C, la distribution des données est proche d'une courbe en cloche. Il y a fort à parier qu'un test de normalité conclurait à la normalité des données de cet échantillon. C'est ce que nous verrons dans la Section [1.6.1](#).

1.5.2 Diagramme de densité

Une autre façon de visualiser la distribution d'une variable numérique est de produire un graphique de densité. Il a l'avantage d'éviter à l'utilisateur d'avoir à choisir une valeur pour l'argument `bin` de la fonction `geom_histogram()`, mais il a l'inconvénient de présenter une échelle plus difficile à comprendre pour l'axe des ordonnées :

```
Temp_clean |>
  ggplot(aes(x = temperature)) +
  geom_density(fill = "firebrick2", alpha = 0.5) +
  geom_rug() +
  labs(x = "Température (°C)",
       y = "Densité",
       title = "Distribution des températures corporelles",
       subtitle = "n = 25 adultes en bonne santé")
```



Les informations apportées par ce graphique sont cohérentes avec celles de l'histogramme :

- les températures les plus fréquemment observées dans notre échantillon de 25 adultes en bonne santé se situent légèrement au-dessus de 37°C. Il s'agit d'une information concernant la **position** des données (c'est-à-dire où se trouve le pic de la distribution sur l'axe des x)
- les températures observées ont une distribution qui ressemble à peu près à une courbe en cloche, avec des valeurs comprises entre 36.4°C et 37.8°C environ. La

symétrie de part et d'autre du pic n'est pas parfaite, mais elle reste bonne. Il s'agit d'informations concernant la forme de la distribution et la **dispersion** des données.

i Bilan des analyses préliminaires

Suite à l'exploration statistique et graphique des données de températures, voilà ce qu'on retient :

1. Il n'y a visiblement pas de données aberrantes.
2. La distribution des données semble suivre à peu près la loi Normale.
3. La médiane et la moyenne sont très proches de 37°C. Un test devrait donc arriver à la conclusion que la température corporelle des adultes n'est pas significativement différente de 37°C.
4. La largeur de l'intervalle de confiance à 95% semble faible, ce qui indique une incertitude relativement faible. Si la température réelle des adultes en bonne santé n'est pas exactement de 37°C, elle ne devrait pas en être très éloignée (quelques dixièmes de degrés Celsius au plus).

1.6 Le test paramétrique

Le test permettant de comparer la moyenne μ d'une population à une valeur théorique, fixée par l'utilisateur, est le **test de Student à un échantillon**. Il permet de répondre à la question suivante :

Les données observées dans l'échantillon dont je dispose sont-elles compatibles avec l'hypothèse que la moyenne μ de la population dont est issu mon échantillon vaut **XXX** ?

avec **XXX**, une valeur d'intérêt spécifiée par l'utilisateur. Il s'agit d'un test paramétrique très puissant. Comme tous les tests paramétriques, certaines conditions d'application doivent être vérifiées avant de pouvoir l'appliquer.

! Important

Comme pour tous les tests statistiques que nous allons réaliser lors de ces séances de TP et TEA, nous devons commencer par **spécifier les hypothèses** nulles et alternatives de chaque test, ainsi que la **valeur du seuil** α que nous allons utiliser. À moins d'avoir une bonne raison de faire autrement, on utilise presque toujours le seuil $\alpha = 0.05$ dans le domaine des sciences du vivant. C'est donc ce seuil que nous utiliserons dans ce livre en ligne.

1.6.1 Conditions d'application

Les conditions d'application du test de Student à un échantillon sont les suivantes :

1. Les données de l'échantillon sont issues d'un **échantillonnage aléatoire** au sein de la population générale. Cette condition est partagée par toutes les méthodes que nous verrons dans ces TP. En l'absence d'informations sur la façon dont l'échantillonnage a été réalisé, on considère que cette condition est remplie. Il n'y a pas de moyen statistique de le vérifier, cela fait uniquement référence à la stratégie d'échantillonnage déployée et à la rigueur de la procédure mise en œuvre lors de l'acquisition des données.
2. La variable étudiée doit suivre une **distribution Normale** dans la population générale. Nous allons vérifier cette condition d'application avec un **test de normalité de Shapiro-Wilk**.

Pour un test de normalité, les hypothèses seront toujours les suivantes :

- H_0 : la variable étudiée suit une distribution Normale dans la population générale.
- H_1 : la variable étudiée ne suit pas une distribution Normale dans la population générale.

Le test de Shapiro-Wilk se réalise de la façon suivante :

```
shapiro.test(Temp_clean$temperature)
```

ou

```
Temp_clean |>  
  pull(temperature) |>  
  shapiro.test()
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: pull(Temp_clean, temperature)  
W = 0.97216, p-value = 0.7001
```

la fonction `pull()` permet d'extraire une colonne (ici `temperature`) d'un tibble (ici `Temp_clean`) et de la transformer en vecteur.

W est la statistique du test. Elle permet à RStudio de calculer la p -value. Ici, $p > \alpha$. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle de normalité : on ne peut pas exclure que dans la population générale, la température suive bel et bien une distribution Normale. Les conditions d'application du test de Student sont bien vérifiées.

⚠ Tests et décision : rappel de cours

À l'issue d'un test statistique, la décision finale est toujours prise par rapport à l'hypothèse nulle (H_0) :

- Si la p -value du test est supérieure ou égale à α , on dit qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0 . Attention, on ne dit jamais que " H_0 est vraie", car il est impossible de le vérifier avec une certitude absolue. Toutefois, les données observées (celles de notre échantillon), sont compatibles avec l'hypothèse nulle que nous avons formulée, jusqu'à preuve du contraire.
- Si la p -value du test est inférieure à α , on dit qu'on rejette l'hypothèse nulle au seuil α . Autrement dit, les données observées ne sont pas compatibles avec l'hypothèse nulle. On accepte alors l'hypothèse alternative (H_A).

L'hypothèse nulle est toujours l'hypothèse la moins “intéressante”, celle pour laquelle “il ne se passe rien de notable” (par exemple : “les données suivent la distribution Normale”, ou “les moyennes sont égales”).

1.6.2 Signification de la p -value


La p -value est une grandeur centrale en statistiques et elle est souvent mal comprise et donc mal interprétée. Je prends donc le temps ici d'expliquer ce qu'est la p -value et comment il faut la comprendre.

Définition : la p -value

La p -value d'un test statistique, c'est la probabilité, si H_0 est vraie, d'obtenir un effet au moins aussi extrême que celui qu'on a observé dans l'échantillon, sous le seul effet du hasard.

Ici, la p -value de notre test de Normalité de Shapiro-Wilk vaut 0.7101. Cela signifie que si les données suivent réellement la loi Normale dans la population générale (donc si H_0 est vraie), l'écart à la Normalité que nous avons observé (ou un écart encore plus important), peut être observé dans 70.1% des cas. Autrement dit, si on prélève un grand nombre d'échantillons de 25 adultes dans la population générale et qu'on regarde à quoi ressemble la distribution des températures dans chacun de ces échantillons, pour 70.1% d'entre eux, la distribution obtenue sera au moins aussi éloignée de la distribution Normale que celle que nous avons observée ici.

Dans notre cas, l'écart entre la loi Normale et les données de notre échantillon peut être visualisé de la façon suivante :




La courbe de densité des données observées est en rouge, et la distribution Normale théorique correspond à la courbe en bleu. Il y a donc un écart entre la courbe en cloche parfaite de la loi Normale et les données observées. La p -value du test de Shapiro-Wilk nous dit que si la température des adultes en bonne santé suit réellement la loi Normale dans la population générale, alors, l'écart que nous avons observé, ou un écart encore plus important, peut être observé simplement par hasard dans 70.1% des cas. Autrement dit, c'est très probable, et on peut donc considérer que l'écart à la loi Normale que nous avons observé est le fruit du hasard et que notre variable suit donc bien la Loi Normale.

Pour bien comprendre cette notion importante, je simule ci-dessous 36 échantillons de 25 adultes dont les températures suivent parfaitement la loi Normale dans la population générale. Je me place donc dans la situation où je sais que H_0 est vraie, pour illustrer la notion de *fluctuation d'échantillonnage*. En raison du seul hasard de l'échantillonnage, et alors même que les échantillons que je génère sont issus d'une population qui suit parfaitement la Normale, la distribution dans chaque échantillon s'écarte parfois fortement de la courbe en cloche théorique :

Distribution des températures corporelles


36 échantillons de $n = 25$ adultes en bonne santé



On voit bien ici que certains échantillons s'écartent fortement de la distribution théorique alors même que tous les échantillons sont issus d'une population Normale. Et plus l'échantillon sera de taille réduite, plus les écarts à la courbe en cloche parfaite seront grands. La preuve ci-dessous avec des échantillons de $n = 15$ adultes au lieu de 25 :

Distribution des températures corporelles

36 échantillons de $n = 15$ adultes en bonne santé



Au final, la p -valeur de 0.701 de notre test de Shapiro-Wilk nous indique que l'hypothèse de la Normalité n'est pas incompatible avec les données que nous avons observées.

Imaginons qu'à l'inverse, nous ayons obtenu une p -valeur très faible, égale à 0.01 par exemple (donc inférieure à notre seuil α de 0.05). Nous aurions alors rejeté l'hypothèse nulle. En effet, obtenir une p -valeur de 0.01, signifie que si H_0 est vraie, obtenir un écart à la courbe en cloche théorique aussi important que celui que nous observons est très peu probable (une chance sur 100). Puisqu'il est très improbable d'observer un tel écart si H_0 est vraie, on en conclut que H_0 n'est pas vraie : les données sont incompatibles avec l'hypothèse nulle et on la rejette donc logiquement.

Cette logique sera valable pour tous les autres tests statistiques que nous aborderons dans cet ouvrage. Pour un test de Normalité, on regarde l'écart entre la distribution Normale et les données observées. Pour un test de comparaison de moyennes, on regarde l'écart entre la moyenne théorique et la moyenne observée, ou entre les 2 moyennes qu'on essaie de comparer. Mais la philosophie reste la même.

1.6.3 Réalisation du test de Student et interprétation

Puisque les conditions d'application du test de Student à un échantillon sont vérifiées, nous avons le droit de faire ce test, et nous devons donc maintenant spécifier les hypothèses nulles et alternatives que nous allons utiliser pour le réaliser :

- H_0 : dans la population générale, la température corporelle moyenne des adultes en bonne santé vaut 37°C ($\mu = 37$).
- H_1 : dans la population générale, la température corporelle moyenne des adultes en bonne santé est différente de 37°C ($\mu \neq 37$).

Hypothèses et paramètres

Notez que les hypothèses des tests statistiques concernent toujours la valeur d'un paramètre de la population générale, et non la valeur des estimateurs calculés dans un échantillon.

On réalise ensuite le test de la façon suivante :

```
t.test(Temp_clean$temperature, mu = 37)
```

ou

```
t.test(temperature ~ 1, mu = 37, data = Temp_clean)
```

ou encore,

```
Temp_clean |>
  pull(temperature) |>
  t.test(mu = 37)
```

One Sample t-test

```
data: pull(Temp_clean, temperature)
t = -0.56065, df = 24, p-value = 0.5802
alternative hypothesis: true mean is not equal to 37
```

```
95 percent confidence interval:
 36.80235 37.11321
sample estimates:
mean of x
 36.95778
```

Les résultats fournis ont une forme particulière qui est utilisée par de nombreuses fonctions de tests statistiques dans R. Ils méritent donc qu'on s'y attarde un peu.

Sur la première ligne, R nous confirme que nous avons bien réalisé un test de Student à un échantillon. La première ligne de résultats fournit la valeur du t calculé (ici, -0.56), le nombre de degrés de liberté (ici, $df = 24$), et la p -value (ici, 0.58 , soit une valeur supérieure à α). Cette première ligne contient donc tous les résultats du test qu'il conviendrait de rappeler dans un rapport. On devrait ainsi dire :

Au seuil α de 5%, le test de Student ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle $\mu = 37$ ($t = -0.56$, $ddl = 24$, $p = 0.58$). Les données observées sont donc compatibles avec l'hypothèse selon laquelle la température corporelle moyenne des adultes en bonne santé vaut 37°C .

C'est de cette manière que vous devriez rapporter les résultats de ce test dans un compte rendu ou un rapport à partir de maintenant.

Dans les résultats du test, la ligne suivante (**alternative hypothesis: ...**) **ne donne pas la conclusion du test**. Il s'agit simplement d'un rappel concernant l'hypothèse alternative qui a été utilisée pour réaliser le test. Ici, l'hypothèse alternative utilisée est une hypothèse bilatérale ($\mu \neq 37$). Nous verrons plus tard comment spécifier des hypothèses alternatives unilatérales, même si la plupart du temps, mieux vaut s'abstenir de réaliser de tels tests (à moins bien sûr d'avoir une bonne raison de le faire).

Les résultats fournis ensuite concernent, non plus le test statistique à proprement parler, mais l'estimation. Ici, la moyenne de l'échantillon est fournie. Il s'agit de la meilleure estimation possible de la moyenne de la population : $\bar{x} = \hat{\mu} = 36.96$. Comme pour toutes les estimations, cette valeur est entachée d'incertitude liée à la fluctuation d'échantillonnage. L'intervalle de confiance à 95% de

cette estimation de moyenne est donc également fourni : [36.80;37.11]. Vous notez qu'il s'agit des mêmes valeurs que celles que nous avons calculées dans la Section 1.4.2. Autrement dit, cet intervalle contient les valeurs les plus vraisemblables pour la véritable valeur de moyenne dans la population générale. Cela confirme bien que nous n'avons pas prouvé au sens strict que la moyenne de la population vaut 37°C. Nous avons en réalité montré que nous ne pouvions pas exclure que la moyenne de la population générale soit de 37°C. Puisque cette valeur est comprise dans l'intervalle de confiance, on ne peut donc pas l'exclure : nos données sont compatibles avec cette hypothèse. Mais beaucoup d'autres valeurs figurent aussi dans cet intervalle. Il est donc tout à fait possible que la moyenne soit en réalité différente de 37°C (par exemple, 36.9°C). Pour en être sûr, il faudrait probablement un échantillon de plus grande taille afin de limiter l'incertitude, d'augmenter la puissance statistique de notre test, et ainsi d'être en mesure de détecter des différences subtiles.

1.7 L'alternative non paramétrique

Si jamais les conditions d'application du test de Student à un échantillon n'étaient pas remplies, il faudrait alors réaliser son équivalent non paramétrique : le **test de Wilcoxon des rangs signés**. Ce test est moins puissant que son homologue paramétrique. On ne l'effectue donc que lorsque l'on n'a pas le choix :

```
wilcox.test(Temp_clean$temperature, mu = 37, conf.int = TRUE)
```

ou

```
wilcox.test(temperature ~ 1, mu = 37, conf.int = TRUE, data = Temp_clean)
```

ou encore

```
Temp_clean |>
  pull(temperature) |>
  wilcox.test(mu = 37, conf.int = TRUE)
```

Wilcoxon signed rank exact test

```
data: pull(Temp_clean, temperature)
V = 143, p-value = 0.6084
alternative hypothesis: true location is not equal to 37
95.9 percent confidence interval:
 36.77778 37.11111
sample estimates:
(pseudo)median
 36.94444
```

La syntaxe est identique à celle du test de Student à un échantillon à une exception près : l'ajout de l'argument `conf.int = TRUE` qui permet d'afficher la (pseudo)médiane de l'échantillon et son intervalle de confiance à 95%.

Les hypothèses nulles et alternatives de ce test sont les mêmes que celles du test de Student à un échantillon. En toute rigueur, on compare la médiane à une valeur théorique, et non la moyenne. Mais dans la pratique, la grande majorité des utilisateurs de ce test font l'amalgame entre moyenne et médiane. Ici, la conclusion correcte devrait donc être :

Au seuil α de 5%, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle (test de Wilcoxon des rangs signés, $V = 143$, $p = 0.6077$). La médiane de la population ($\widehat{med} = 36.94$) n'est pas significativement différente de 37°C (IC 95% : [36.78; 37.11]).

Si les données ne suivent pas la loi Normale, la médiane est bien la métrique la plus intéressante puisque c'est elle qui nous renseigne sur la tendance centrale des données.

Enfin, les tests de Wilcoxon renvoient souvent des messages d'avertissement. Il ne s'agit que de ça : des avertissements. Tant que la p -value d'un test est éloignée de la valeur seuil α , cela n'a pas d'importance. Quand en revanche la p -value est très proche de α , les messages d'avertissement doivent vous alerter : il faut être très prudent face aux conclusions du test qui peuvent alors être assez "fragiles".

1.8 Les notions d'erreur et de puissance statistique

Pour avoir le droit de réaliser un test paramétrique, il faut au préalable vérifier qu'un certain nombre de conditions sont vérifiées. Si ce n'est pas le cas, on réalise un équivalent non paramétrique. On peut alors se demander pourquoi ne pas se contenter de faire des tests non paramétriques systématiquement, sans s'embêter à faire des tests supplémentaires ou des tests paramétriques.

La raison est simple et elle est liée aux notions d'erreur et de puissance statistique.

Définitions

- **Erreur de type I** : notée α , c'est la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle. C'est donc la probabilité de rejeter H_0 alors qu'elle est vraie.
- **Erreur de type II** : notée β , c'est la probabilité d'accepter à tort l'hypothèse nulle. C'est donc la probabilité d'accepter H_0 alors qu'elle est fausse.
- **Puissance statistique** : notée $1 - \beta$, c'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle à raison. C'est donc la probabilité de rejeter H_0 quand elle est réellement fausse.

À chaque fois que l'on réalise un test statistique, on commet nécessairement les 2 types d'erreurs α et β . On souhaite évidemment minimiser les erreurs, mais on ne peut malheureusement pas faire baisser les 2 en même temps. Faire baisser α (pour diminuer les faux positifs) conduit toujours à augmenter β (les faux négatifs). Faire baisser α revient en effet à accepter plus souvent l'hypothèse nulle quand elle est vraie. Cela conduit inévitablement à accepter aussi plus souvent l'hypothèse nulle quand elle est fausse (et donc, à augmenter les faux négatifs).

Pour bien comprendre l'enjeu associé à ces erreurs, prenons l'exemple de notre système judiciaire. Lorsqu'un accusé est jugé, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Le procès est l'équivalent d'un test statistique, avec :

- H_0 : l'accusé est innocent
- H_1 : l'accusé est coupable

Commettre une erreur de type I revient à condamner à tort l'accusé (on rejette à tort H_0), donc on condamne un innocent. À l'inverse, commettre une erreur de type II revient à libérer un coupable (accepter à tort H_0). Un système de justice plus strict condamnera un plus grand nombre d'accusés, qu'ils soient coupables ou non. Un système plus strict fera donc augmenter l'erreur de type I et baisser l'erreur de type II. À vous de voir ce que vous préférez : libérer plus de coupables, ou condamner plus d'innocents ?

En statistiques, la question est tranchée puisqu'on préfère maintenir l'erreur de type I à un niveau assez faible (à 5% ou moins), quitte à laisser augmenter l'erreur de type II (qui est considérée comme acceptable jusqu'à 20% environ). Toutefois, seule l'erreur de type I est sous notre contrôle. En effet, c'est nous qui la choisissons lorsque l'on fixe le seuil α de nos tests statistiques.

! À retenir

C'est vous qui fixez l'erreur de type I lorsque vous faites un test statistique. L'erreur de type I est le seuil α du test, que l'on fixe en général à 0,05 (soit 5%) dans le domaine des sciences du vivant.

Une fois que le seuil α est fixé, l'erreur β l'est aussi dans une certaine mesure. Mais on ne peut la connaître avec précision car elle dépend de beaucoup de choses, notamment la taille des échantillons dont on dispose, la variabilité des données, le type de test réalisé, etc. En général, **plus la taille de l'échantillon sera grande, plus l'erreur β sera faible, et donc plus la puissance sera élevée**. De même, par rapport aux tests non paramétriques, les tests paramétriques permettent de minimiser l'erreur β et donc d'augmenter la puissance.

Puisque la puissance statistique vaut $1 - \beta$, cela revient à dire que les tests paramétriques sont plus puissants que les tests non paramétriques (parfois, beaucoup plus). Au contraire des erreurs de type I et II, la puissance est une grandeur que l'on souhaite maximiser. On aimerait en effet être capables de systématiquement rejeter H_0 quand elle est fausse. Nous avons

vu plus haut que c'est hélas impossible. Mais choisir le bon test et la bonne procédure statistique permettent néanmoins d'augmenter la puissance, jusqu'à un certain point. C'est la raison pour laquelle on réalisera toujours un test paramétrique si les données dont on dispose le permettent (donc si les conditions d'application des tests paramétriques sont respectées). Et ce n'est qu'en dernier recours qu'on se tournera vers les tests non paramétriques, toujours moins puissants.

! Important

Un test paramétrique est toujours plus puissant que ses homologues non paramétriques. Avec un test paramétrique, il est donc plus probable de rejeter H_0 à raison qu'avec un test non paramétrique.

1.9 Bilan

Nous avons vu dans ce chapitre quelle est la procédure à suivre pour réaliser un test de comparaison de la moyenne d'une population à une valeur théorique :

1. examen préliminaire des données
2. calcul de statistiques descriptives
3. création de graphiques exploratoires
4. vérification des conditions d'application du test paramétrique
5. réalisation du test paramétrique ou non paramétrique selon l'issue de l'étape 4

Mais nous avons aussi abordé des notions statistiques essentielles pour la suite :

1. Les ingrédients indispensables pour réaliser un test statistique (les hypothèses nulle et alternative, la statistique du test et le seuil α).
2. La p -value et la décision du test.
3. Les erreurs de type I (α) et II (β).
4. La puissance statistique ($1 - \beta$) qui n'a rien à voir avec la notion de précision.
5. La notion de test paramétrique ou non paramétrique.

Assurez-vous d'avoir les idées claires sur toutes ces notions car elles sont absolument centrales pour ne pas faire/dire de bêtises lorsque l'on analyse des données.

1.10 Exercice d'application

Le fichier [Temperature2.csv](#) contient les données brutes d'une seconde étude similaire, réalisée à plus grande échelle. Importez ces données et analysez-les afin de vérifier si la température corporelle moyenne des adultes en bonne santé vaut bien 37°C . Comme toujours, avant de vous lancer dans la réalisation des tests statistiques, prenez le temps d'examiner vos données comme nous l'avons décrit dans la Section 1.4 et la Section 1.5, afin de savoir où vous allez, et de repérer les éventuelles données manquantes ou aberrantes. Enfin, interprétez les résultats à la lumière des notions que nous avons abordées ici (en particulier la notion de puissance statistique).

2 Comparaison de moyennes : deux échantillons appariés

2.1 Pré-requis

Pour ce nouveau chapitre, je vous conseille de travailler dans un nouveau script que vous placerez dans votre répertoire de travail, et dans une nouvelle session de travail (Menu **Session > Restart R**). Inutile en revanche de créer un nouveau **Rproject** : vous pouvez tout à fait avoir plusieurs scripts dans le même répertoire de travail et pour un même **Rproject**. Comme toujours, consultez [le livre en ligne du semestre 3](#) si vous ne savez plus comment faire.

Si vous êtes dans une nouvelle session de travail (ou que vous avez quitté puis relancé **RStudio**), vous devrez penser à recharger en mémoire les packages utiles. Dans ce chapitre, vous aurez besoin d'utiliser les mêmes packages que précédemment :

- le **tidyverse** (Wickham 2023), qui comprend notamment le package **readr** (Wickham, Hester, et Bryan 2026), pour importer facilement des fichiers **.csv** au format **tibble**, le package **dplyr** (Wickham, François, et al. 2026), pour manipuler des tableaux, et le package **ggplot2** (Wickham, Chang, et al. 2026) pour les représentations graphiques.
- **skimr** (Waring et al. 2026), qui permet de calculer des résumés de données très informatifs.

```
library(tidyverse)
library(skimr)
```

Vous aurez également besoin des jeux de données suivants que vous pouvez dès maintenant télécharger dans votre répertoire de travail :

- [Autruches.csv](#)
- [Testosterone.csv](#)

Enfin, je spécifie ici une fois pour toutes le thème que j'utiliserai pour tous les graphiques de ce chapitre. Libre à vous de choisir un thème différent ou de vous contenter du thème proposé par défaut :

```
theme_set(theme_bw())
```

2.2 Contexte

On s'intéresse ici à la comparaison de 2 séries de données dont les observations sont liées 2 à 2. C'est par exemple le cas lorsque l'on fait subir un traitement à différents sujets et que l'on souhaite comparer les mesures obtenues avant et après le traitement.

Autrement dit, dans les plans d'expériences appariés, **les deux traitements** ou modalités **sont appliqués à chaque unité d'échantillonnage** : chaque sujet ou unité d'échantillonnage fournit plusieurs valeurs. Ça n'était pas le cas du chapitre précédent (Chapitre 1) où chaque adulte n'avait fourni qu'une unique valeur de température.

Voici quelques exemples de situations qui devraient être traitées avec des tests sur données appariées :

- Comparaison de la masse de patients avant et après une hospitalisation.
- Comparaison de la diversité de peuplements de poissons dans des lacs avant et après contamination par des métaux lourds.
- Test des effets d'une crème solaire appliquée sur un bras de chaque volontaire alors que l'autre bras ne reçoit qu'un placebo.
- Test des effets du tabagisme dans un échantillon de fumeurs, dont chaque membre est comparé à un non fumeur choisi pour qu'il lui ressemble le plus possible en termes d'âge, de masse, d'origine ethnique et sociale, etc.

- Test des effets que les conditions socio-économiques ont sur les préférences alimentaires en comparant des vrais jumeaux élevés dans des familles adoptives séparées qui diffèrent en termes de conditions socio-économiques.

Les 2 derniers exemples montrent que même des individus séparés peuvent constituer une “paire statistique” s’ils partagent un certain nombre de caractéristiques (physiques, environnementales, génétiques, comportementales, etc.) pertinentes pour l’étude.

Ici, nous allons nous intéresser au lien qui pourrait exister entre la production de testostérone et l’immunité chez une espèce d’oiseau vivant en Amérique du Nord, [le carouge à épaulettes](#).



Figure 2.1: Le carouge à épaulettes

Chez de nombreuses espèces, les mâles ont plus de chances d’attirer des femelles s’ils produisent des niveaux de testostérone élevés. Est-ce que la forte production de testostérone de certains mâles a un coût, notamment en termes d’immunocompétence ? Autrement dit, est-ce que produire beaucoup de testostérone au moment de la reproduction (ce qui fournit un avantage sélectif) se traduit par une immunité plus faible par la suite, et donc une plus forte susceptibilité de contracter des maladies (ce qui constitue donc un désavantage sélectif) ? Ce type de question est

central pour comprendre comment l'allocation des ressources affecte à la fois la survie et la fécondité des individus.

Pour étudier cette question, une équipe de chercheurs (Hasselquist et al. 1999) a mis en place le dispositif expérimental suivant. Les niveaux de testostérone de 13 carouges à épaulettes mâles ont été artificiellement augmentés par l'implantation chirurgicale d'un microtube perméable contenant de la testostérone. L'immunocompétence a été mesurée pour chaque oiseau avant et après l'opération chirurgicale. La variable mesurée est la production d'anticorps suite à l'exposition des oiseaux avec un antigène non pathogène mais censé déclencher une réponse immunitaire. Les taux de production d'anticorps sont exprimés en logarithmes de densité optique par minute ($\ln \frac{mOD}{min}$). Si la production de testostérone influence l'immunocompétence, on s'attend à observer des différences de production d'anticorps avant et après l'intervention chirurgicale.

2.3 Importation et mise en forme des données

Les données se trouvent dans le fichier [Testosterone.csv](#). Importez ces données dans un objet nommé `Testo` et affichez son contenu.

```

Testo

# A tibble: 13 x 5
  blackbird beforeImplant afterImplant logBeforeImplant logAfterImplant
    <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl>
1         1         105           85           4.65           4.44
2         2          50           74           3.91           4.3
3         3         136          145           4.91           4.98
4         4          90           86           4.5            4.45
5         5         122          148           4.8            5
6         6         132          148           4.88            5
7         7         131          150           4.88           5.01
8         8         119          142           4.78           4.96
9         9         145          151           4.98           5.02
10        10         130          113           4.87           4.73
11        11         116          118           4.75           4.77

```

12	12	110	99	4.7	4.6
13	13	138	150	4.93	5.01

Visiblement, il n'y a pas de données manquantes mais certaines variables sont inutiles. En effet, nous aurons besoin des variables transformées en logarithmes, mais pas des 2 colonnes `beforeImplant` et `afterImplant`. Nous allons donc les retirer avec la fonction `select()`. Par ailleurs, la variable `blackbird` est importante puisque chaque individu a fourni 2 valeurs de production d'anticorps : 1 avant et 1 après l'opération chirurgicale. Il sera donc important de conserver cet identifiant individuel. Toutefois, il apparaît ici sous la forme d'une variable numérique alors qu'il s'agit d'un identifiant, d'un code. Il faut donc le transformer en facteur car cela n'aurait pas de sens de calculer une moyenne des identifiants par exemple. Pour cela, nous utiliserons la fonction `factor()` à l'intérieur de `mutate()`. Enfin, nous renommerons les colonnes avec `rename()` pour avoir des noms plus courts et plus faciles à utiliser. Si vous ne vous rappelez plus comment utiliser ces fonctions, consultez ces chapitres du livre en ligne de biométrie du semestre 3 : [select\(\) et rename\(\)](#), [mutate\(\) et factor\(\)](#). Enfin, nous donnerons le nom `Testo_large` au tableau modifié :

```
Testo_large <- Testo |>
  select(-beforeImplant, -afterImplant) |> # Suppression des colonnes inutiles
  mutate(blackbird = factor(blackbird)) |> # Transformation en facteur
  rename(ID = blackbird,                    # Changement des noms de variables
         Before = logBeforeImplant,
         After = logAfterImplant)

Testo_large

# A tibble: 13 x 3
  ID    Before After
  <fct>  <dbl> <dbl>
1 1      4.65  4.44
2 2      3.91  4.3
3 3      4.91  4.98
4 4      4.5   4.45
5 5      4.8   5
6 6      4.88  5
```

7	7	4.88	5.01
8	8	4.78	4.96
9	9	4.98	5.02
10	10	4.87	4.73
11	11	4.75	4.77
12	12	4.7	4.6
13	13	4.93	5.01

Le tableau `Testo_large` dont nous disposons maintenant n'est pas dans un format qui nous permettra de réaliser toutes les opérations dont nous aurons besoin. En réalité, il ne s'agit pas d'un "tableau rangé" au sens du tidyverse. Un tableau rangé est un tableau dans lequel chaque ligne correspond à une unique observation et chaque colonne correspond à une unique variable. Ici, nous devrions avoir les 3 variables suivantes :

1. L'identifiant des individus. La colonne ID correspond à cette variable.
2. Le moment auquel chaque mesure a été effectuée, avant ou après l'opération chirurgicale. Cette information est pour l'instant stockée dans l'en-tête des colonnes 2 et 3 du tableau `Testo_large`
3. La mesure de réponse immunitaire (en logarithme de la densité optique par minute). Cette information est pour l'instant stockée sous forme de valeurs numériques dans les colonnes 2 et 3 du tableau `Testo_large`

Pour obtenir un tableau rangé, il nous faut donc réorganiser les colonnes 2 et 3 du tableau `Testo_large` :

- l'en-tête de ces 2 colonnes devrait constituer une nouvelle variable que nous nommerons `Moment`
- le contenu de ces 2 colonnes (les valeurs numériques) devrait constituer une nouvelle variable que nous nommerons `DO` (pour densité optique).

Pour effectuer cette transformation, nous utiliserons la fonction `pivot_longer()` du package `tidyr` (il est déjà chargé en mémoire si vous avez chargé le `tidyverse`). Comme son nom l'indique, cette fonction produira un tableau plus "long" (qui aura plus de lignes) que le tableau de départ. Nous l'appellerons donc `Testo_long` :

```

Testo_long <- Testo_large |>
  pivot_longer(cols = c(Before, After), # Les colonnes qu'on veut réorganiser
               names_to = "Moment", # Quel nom donner à la variable qui contiendra les
               values_to = "D0") |> # Quel nom donner à la variable qui contiendra l
  mutate(Moment = factor(Moment, levels = c("Before", "After")))

```

```
Testo_long
```

```

# A tibble: 26 x 3
   ID      Moment    D0
  <fct> <fct>   <dbl>
1 1      Before  4.65
2 1      After  4.44
3 2      Before  3.91
4 2      After  4.3
5 3      Before  4.91
6 3      After  4.98
7 4      Before  4.5
8 4      After  4.45
9 5      Before  4.8
10 5     After  5
# i 16 more rows

```

Ce nouvel objet contient les mêmes données que précédemment, mais sous un format différent (il contient maintenant 26 lignes et non plus 13) : il s'agit d'un tableau rangé.

La plupart du temps, on a besoin de ces 2 formats de tableaux quand nous traitons des données. Le tableau au format long est à privilégier pour les représentations graphiques et les tests statistiques, et le format court sert souvent à présenter des résultats sous une forme synthétique. Mais parfois (et c'est justement le cas quand on dispose de données appariées comme pour notre exemple de lien entre testostérone et immunocompétence), le tableau au format large permettra de faire certains graphiques, certains tests ou certaines manipulations plus facilement que le tableau rangé au format long. Si on ne dispose que d'un tableau au format large, on peut passer au format long, comme nous venons de le faire, grâce à la fonction `pivot_longer()`. Et si on ne dispose que d'un tableau au format long, on peut passer au format large grâce à la fonction `pivot_wider()`. Nous avons déjà évoqué cette

fonction dans le livre en ligne de biométrie du semestre 4 pour mettre en forme des résultats obtenus avec `summarise()` ([par exemple ici](#)) ou `reframe()` ([ou là](#)), et je vous encourage à y jeter un œil à nouveau pour vous remémorer la syntaxe. Car il est important que vous maîtrisiez ces 2 fonctions dont vous aurez très souvent besoin.

Maintenant que nous disposons de ces 2 tableaux, `Testo_large` et `Testo_long`, nous pouvons commencer à décrire nos données.

2.4 Exploration statistique des données

Pour décrire simplement les données, nous nous en tiendrons ici à l'utilisation des fonctions `summary()` et `skim()`.

Pour la fonction `summary()`, le plus simple est toujours d'utiliser le tableau au format large :

```
summary(Testo_large)
```

	ID	Before	After
1	:1	Min. :3.910	Min. :4.30
2	:1	1st Qu.:4.700	1st Qu.:4.60
3	:1	Median :4.800	Median :4.96
4	:1	Mean :4.734	Mean :4.79
5	:1	3rd Qu.:4.880	3rd Qu.:5.00
6	:1	Max. :4.980	Max. :5.02
(Other):	7		

On constate ici que pour les 2 traitements, les valeurs des différents indices sont très proches entre les 2 séries de données, avec des valeurs de densité optique (DO) légèrement supérieures après l'opération chirurgicale (sauf pour le premier quartile).

Pour la fonction `skim()` le plus simple est là aussi d'utiliser le tableau large :

```
skim(Testo_large)
```

```
-- Data Summary -----
Name                                     Values
Number of rows                         13
Number of columns                      3

-----
Column type frequency:
  factor                               1
  numeric                             2

-----
Group variables                        None

-- Variable type: factor -----
skim_variable n_missing complete_rate ordered n_unique top_counts
1 ID          0          1 FALSE          13 1: 1, 2: 1, 3: 1, 4: 1

-- Variable type: numeric -----
skim_variable n_missing complete_rate mean    sd    p0 p25  p50  p75 p100 hist
1 Before      0          1 4.73 0.280 3.91 4.7 4.8  4.88 4.98
2 After      0          1 4.79 0.262 4.3  4.6 4.96 5   5.02
```

On arrive toutefois aux mêmes résultats avec le tableau long,
à condition de grouper les données par traitement (variable
Traitement) avec `group_by()` :

```
Testo_long |>
  group_by(Moment) |>
  skim(DO)
```

```
-- Data Summary -----
Name                                     Values
Number of rows                         26
Number of columns                      3

-----
Column type frequency:
  numeric                             1

-----
Group variables                        Moment

-- Variable type: numeric -----
skim_variable Moment n_missing complete_rate mean    sd    p0 p25  p50  p75
```

```

1 DO          Before          0          1 4.73 0.280 3.91 4.7 4.8 4.88
2 DO          After           0          1 4.79 0.262 4.3 4.6 4.96 5
  p100 hist
1 4.98
2 5.02

```

Cela revient à demander à la fonction `skim()` de produire un résumé des données de densité optique (variable `DO`), pour chaque catégorie de la variable `Moment`, soit un résumé pour la catégorie `Before` (avant l'intervention chirurgicale), et un résumé pour la catégorie `After` (après l'intervention chirurgicale).

Par rapport aux résultats fournis par la fonction `summary()`, la fonction `skim()` nous permet de confirmer que les valeurs de `DO` sont très légèrement supérieures après l'opération (sauf pour le premier quartile). Elle nous permet également de constater que l'écart-type est du même ordre de grandeur pour les 2 catégories, bien qu'il soit légèrement plus faible après l'opération. Enfin, les petits histogrammes laissent entrevoir une distribution très asymétrique des données dans chacun des 2 groupes de mesures.

2.5 Exploration graphique des données

Ici, c'est le tableau rangé au format long qui sera le plus adapté. Lorsque nous avons une unique série de données, nous avons utilisé 2 types de représentations graphiques très similaires pour visualiser les données (les histogrammes et les graphiques de densités). Ici, nous allons utiliser ces mêmes types de graphiques mais "facettés". Les graphiques facettés ont été abordés dans [le livre en ligne de biométrie du semestre 3](#). Ils permettent de faire des sous-graphiques pour chaque catégorie d'un facteur. Ici, le facteur `Moment` contient 2 catégories. Les facets nous permettront donc de comparer les 2 distributions de densités optiques.

Outre ces graphiques, nous utiliserons aussi les stripcharts et les boîtes à moustaches pour comparer les 2 catégories. Ces 2 types de graphiques sont particulièrement adaptés pour ce genre de tâche, et seront aussi très utiles pour l'ANOVA lorsque nous aurons plus de 2 catégories à comparer.


D'une façon générale, nous disposons :

- d'une variable numérique, **DO** : la mesure de densité optique qui rend compte de l'immunocompétence des carcasses à épaulettes
- d'une variable catégorielle, le facteur **Moment** : indique si les valeurs d'immunocompétences ont été mesurées avant ou après l'opération chirurgicale d'implantation de la capsule de testostérone.

Tous les graphiques présentés dans [le chapitre consacré à cette situation précise](#) dans le livre en ligne de biométrie du semestre 3, peuvent être réalisés. N’hésitez pas à le relire, en particulier la section expliquant comment faire apparaître et interpréter les encoches d’incertitudes sur des boîtes à moustaches.

2.5.1 Avec un stripchart


```
Testo_long |>
  ggplot(aes(x = Moment, y = D0)) +
  geom_jitter(height = 0, width = 0.25) +
  labs(y = "immunocompétence (log D0 / minute)",
       title = "immunocompétence\navant et après l'opération",
       subtitle = "n = 13 carouges à épaulettes")
```



2.5.2 Avec des histogrammes facettés

Nous allons faire un histogramme pour chaque série de données en utilisant des facettes :


```
Testo_long |>
  ggplot(aes(x = DO)) +
  geom_histogram(bins = 10, fill = "firebrick2", color = "grey20", alpha = 0.5)+
  geom_rug() +
  facet_wrap(~Moment, ncol = 1) +
  labs(x = "immunocompétence (log DO / minute)",
       y = "Fréquence",
       title = "Comparaison de l'immunocompétence avant et après l'opération chirurgicale",
       subtitle = "n = 13 carouges à épaulettes")
```



2.5.3 Avec des diagrammes de densité facettés

```
Testo_long |>
  ggplot(aes(x = DO)) +
  geom_density(fill = "firebrick2", alpha = 0.5) +
  geom_rug() +
  facet_wrap(~Moment, ncol = 1) +
  labs(x = "immunocompétence (log DO / minute)",
       y = "Densité",
       title = "Comparaison de l'immunocompétence avant et après l'opération chirurgicale",
       subtitle = "n = 13 carouges à épaulettes")
```


Comparaison de l'immunocompétence avant et après l'opération
n = 13 carouges à épaulettes



2.5.4 Avec des boîtes à moustaches

```
Testo_long |>
  ggplot(aes(x = Moment, y = DO)) +
  geom_boxplot(notch = TRUE) +
  expand_limits(y = 5.2) +
  labs(y = "immunocompétence (log DO / minute)",
       title = "Comparaison de l'immunocompétence avant et après opération chirurgicale",
       subtitle = "n = 13 carouges à épaulettes")
```

Notch went outside hinges
i Do you want `notch = FALSE`?




Du point de vue de la **position** des données, ces différents graphiques montrent tous que la seconde série de données (catégorie **After** : après l'opération chirurgicale) présente en moyenne des valeurs très légèrement plus élevées que la première (catégorie **Before** avant l'opération). En termes de **dispersion**, si l'on met de côté la valeur minimale de la série **Before** qui semble atypique (un individu outlier qui présente une immunocompétence très faible avant l'opération), la dispersion des données autour de la tendance centrale semble globalement plus importante pour la série **After**. Enfin, pour ce qui concerne l'**incertitude**, les intervalles de confiance à 95% des médianes (qui apparaissent sous la forme d'encoches sur les boîtes à moustaches) se chevauchent assez largement, ce qui nous permet d'anticiper les résultats des tests que nous ferons ensuite : puisque les encoches se chevauchent, il y a fort à parier que le test de comparaison de moyenne ne montrera aucune différence significative. On note également que l'encoche de la série **After** est particulièrement large : la limite supérieure de l'intervalle de confiance à 95% de la médiane est supérieure à la valeur maximale observée dans l'échantillon. Cela traduit le fait que compte tenu de la grande variabilité des données dans cette série, un échantillon de taille $n = 13$ n'est probablement pas suffisant pour avoir une estimation précise de la médiane.

2.5.5 Avec un nuage de points appariés

Toutes ces représentations graphiques sont certes utiles, mais elles masquent un élément crucial : ce sont les mêmes individus qui sont étudiés avant et après l'opération. Il s'agit de données appariées ! Les graphiques que nous avons faits jusque-là ne permettent pas de visualiser ce lien entre les deux séries de données. Pour avoir une bonne vision de ce qui se passe, il nous faut faire apparaître ce lien entre les 2 séries de données :

```
Testo_long |>
  ggplot(aes(x = Moment, y = DO, group = ID, color = ID)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  labs(y = "immunocompétence (log DO / minute)",
       title = "Comparaison de l'immunocompétence avant et après opération chirurgicale",
       subtitle = "n = 13 carouges à épaulettes",
       color = "Individu")
```



Ce graphique nous donne une image très différente de la réalité des données. On constate ici que l'immunocompétence de certains individus augmente après l'opération (parfois fortement), alors que pour d'autres, elle diminue.

Une façon d'estimer si les changements d'immunocompétence sont majoritairement orientés dans un sens ou non est de calculer l'intervalle de confiance à 95% de la différence d'immunocompétence entre avant et après l'opération. Pour cela, on peut calculer, grâce au tableau large `Testo_large`, les différences d'immunocompétences (DO après opération moins DO avant opération), pour chacun des 13 individus. Puis, grâce à la fonction `mean_cl_normal()` déjà utilisée à plusieurs reprises, on calcule l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne de cette différence :

```
# Calcul de la différence de DO (After - Before)
Testo_large <- Testo_large |>
  mutate(Difference = After - Before)

# Affichage du tableau
Testo_large
```



```
# A tibble: 13 x 4
  ID    Before After Difference
  <fct> <dbl> <dbl>      <dbl>
1 1      4.65  4.44    -0.21
2 2      3.91  4.3     0.390
3 3      4.91  4.98     0.0700
4 4      4.5   4.45    -0.0500
5 5      4.8   5       0.200
6 6      4.88  5       0.120
7 7      4.88  5.01     0.130
8 8      4.78  4.96     0.180
9 9      4.98  5.02     0.0400
10 10     4.87  4.73    -0.140
11 11     4.75  4.77     0.0200
12 12     4.7   4.6     -0.100
13 13     4.93  5.01     0.0800
```



```
# Calcul de la moyenne des différences et de son IC95%
Testo_large |>
  reframe(mean_cl_normal(Difference))
```



```
# A tibble: 1 x 3
  y    ymin ymax
```

```
<dbl>    <dbl> <dbl>
1 0.0562 -0.0401 0.152
```

On constate ici que la moyenne des différences de densité optique vaut 0.06, soit une valeur positive, qui montre que l'immunocompétence augmente après l'opération (ce qui semble aller à l'opposé de l'hypothèse des chercheurs). Cette moyenne reste néanmoins très proche de 0. D'ailleurs, l'intervalle de confiance de cette moyenne comprend les valeurs situées entre -0.04 et +0.15. La valeur 0 est donc comprise dans cet intervalle. Le zéro fait donc partie des valeurs les plus probables pour la moyenne de ces différences dans la population générale. C'est là encore un résultat qui nous permet d'anticiper sur les résultats du test statistique que nous ferons ensuite.

2.6 Le test paramétrique

2.6.1 Procédure

Le test paramétrique permettant de comparer la moyenne sur des séries appariées est là encore un test de Student : le **test de Student sur données appariées** (étonnant non ?...). En réalité, ce test de Student n'est pas un test de comparaison de moyennes entre 2 séries de données. La procédure est la suivante :

1. Pour chaque individu, calculer la différence d'immunocompétence entre les deux temps de l'expérience (DO après - DO avant opération). C'est ce que nous avons fait plus haut en ajoutant la colonne **Difference** au tableau **Testo_large**.
2. Puisque nous avons 13 individus, nous aurons 13 valeurs de différences. La moyenne de cette différence sera comparée à la valeur théorique 0. Autrement dit, si cette moyenne vaut 0, l'immunocompétence sera la même avant et après l'opération. Si la moyenne des différences n'est pas égale à 0, alors nous aurons prouvé qu'il existe une différence d'immunocompétence entre les 2 groupes, nous aurons prouvé que la procédure chirurgicale d'implantation de la capsule de testostérone

a un impact sur l'immunocompétence des carouges à épaulettes

Attention

Dans un test sur données appariées, on s'intéresse à **la moyenne des différences** entre les données des 2 séries. Cette moyenne est alors comparée à la valeur théorique $\mu = 0$. Ce test est donc équivalent au test vu dans le Chapitre 1 sur la comparaison de la moyenne d'une population à une valeur théorique.

Notez également que **la moyenne des différences** n'est pas équivalente à **la différence des moyennes**. La différence des moyennes est une grandeur qui nous sera utile dans le chapitre suivant (Chapitre 3) sur la comparaison de la moyenne de deux populations lorsque les données sont indépendantes.

2.6.2 Conditions d'application

Les conditions d'application de ce test paramétrique sont presque les mêmes que pour le test de Student à un échantillon :

1. Les individus sur lesquels porte la comparaison doivent être issus d'un échantillonnage aléatoire. Comme toujours, en l'absence d'indication contraire, on considère que cette condition est vérifiée.
2. Les différences par paires entre les 2 modalités du traitement doivent suivre une distribution Normale. Attention, ce n'est donc pas les données brutes de chaque série qui doivent suivre une loi Normale, mais bien la différence "après" - "avant" calculée pour chaque individu. Nous avons déjà calculé ces différences plus haut :


```
# On s'intéresse aux 13 différences calculées sur les 13 individus
Testo_large
```

```
# A tibble: 13 x 4
  ID   Before After Difference
<fct> <dbl> <dbl>     <dbl>
```

1	1	4.65	4.44	-0.21
2	2	3.91	4.3	0.390
3	3	4.91	4.98	0.0700
4	4	4.5	4.45	-0.0500
5	5	4.8	5	0.200
6	6	4.88	5	0.120
7	7	4.88	5.01	0.130
8	8	4.78	4.96	0.180
9	9	4.98	5.02	0.0400
10	10	4.87	4.73	-0.140
11	11	4.75	4.77	0.0200
12	12	4.7	4.6	-0.100
13	13	4.93	5.01	0.0800

Il nous faut donc tester la Normalité de la nouvelle variable **Difference**. Commençons par en faire un graphique :

```
Testo_large |>
  ggplot(aes(x = Difference)) +
  geom_density(fill = "firebrick2", alpha = 0.5) +
  geom_rug() +
  labs(x = "Différence d'immunocompétence 'Après - Avant' l'opération (log DO / minute)",
       y = "Densité",
       title = "Distribution de la différence d'immunocompétence entre après et avant l'o",
       subtitle = "n = 13 carouges à épaulettes")
```



Compte tenu du faible nombre d'individus ($n = 13$), la forme de cette courbe de densité n'est pas si éloignée que ça d'une courbe en cloche (notez que ce n'était pas du tout le cas pour

les données brutes de chaque série de départ qui ont toutes les deux des distributions très éloignées de la distribution Normale). On le vérifie avec un test de normalité de Shapiro-Wilk :

- H_0 : la différence d'immunocompétence des individus suit une distribution Normale.
- H_1 : la différence d'immunocompétence des individus ne suit pas une distribution Normale.

```
Testo_large |>  
  pull(Difference) |>  
  shapiro.test()
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: pull(Testo_large, Difference)  
W = 0.97949, p-value = 0.977
```

Au seuil $\alpha = 0.05$, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de normalité pour la différence d'immunocompétence entre après et avant l'intervention chirurgicale (test de Shapiro-Wilk, $W = 0.98$, $p = 0.977$).

Les conditions d'application du test paramétrique sont donc réunies.

Attention !

Pour ce test, la Normalité doit bien être vérifiée sur la différence entre les 2 groupes de valeurs, et non sur chaque groupe de valeurs pris séparément. C'est une source d'erreur fréquente. Ici, les données de départ (DO avant et DO après) ne suivaient pas du tout une distribution Normale. Pourtant, la différence de DO suit bel et bien la distribution Normale, nous permettant de faire le test paramétrique.

2.6.3 Réalisation du test et interprétation

Le test de Student sur données appariées peut se faire de 2 façons distinctes. Les 2 méthodes fournissent exactement les mêmes résultats, seule la syntaxe utilisée change. Quelle que soit la méthode utilisée, les hypothèses nulles et alternatives sont toujours les mêmes :

- H_0 : le changement moyen de production d'anticorps après la pose chirurgicale de l'implant de testostérone est nul ($\mu_{Diff} = 0$). La procédure chirurgicale n'a pas d'effet sur l'immunocompétence. Les variations observées ne sont que le fruit du hasard de l'échantillonnage.
- H_1 : le changement moyen de production d'anticorps après la pose chirurgicale de l'implant de testostérone n'est pas nul ($\mu_{Diff} \neq 0$). La procédure chirurgicale a un effet significatif sur l'immunocompétence. Les variations observées ne sont pas uniquement dues à la fluctuation d'échantillonnage.

2.6.3.1 Première syntaxe

```
# Méthode n°2 : avec les 2 séries de données et le tableau au format large  
t.test(Testo_large$Before, Testo_large$After, paired = TRUE)
```

Paired t-test

```
data: Testo_large$Before and Testo_large$After  
t = -1.2714, df = 12, p-value = 0.2277  
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0  
95 percent confidence interval:  
 -0.15238464  0.04007695  
sample estimates:  
mean difference  
 -0.05615385
```

Avec cette première syntaxe, on indique le nom des 2 colonnes du tableau `Testo_large` qui contiennent les 2 séries de données. Il nous faut taper spécifiquement “`Testo_large$Before`” et “`Testo_large$After`”, et non

pas simplement “Before” et “After” car la fonction `t.test` n’a aucun moyen de savoir que “Before” et “After” sont des colonnes du tableau `Testo_large`. Nous devons donc être explicites. Il est en outre indispensable d’indiquer “`paired = TRUE`” pour faire un test de Student sur données appariées. Omettre cet argument reviendrait à faire un test de Student sur données indépendantes, qui est moins puissant que le test sur données appariées. Ça n’est donc pas souhaitable avec les données dont nous disposons et ça pourrait même conduire à des conclusions fausses.

Ici, voilà la conclusion de ce test :

Le test de Student sur données appariées ne permet pas de montrer de changement d’immunocompétence suite à l’intégration de l’implant chirurgical de testostérone. On ne peut pas rejeter l’hypothèse nulle au seuil $\alpha = 0.05$ ($t = -1.27$, $ddl = 12$, $p = 0.223$). La moyenne des différences de densités optiques observées entre avant et après l’intervention chirurgicale vaut -0.056 (intervalle de confiance à 95% de cette différence : $[-0.152 ; 0.040]$)

Donc visiblement, une forte production de testostérone n’est pas significativement associée à une baisse de l’immunocompétence.

Notez bien que les résultats et leurs interprétations dépendent de l’ordre dans lequel les 2 séries de données sont indiquées dans la fonction `t.test()`. Pour vous en convaincre, regardez ce que donne cette commande :

```
t.test(Testo_large$After, Testo_large$Before, paired = TRUE)
```

Qu’est-ce qui change ? Et qu’est-ce qui reste inchangé ?

2.6.3.2 Deuxième syntaxe

```
# Méthode n°3 : avec la variable Diff, mu = 0, et le tableau au format large  
t.test(Testo_large$Difference, mu = 0)
```

One Sample t-test

```
data: Testo_large$Difference
t = 1.2714, df = 12, p-value = 0.2277
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.04007695  0.15238464
sample estimates:
mean of x
0.05615385
```

Comme expliqué plus haut, le test de Student sur données appariées est strictement équivalent à un test de Student à un échantillon pour lequel on compare la moyenne des différences individuelles à 0. Là encore, les résultats produits et leur interprétation sont identiques aux deux tests précédents. La seule différence concerne les signes puisque le premier test regardait la différence “Before - After” alors que ce test regarde la différence “After - Before” (que nous avons calculée manuellement).

À vous donc de choisir la syntaxe qui vous paraît la plus parlante ou celle que vous avez le plus de facilité à retenir et à interpréter.

2.7 L’alternative non paramétrique

Comme pour le test de Student à un échantillon, lorsque les conditions d’application du test de Student sur données appariées ne sont pas vérifiées (c’est-à-dire lorsque la différence entre les données appariées des deux séries ne suit pas une loi Normale), il faut utiliser un test non paramétrique équivalent.

Il s’agit là encore du **test de Wilcoxon des rangs signés** qui s’intéresse aux médianes. Les hypothèses nulles et alternatives sont les suivantes :

- H_0 : le changement **médian** de production d’anticorps après la pose chirurgicale de l’implant de testostérone est nul ($med_{Diff} = 0$).

- H_1 : le changement **médian** de production d'anticorps après la pose chirurgicale de l'implant de testostérone n'est pas nul ($med_{Diff} \neq 0$).

Comme pour le test de Student, 2 syntaxes sont possibles et strictement équivalentes. Il est important de ne pas oublier l'argument `paired = TRUE` afin de s'assurer que l'on réalise bien un test sur données appariées. Enfin, l'argument `conf.int = TRUE` doit être ajouté afin que la (pseudo-) médiane et son intervalle de confiance à 95% soient calculés et affichés.

```
wilcox.test(Testo_large$Before, Testo_large$After, paired = TRUE,
            conf.int = TRUE)
```

Wilcoxon signed rank exact test

```
data: Testo_large$Before and Testo_large$After
V = 30, p-value = 0.3054
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
95.2 percent confidence interval:
 -0.145  0.040
sample estimates:
(pseudo)median
 -0.055
```

```
wilcox.test(Testo_large$Difference, mu = 0, conf.int = TRUE)
```

Wilcoxon signed rank exact test

```
data: Testo_large$Difference
V = 61, p-value = 0.3054
alternative hypothesis: true location is not equal to 0
95.2 percent confidence interval:
 -0.040  0.145
sample estimates:
(pseudo)median
  0.055
```

Ici, la conclusion de ce test est :

Le test de Wilcoxon des rangs signés n'a pas permis de montrer de changement d'immunocompétence suite à l'intégration de l'implant chirurgical de testostérone. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle au seuil $\alpha = 0.05$ ($V = 61$, $p = 0.305$). La médiane des différences de densités optiques observées entre après et avant l'intervention chirurgicale vaut 0.055 (intervalle de confiance à 95% de cette différence : $[-0.040 ; 0.145]$).

2.8 Exercice d'application

Les autruches vivent dans des environnements chauds et elles sont donc fréquemment exposées au soleil durant de longues périodes. Dans des environnements similaires, les mammifères ont des mécanismes physiologiques leur permettant de réduire la température de leur cerveau par rapport à celle de leur corps. Une équipe de chercheurs (Fuller et al. 2003) a testé si les autruches pouvaient faire de même. La température du corps et du cerveau de 37 autruches a été enregistrée par une journée chaude typique. Les résultats, exprimés en degrés Celsius, figurent dans [le fichier Autruches.csv](#).

Importez ces données et faites-en l'analyse pour savoir s'il existe une différence de température moyenne entre le corps et le cerveau des autruches. Vos observations chez les autruches sont-elles conformes à ce qui est observé chez les mammifères dans un environnement similaire ? Comme toujours, vous commencerez par faire une analyse descriptive des données, sous forme numérique et graphique, avant de vous lancer dans les tests d'hypothèses.

3 Comparaison de moyennes : deux échantillons indépendants

3.1 Pré-requis

Comme pour chaque nouveau chapitre, je vous conseille de travailler dans un nouveau script que vous placerez dans votre répertoire de travail, et dans une nouvelle session de travail (Menu **Session** > **Restart R**). Inutile en revanche de créer un nouveau **Rproject** : vous pouvez tout à fait avoir plusieurs scripts dans le même répertoire de travail et pour un même **Rproject**. Comme toujours, consultez [le livre en ligne du semestre 3](#) si vous ne savez plus comment faire.

Si vous êtes dans une nouvelle session de travail (ou que vous avez quitté puis relancé **RStudio**), vous devrez penser à recharger en mémoire les packages utiles. Dans ce chapitre, vous aurez besoin d'utiliser :

- le **tidyverse** (Wickham 2023), qui comprend notamment le package **readr** (Wickham, Hester, et Bryan 2026), pour importer facilement des fichiers **.csv** au format **tibble**, le package **dplyr** (Wickham, François, et al. 2026), pour manipuler des tableaux, et le package **ggplot2** (Wickham, Chang, et al. 2026) pour les représentations graphiques.
- **readxl** (Wickham et Bryan 2025), pour importer facilement des fichiers Excel au format **tibble**.
- **skimr** (Waring et al. 2026), qui permet de calculer des résumés de données très informatifs.
- **car** (Fox, Weisberg, et Price 2026), qui permet d'effectuer le test de comparaison des variances de Levene.

- le package `palmerpenguins` (Horst, Hill, et Gorman 2022) pour accéder au jeu de données `penguins` que nous utiliserons pour les exercices d'application.

```
library(tidyverse)
library(readxl)
library(skimr)
library(car)
library(palmerpenguins)
```

Vous aurez également besoin des jeux de données suivants que vous pouvez dès maintenant télécharger dans votre répertoire de travail :

- [HommesFemmes.xls](#)
- [HornedLizards.csv](#)

Enfin, je spécifie ici une fois pour toutes le thème que j'utiliserai pour tous les graphiques de ce chapitre. Libre à vous de choisir un thème différent ou de vous contenter du thème proposé par défaut :

```
theme_set(theme_bw())
```

3.2 Contexte

On s'intéresse maintenant aux méthodes permettant de comparer la moyenne de deux groupes ou de deux traitements dans le cas d'échantillons indépendants. Au contraire de la situation décrite dans le Chapitre 2, dans ce type de design expérimental, les deux traitements sont appliqués à des échantillons indépendants issus de 2 groupes ou populations distincts. Chaque individu collecté, ou chaque unité expérimentale observée, ne fournit qu'une seule valeur, indépendante de toutes les autres.

Cette situation est extrêmement classique dans le domaine de l'écologie au sens large. Ainsi, par exemple, lorsque l'on souhaite comparer 2 sites, on réalise des prélèvements dans chacun des 2 sites. Chaque prélèvement ne fournit qu'une valeur pour l'un des 2 sites.

Ici, nous allons examiner une espèce intéressante, le **lézard cornu** *Phrynosoma mcallii*, qui possède une frange de piquants autour de la tête. Une équipe d'herpétologues (Young, Brodie, et Brodie 2004) a étudié la question suivante : des piquants plus longs autour de la tête protègent-ils le lézard cornu de son prédateur naturel, la **pie-grièche migratrice** *Lanius ludovicianus* ? Ce prédateur a en effet une particularité : il accroche ses proies mortes à des barbelés ou des branches pour les consommer plus tard. Les chercheurs ont donc mesuré la longueur des cornes de 30 lézards retrouvés morts et accrochés dans des arbres par la pie-grièche migratrice. Et en parallèle, ils ont mesuré les cornes de 154 individus vivants et en bonne santé choisis au hasard dans la population.




Figure 3.1: Le lézard cornu et son prédateur

Nous disposons donc de 2 groupes indépendants : chaque lézard n'a fourni qu'une valeur de longueur de cornes, et chaque lézard n'appartient qu'à un groupe, vivant ou mort. Nous sommes donc dans la situation typique de la comparaison de moyennes de 2 populations avec des données indépendantes. Avant de procéder aux tests, et comme toujours, nous allons commencer par importer et mettre en forme les données (si besoin), puis nous devrons explorer les données, à l'aide d'une part d'indices statistiques de position, de dispersion et d'incertitude et d'autre part de représentations graphiques pertinentes. Enfin, nous vérifierons les conditions d'application du test paramétrique de Student avant de réaliser ce test si les conditions d'application sont remplies, ou son équivalent non paramétrique si elles ne le sont pas.

3.3 Importation et mise en forme des données

Les données de cette étude sont stockées dans [le fichier HornedLizards.csv](#). Importez ces données dans un objet nommé `Lizard_raw` et examinez le tableau obtenu.

```
Lizard_raw

# A tibble: 185 x 2
  squamosalHornLength Survival
      <dbl> <chr>
1      25.2 living
2      26.9 living
3      26.6 living
4      25.6 living
5      25.7 living
6      25.9 living
7      27.3 living
8      25.1 living
9      30.3 living
10     25.6 living
# i 175 more rows
```

```
View(Lizard_raw)
```

On constate ici 3 choses :

1. la variable `Survival` devrait être un facteur.
2. le nom de la première colonne (`squamosalHornLength`), qui contient les mesures des longueurs de cornes, est bien trop long.
3. pour l'un des lézards vivants, la mesure de longueur des cornes est manquante. Nous allons donc retirer cet individu pour éviter les messages d'erreurs par la suite.

Nous pouvons facilement réaliser les 3 modifications d'un coup, et stocker le résultat dans un nouveau tableau `Lizard` :

```
Lizard <- Lizard_raw |>
  mutate(Survival = factor(Survival)) |>
```

```
rename(Horn_len = squamosalHornLength) |>
filter(!is.na(Horn_len))
```

Lizard

```
# A tibble: 184 x 2
  Horn_len Survival
  <dbl> <fct>
1    25.2 living
2    26.9 living
3    26.6 living
4    25.6 living
5    25.7 living
6    25.9 living
7    27.3 living
8    25.1 living
9    30.3 living
10   25.6 living
# i 174 more rows
```

Ce tableau est bien un tableau rangé, au format long : chaque colonne contient une unique variable (**Horn_len** : longueur des cornes, **Survival** : groupe de l'individu mesuré, vivant ou mort), et chaque ligne contient les informations d'un unique individu.

Ici, il ne serait pas correct de présenter les données au format large. Il nous faudrait en effet une colonne pour chaque groupe, lézard vivant et lézard mort, mais puisque les données de ces 2 groupes sont indépendantes, nous aurions 2 problèmes :

1. si le nombre d'individus n'est pas le même dans les 2 groupes, les deux colonnes n'auraient pas la même longueur. C'est impossible dans **RStudio**, et le logiciel remplirait donc la colonne la plus courte de NAs pour y remédier.
2. les lignes de cet hypothétique tableau large ne correspondraient plus à des observations uniques. Chaque ligne renseignerait en effet sur les mesures de 2 individus distincts, un vivant et un mort.

Lorsque vous disposez de données appartenant à des groupes indépendants, il faut donc toujours travailler avec un tableau rangé, nécessairement au format long.

3.4 Exploration statistique des données

Comme dans le Chapitre 2 sur les données appariées, les statistiques descriptives doivent ici être réalisées pour chaque groupe d'individus, et non tous groupes confondus. Ici, le plus simple est d'utiliser la fonction `skim()` sur les données groupées par niveau du facteur `Survival` (avec la fonction `group_by()`) :

```
Lizard |>
  group_by(Survival) |>
  skim()
```

```
-- Data Summary -----
                                Values
Name                           group_by(Lizard, Survival...)
Number of rows                  184
Number of columns                2

-----
Column type frequency:
  numeric                        1

-----
Group variables                Survival

-- Variable type: numeric -----
  skim_variable Survival n_missing complete_rate mean   sd   p0  p25  p50  p75
1 Horn_len      killed         0             1 22.0 2.71 15.2 21.1 22.2 23.8
2 Horn_len      living         0             1 24.3 2.63 13.1 23   24.6 26
  p100 hist
1 26.7
2 30.3
```

On constate ici qu'il n'y a pas de données manquantes (`n_missing` = 0 dans les deux groupes). La moyenne des longueurs de cornes est plus grande chez les lézards vivants ($\bar{x}_{living} = 24.3$ mm) que chez les lézards retrouvés morts ($\bar{x}_{killed} = 22.0$), de plus de 2 millimètres. On retrouve cette

tendance pour les médianes, ainsi que pour les premiers et troisièmes quartiles. En revanche, les écarts-types des 2 groupes sont proches, et celui du groupe `living` est très légèrement plus faible (0.08 mm) que celui du groupe `killed`.

Enfin, les histogrammes très simplifiés fournis laissent penser que les données de chaque groupe ne s'écartent pas trop fortement d'une courbe en cloche.

Outre ces informations sur les ordres de grandeurs observés dans chaque groupe de lézards pour les indices de **position** (moyennes, médianes et quartiles), et de **dispersion** (écarts-types et histogrammes), la fonction `skim()` ne fournit pas les effectifs observés dans chaque groupe. On sait qu'il y a en tout 184 individus, mais on ne sait pas comment ils se répartissent dans les 2 groupes de lézards. Pour le déterminer, on peut utiliser une fonction décrite plus tôt, la fonction `count()` :

```
Lizard |>
  count(Survival)
```

```
# A tibble: 2 x 2
  Survival      n
  <fct>    <int>
1 killed      30
2 living     154
```

On peut obtenir la même information avec la fonction `summarise()` et son argument `.by`, et la fonction `n()` :

```
Lizard |>
  summarize(Effectif = n(), .by = Survival)
```

```
# A tibble: 2 x 2
  Survival Effectif
  <fct>         <int>
1 living       154
2 killed        30
```

On constate ici que les tailles d'échantillons sont très différentes. C'est normal compte tenu de la difficulté de repérer

des individus morts dans la nature, et ce n'est pas gênant pour nos analyses puisque la taille des deux échantillons reste élevée.

Enfin, on peut calculer des indices d'incertitude. C'est d'autant plus important qu'il est difficile de se faire une idée de la signification d'une différence moyenne de longueur de cornes de 2 millimètres. Est-ce important ou négligeable ? Est-ce que ces estimations sont précises ou non ? Comme dans les chapitres précédents, nous allons calculer les intervalles de confiance à 95% de la moyenne de chaque groupe :

```
Lizard |>
  reframe(mean_cl_normal(Horn_len), .by = Survival)
```



```
# A tibble: 2 x 4
  Survival      y ymin ymax
  <fct>      <dbl> <dbl> <dbl>
1 living    24.3  23.9  24.7
2 killed    22.0  21.0  23.0
```


La colonne `y` nous présente à nouveau la moyenne de chaque groupe, la colonne `ymin` contient les bornes inférieures des intervalles de confiance à 95%, et la colonne `ymax` les bornes supérieures. On constate ici que les intervalles de confiance à 95% des longueurs de cornes des 2 groupes ne se chevauchent pas du tout : la borne inférieure du groupe `living` est au-dessus de la borne supérieure du groupe `killed`. Autrement dit, dans la population générale, la longueur moyenne des cornes chez les lézards vivants a de bonnes chances de se trouver dans l'intervalle [23.9 ; 24.7] millimètres, alors qu'elle a de bonnes chances de se trouver dans l'intervalle [21 ; 23] millimètres chez les lézards morts. La différence de moyennes entre ces 2 groupes vaut donc probablement entre 0.9 millimètres au moins, et 3.7 millimètres au plus. Le test statistique que nous ferons ensuite devrait donc confirmer que ces différences sont significatives, autrement dit, qu'elles ne sont pas liées au simple hasard de l'échantillonnage.

3.5 Exploration graphique des données

Comme toujours, nous pouvons réaliser plusieurs types de graphiques pour en apprendre plus sur **la distribution des données** dans les deux groupes. Si nous faisons un nuage de points, il est évidemment impossible ici de relier les points deux à deux. Non seulement cela n'aurait aucun sens puisque les échantillons sont indépendants, mais en outre, nous ne disposons pas du même nombre d'individus dans les 2 échantillons. Nous nous contenterons donc de faire un stripchart.

3.5.1 Avec un stripchart

```
Lizard |>
  ggplot(aes(x = Survival, y = Horn_len)) +
  geom_jitter(height = 0, width = 0.2, alpha = 0.5) +
  labs(x = "Groupe de lézards",
       y = "Longueur des cornes (mm)",
       title = "Visualisation des longueurs\nde cornes du lézard cornu")
```




Ce premier graphique permet de visualiser très clairement les différences de tailles d'échantillons entre les deux groupes. Il permet également de voir que l'étendue des longueurs de

cornes est plus importante dans le groupe des individus vivants que dans celui des individus morts. En outre, le nuage de points des vivants semble être plus haut sur l'axe des y que celui des morts, confirmant les statistiques descriptives qui montraient des tailles de cornes en moyenne plus importantes dans le groupe des vivants.

3.5.2 Avec des histogrammes facettés

```
Lizard |>
  ggplot(aes(x = Horn_len)) +
  geom_histogram(bins = 15, fill = "firebrick2", color = "grey20", alpha = 0.5)+
  geom_rug() +
  facet_wrap(~Survival, ncol = 1, scales = "free_y") +
  labs(x = "Longueur des cornes (mm)",
       y = "Fréquence",
       title = "Distribution de la longueur des cornes dans 2 groupes de lézards cornus",
       subtitle = "nb morts : 30, nb vivants : 154")
```




Notez ici l'utilisation de l'argument `scales = "free_y"` dans la fonction `facet_wrap()`. Cet argument permet de ne pas imposer la même échelle pour l'axe des ordonnées des 2 graphiques. Ce choix est ici pertinent puisque les effectifs des 2 groupes sont très différents. Faites un essai sans cet argument pour voir la différence. Il est en revanche important de conserver le même axe des x afin de faciliter la comparaison des 2 groupes.

Cette visualisation nous montre que les données doivent suivre à peu près une distribution Normale dans les 2 groupes, et que globalement la longueur des cornes semble légèrement plus élevée dans le groupe des vivants (avec un mode autour de 25-26 mm) que dans le groupe des morts (avec un mode autour de 23-24 mm). L'étendue des données semble légèrement plus grande dans le groupe des vivants, mais cela n'est peut-être dû qu'à la différence marquée des tailles d'échantillons.

3.5.3 Avec des diagrammes de densité facettés

```
Lizard |>
  ggplot(aes(x = Horn_len)) +
  geom_density(fill = "firebrick2", alpha = 0.5) +
  geom_rug() +
  facet_wrap(~Survival, ncol = 1, scales = "free_y") +
  labs(x = "Longueur des cornes (mm)",
       y = "Densité",
       title = "Distribution de la longueur des cornes dans 2 groupes de lézards cornus",
       subtitle = "nb morts : 30, nb vivants : 154")
```




Les diagrammes de densité ressemblent ici beaucoup aux histogrammes. C'est normal car la taille des échantillons est importante (30 et 154 pour les groupes `killed` et `living` respectivement). C'était moins vrai dans les chapitres précédents car les tailles d'échantillons étaient plus faibles, et la forme des histogrammes dépendait alors beaucoup du nombre

de classes que l'on choisissait de représenter. Avec des échantillons de grande taille ($n \geq 30$), c'est moins problématique.

En général, il est donc inutile de faire à la fois les histogrammes et les diagrammes de densité. Choisissez l'un ou l'autre selon vos préférences et la situation.

3.5.4 Avec des boîtes à moustaches

```
Lizard |>
  ggplot(aes(x = Survival, y = Horn_len)) +
  geom_boxplot(notch = TRUE) +
  labs(x = "Groupe de lézards",
       y = "Longueur des cornes (mm)",
       title = "Comparaison de 2 groupes\nde lézards cornus",
       subtitle = "nb morts : 30, nb vivants : 154")
```




Nous visualisons ici encore plus clairement que sur les histogrammes le fait que les longueurs de cornes des individus vivants sont légèrement plus longues que celles des individus morts. D'ailleurs, puisque les intervalles de confiance à 95% des médianes des 2 groupes (les encoches) ne se chevauchent pas, un test de comparaison des moyennes devrait logiquement conclure à une différence significative en faveur des individus vivants. On peut également noter que la largeur de

l'encoche pour les individus morts est plus importante que celle des vivants. Cela traduit une incertitude plus grande autour de la médiane estimée dans le groupe des individus morts. C'est tout à fait logique compte tenu des effectifs plus faibles dans ce groupe.

Enfin, il est tout à fait possible de représenter sur le même graphique les boîtes à moustaches et les données brutes sous forme de stripchart. On a ainsi à la fois (i) une visualisation simplifiée de la position et de la dispersion des données avec les boîtes à moustaches, et (ii) accès à l'ensemble des données brutes, ce qui permet parfois de voir des structures invisibles sur les boîtes à moustaches (regroupement de points par exemple). Afin de ne pas dupliquer les valeurs les plus extrêmes du jeu de données, nous indiquerons à `geom_boxplot()` de ne pas afficher les outliers sur le graphique : tous les points seront en effet déjà affichés par `geom_jitter()` :

```
Lizard |>
  ggplot(aes(x = Survival, y = Horn_len, fill = Survival)) +
  geom_boxplot(notch = TRUE, color = "grey20", alpha = 0.2,
               outlier.color = NA, show.legend = FALSE) +
  geom_jitter(height = 0, width = 0.2, alpha = 0.4, shape = 21,
              show.legend = FALSE, size = 0.8) +
  labs(x = "Groupe de lézards",
       y = "Longueur des cornes (mm)",
       title = "Comparaison de 2 groupes\nde lézards cornus",
       subtitle = "nb morts : 30, nb vivants : 154") +
  scale_fill_manual(values = c("purple3", "royalblue2"))
```



3.6 Le test paramétrique

Le test paramétrique le plus puissant que nous puissions faire pour comparer la moyenne de 2 populations est le test de Student. Ce test étant paramétrique, nous devons nous assurer que ses conditions d'application sont vérifiées avant de pouvoir le réaliser.

3.6.1 Conditions d'application

Les conditions d'application de ce test sont au nombre de 3 :

1. Chacun des deux échantillons est issu d'un échantillonnage aléatoire de la population générale. Comme toujours, en l'absence d'indication contraire, on considère que cette condition est toujours vérifiée.
2. La variable numérique étudiée est distribuée normalement dans les deux populations. Il nous faudra donc faire deux tests de Shapiro-Wilk, un pour chaque échantillon.
3. La variance de la variable numérique étudiée est la même dans les deux populations. C'est ce que l'on appelle l'homoscédasticité.

En réalité, le test du t de Student sur deux échantillons indépendants est assez robuste face au non respect de cette troisième condition d'application. Cela signifie que si cette troisième condition d'application n'est pas strictement vérifiée, les résultats du test peuvent malgré tout rester valides. Lorsque les 2 échantillons comparés ont des tailles supérieures ou égales à 30, ce test fonctionne bien même si l'écart-type d'un groupe est jusqu'à 3 fois supérieur ou inférieur à l'écart-type du second groupe, à condition que la taille des 2 échantillons soit proche (ce qui n'est pas le cas ici !). En revanche, si les écarts-types diffèrent de plus d'un facteur 3, ou si les tailles d'échantillons sont très différentes, le test du t de Student ne devrait pas être utilisé. De même, si la taille des échantillons est inférieure à 30 et que les variances ne sont pas homogènes, ce test ne devrait pas être réalisé. En conclusion, les résultats du test du t de Student à deux échantillons indépendants peuvent rester valides si la troisième condition d'homoscédasticité n'est pas respectée, mais dans certains cas seulement.

Le test du t de Student sur deux échantillons indépendants est également assez robuste face à des écarts mineurs à la distribution Normale, tant que la forme des deux distributions comparées reste similaire et unimodale. En outre, la robustesse de ce test augmente avec la taille des échantillons.

Robustesse

La robustesse d'un test statistique est sa capacité à rester valide même lorsque certaines de ses conditions d'application ne sont pas parfaitement respectées. Plus un test est robuste, plus il est capable de supporter des "entorses" importantes à ses conditions d'application.

Au final, avec un peu d'habitude, même lorsque les conditions d'application ne sont pas toutes vérifiées, on peut parfois passer outre. Mais à ce stade, on préfère s'en tenir à des choses plus simples et claires.

La procédure à suivre

1. Faites un test de Normalité pour chacune des deux séries de données. Si elles suivent la loi Normale

- toutes les deux, passez au point 2. Sinon, rendez-vous au point 4.
2. Faites un test d'homoscédasticité (homogénéité des variances). Si les variances sont homogènes, passez au point 3. Sinon, rendez-vous au point 5.
 3. Faites un test de comparaison des moyennes paramétrique : le test de Student. Examinez la p -value pour conclure, et rendez-vous au point 6.
 4. Faites un test de comparaison des moyennes non paramétrique : le test de Wilcoxon de la somme des rangs. Examinez la p -value pour conclure, et rendez-vous au point 6.
 5. Faites un test de comparaison des moyennes non paramétrique : le test t de Welch. Examinez la p -value pour conclure, et rendez-vous au point 6.
 6. Si la p -value est supérieure à α , on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle et on conclut alors à une absence de différence significative entre les 2 populations. À l'inverse, si la p -value est inférieure ou égale à α , on rejette l'hypothèse nulle et on valide l'hypothèse alternative. Les deux populations ont des moyennes significativement différentes, et pour savoir laquelle est supérieure ou inférieure à l'autre, on revient aux estimations des moyennes et des intervalles de confiance à 95%, calculés dans la partie consacrée aux statistiques descriptives.

3.6.1.1 Normalité des données

Nous commençons donc par tester la Normalité des 2 populations dont sont issus les échantillons, c'est le point 1 de la procédure détaillée ci-dessus. Pour les individus morts, les hypothèses sont les suivantes :

- H_0 : la taille des cornes suit une distribution Normale dans la population des lézards cornus morts.
- H_1 : la taille des cornes ne suit pas une distribution Normale dans la population des lézards cornus morts.

```
Lizard |>  
  filter(Survival == "killed") |>
```

```
pull(Horn_len) |>
shapiro.test()
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: pull(filter(Lizard, Survival == "killed"), Horn_len)
W = 0.93452, p-value = 0.06482
```

La p -value est supérieure à $\alpha = 0.05$, donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de normalité pour la taille des cornes de la population des lézards cornus morts (test de Shapiro-Wilk, $W = 0.93$, $p = 0.065$).

Pour les individus vivants :

- H_0 : la taille des cornes suit une distribution Normale dans la population des lézards cornus vivants.
- H_1 : la taille des cornes ne suit pas une distribution Normale dans la population des lézards cornus vivants.

```
Lizard |>
  filter(Survival == "living") |>
  pull(Horn_len) |>
  shapiro.test()
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: pull(filter(Lizard, Survival == "living"), Horn_len)
W = 0.96055, p-value = 0.0002234
```

La p -value est inférieure à $\alpha = 0.05$, donc on rejette l'hypothèse nulle de normalité pour la taille des cornes de la population des lézards cornus vivants (test de Shapiro-Wilk, $W = 0.96$, $p < 0.001$).

L'une des 2 séries de données ne suit pas la loi Normale, nous sommes donc censés passer directement au point 4 de la procédure.

Toutefois, si l'on examine les histogrammes (Section 3.5.2) ou les diagrammes de densité (Section 3.5.3) des 2 échantillons, on constate que la forme des distributions des 2 séries de données est très proche. Pour les 2 échantillons, la distribution est en effet unimodale, avec une asymétrie gauche assez marquée (une longue queue de distribution du côté gauche). La forme des distributions étant similaire (on parle bien de la forme des histogrammes et non de la position du pic), et les histogrammes étant proches de la forme typique d'une courbe en cloche, le test de Student devrait rester valide car il est robuste dans cette situation. Ici, pour l'exemple, on va donc passer au point 2 de la procédure. Notez toutefois que passer directement au point 4 de la procédure serait tout à fait correct : on ne pourrait rien vous reprocher si vous passez directement au test non paramétrique de comparaison des moyennes lorsque vous constatez que l'une des 2 séries de données ne suit pas la distribution Normale.

3.6.1.2 Homogénéité des variances

Le test le plus simple pour comparer la variance de 2 populations est le test F :

- H_0 : la variance des 2 populations est égale, leur ratio vaut 1 $\left(\frac{\sigma_{killed}^2}{\sigma_{living}^2} = 1\right)$.
- H_1 : la variance des 2 populations est différente, leur ratio ne vaut pas 1 $\left(\frac{\sigma_{killed}^2}{\sigma_{living}^2} \neq 1\right)$.

```
var.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard)
```

F test to compare two variances

```
data: Horn_len by Survival
F = 1.0607, num df = 29, denom df = 153, p-value = 0.7859
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.6339331 1.9831398
sample estimates:
ratio of variances
 1.060711
```

Ici, le ratio des variances (la variance des individus morts divisée par la variance des individus vivants) est très proche de 1 ($F = 1.06$, IC 95% : $[0.63 ; 1.98]$). Le test F nous montre qu'il est impossible de rejeter H_0 : au seuil $\alpha = 0.05$, le ratio des variances n'est pas significativement différent de 1 (ddl = 29 et 153, $p = 0.79$), les variances sont homogènes.

Le test de Bartlett est un autre test qui permet de comparer la variance de plusieurs populations (2 ou plus). Lorsque le nombre de populations est égal à 2 (comme ici), ce test est absolument équivalent au test F ci-dessus.

- H_0 : toutes les populations ont même variance ($\sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma_C^2 = \dots = \sigma_N^2$).
- H_1 : au moins une population a une variance différente des autres.

```
bartlett.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard)
```

Bartlett test of homogeneity of variances

data: Horn_len by Survival

Bartlett's K-squared = 0.042411, df = 1, p-value = 0.8368

Enfin, le test de Levene (attention, le package `car` doit être chargé) devrait être préféré la plupart du temps. Comme le test de Bartlett, il permet de comparer la variance de plusieurs populations, mais il est plus robuste vis-à-vis de la non-normalité des données.

- H_0 : toutes les populations ont même variance ($\sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma_C^2 = \dots = \sigma_N^2$).
- H_1 : au moins une population a une variance différente des autres.

```
# Le test de Levene fait partie du package car. Il doit être chargé en mémoire
# library(car)
leveneTest(Horn_len ~ Survival, data = Lizard)
```

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
      Df F value Pr(>F)
group   1  0.0035  0.953
      182
```

Ici encore, les conclusions sont les mêmes :

Il est impossible de rejeter l'hypothèse nulle d'homogénéité des variances au seuil $\alpha = 0.05$ (test de Levene, $F = 0.004$, ddl = 1, $p = 0.953$).

À vous de choisir lequel de ces 3 tests vous souhaitez réaliser : il est évident qu'on ne fait jamais les 3 !

Ici, puisque l'homoscédasticité est vérifiée, on passe au point 3 de la procédure.

3.6.2 Réalisation du test et interprétation

Puisque la taille des cornes du lézard cornu suit approximativement la même distribution “presque Normale” dans les 2 populations (lézards morts et vivants) et que ces 2 populations ont des variances homogènes, on peut réaliser le test du t de Student sur deux échantillons indépendants.

- H_0 : la moyenne des 2 populations est égale, leur différence vaut 0 ($\mu_{killed} - \mu_{living} = 0$).
- H_1 : la moyenne des 2 populations est différente, leur différence ne vaut pas 0 ($\mu_{killed} - \mu_{living} \neq 0$).

```
t.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard, var.equal = TRUE)
```

Two Sample t-test

```
data: Horn_len by Survival
t = -4.3494, df = 182, p-value = 2.27e-05
alternative hypothesis: true difference in means between group killed and group living is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.335402 -1.253602
sample estimates:
mean in group killed mean in group living
      21.98667          24.28117
```

Notez bien la syntaxe :

- Nous utilisons ici la syntaxe du type “formule” faisant appel au symbole “~” (Longueur des cornes en fonction de la Survie) et à l’argument “data =”.
- L’argument “paired = TRUE” a disparu puisque nous avons ici deux échantillons indépendants
- L’argument “var.equal = TRUE” doit obligatoirement être spécifié : nous nous sommes assurés que l’homogénéité des variances était vérifiée. Il faut donc l’indiquer afin que le test de Student classique soit réalisé. Si on omet de le spécifier, c’est un autre test qui est réalisé (voir plus bas).

Au seuil α de 5%, on rejette l’hypothèse nulle d’égalité des moyennes de la longueur des cornes entre lézards vivants et morts (test t de Student sur deux échantillons indépendants, $t = -4.35$, ddl = 182, $p < 0.001$). Les lézards morts ont en moyenne des cornes plus courtes ($\hat{\mu}_{killed} = 21.99$ millimètres) que les lézards vivants ($\hat{\mu}_{living} = 24.28$ millimètres). La gamme des valeurs les plus probables pour la différence de moyenne entre les deux populations est fournie par l’intervalle de confiance à 95% de la différence de moyennes : [-3.34 ; -1.25].

Ce test confirme donc bien l’impression des chercheurs : les lézards principalement pris pour cibles par les pies-grièches migratrices ont des cornes en moyenne plus courtes (probablement entre 1.25 et 3.34 millimètres de moins) que les lézards de la population générale. Avoir des cornes plus longues semble donc protéger les lézards de la prédation, du moins dans une certaine mesure.

Notez bien que l’intervalle de confiance à 95% qui est fourni avec les résultats du test est l’intervalle de confiance à 95% de la différence de moyenne entre les 2 groupes. Cet intervalle nous donne donc une idée de la **magnitude de l’effet**, de son ampleur. En effet, dire que les lézards morts ont des cornes en moyenne plus courtes est intéressant, mais cela n’aura pas la même portée si leurs cornes sont plus courtes de 0.02 millimètres ou si elles sont plus courtes de 5 millimètres. Un test statistique permet de rejeter ou non une hypothèse nulle, mais c’est bien l’estimation (la moyenne de chaque groupe et

l'intervalle de confiance à 95% de la différence) qui nous dit ce qu'on doit penser des résultats, et de leur pertinence (écologique, biologique, physiologique, comportementale, etc.).

3.7 L'alternative non paramétrique

Si les conditions d'application du test de Student ne sont pas vérifiées (c'est bien le cas ici puisque la longueur des cornes ne suit pas une distribution Normale dans la population des lézards vivants), notre procédure nous conduit à l'étape 4 : nous devons utiliser un équivalent non paramétrique au test de Student. C'est le cas du **test de Wilcoxon sur la somme des rangs** (également appelé test de Mann-Whitney). Comme pour tous les tests de Wilcoxon, la comparaison porte alors non plus sur les moyennes mais sur les médianes.

- H_0 : la médiane des 2 populations est égale, leur différence vaut 0 ($med_{killed} - med_{living} = 0$).
- H_1 : la médiane des 2 populations est différente, leur différence ne vaut pas 0 ($med_{killed} - med_{living} \neq 0$).

```
wilcox.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard, conf.int = TRUE)
```

Wilcoxon rank sum test with continuity correction

```
data: Horn_len by Survival
W = 1181.5, p-value = 2.366e-05
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.200076 -1.300067
sample estimates:
difference in location
 -2.200031
```

L'argument `var.equal = TRUE` n'existe pas pour ce test, puisque c'est justement un test non paramétrique qui ne requiert pas l'homogénéité des variances. En revanche, comme pour tous les autres tests de Wilcoxon que nous avons réalisés jusqu'ici, l'argument `conf.int = TRUE` permet

d'afficher les estimateurs pertinents, ici, la différence de médiane entre les 2 populations et l'intervalle de confiance à 95% de cette différence de médiane.

La conclusion est ici la même que pour le test de Student : puisque la p -value est très inférieure à α , on rejette l'hypothèse nulle : les médianes sont bel et bien différentes.

3.8 L'autre alternative non paramétrique

Enfin, dans le cas où la variable étudiée suit la loi Normale dans les deux populations mais qu'elle n'a pas la même variance dans les deux populations (donc si vous arrivez au point 5 de la procédure décrite plus haut), il est toujours possible de réaliser un test de Wilcoxon, il est préférable de réaliser un test de Student modifié : le **test approché du t de Welch**. Ce test est moins puissant que le test de Student classique, mais il reste plus puissant que le test de Wilcoxon, et surtout, il permet de comparer les moyennes et non les médianes.

- H_0 : la moyenne des 2 populations est égale, leur différence vaut 0 ($\mu_{killed} - \mu_{living} = 0$).
- H_1 : la moyenne des 2 populations est différente, leur différence ne vaut pas 0 ($\mu_{killed} - \mu_{living} \neq 0$).

```
t.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard)
```

Welch Two Sample t-test

```
data: Horn_len by Survival
t = -4.2634, df = 40.372, p-value = 0.0001178
alternative hypothesis: true difference in means between group killed and group living is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-3.381912 -1.207092
sample estimates:
mean in group killed mean in group living
21.98667 24.28117
```

La seule différence par rapport à la syntaxe du test t de Student paramétrique est la suppression de l'argument `var.equal = TRUE`. Attention donc, à bien utiliser la syntaxe correcte. Le test du t de Welch ne devrait être réalisé que lorsque la Normalité est vérifiée pour les 2 populations, mais pas l'homoscédasticité. Par rapport au test de Student classique, on constate que le nombre de degrés de liberté est très différent, et donc la p -value également. Les bornes de l'intervalle de confiance à 95% de la différence de moyenne sont différentes également puisque leur calcul a été fait en supposant que les 2 populations n'avaient pas même variance.

3.9 Exercices d'application

3.9.1 La taille des hommes et des femmes

On s'intéresse à la différence de taille supposée entre hommes et femmes. Le fichier `HommesFemmes.xls` contient les tailles en centimètres de 38 hommes et 43 femmes choisis au hasard parmi les étudiants de première année à La Rochelle Université. Importez, mettez en forme et analysez ces données. Vous prendrez soin de retirer les éventuelles valeurs manquantes, vous prendrez le temps d'examiner les données à l'aide de statistiques descriptives et de représentations graphiques adaptées, puis vous tenterez de répondre à la question suivante : les hommes et les femmes inscrits en première année à La Rochelle Université ont-ils la même taille ? Si non, caractérisez cette différence de taille.

3.9.2 La longueur du bec des manchots Adélie

Dans le jeu de données `penguins` du package `palmerpenguins`, récupérez les lignes du tableau qui correspondent aux manchots Adélie, et comparez la longueur des becs entre mâles et femelles. Comme toujours, avant de vous lancer dans les tests, vous prendrez soin de retirer les éventuelles valeurs manquantes, et vous prendrez le temps d'examiner les données à l'aide de statistiques descriptives et de représentations graphiques adaptées. Faites l'effort d'expliquer votre démarche, de préciser les hypothèses nulles et alternatives

de chaque test, et de rédiger l'interprétation que vous faites de chaque résultat.

3.10 Tests bilatéraux et unilatéraux

3.10.1 Principe

Jusqu'à maintenant, tous les tests que nous avons réalisés sont des **tests bilatéraux**. Pour chaque test, l'hypothèse nulle est imposée. En revanche, pour certains tests, l'hypothèse alternative est à choisir (et à spécifier) par l'utilisateur parmi 3 possibilités :

- Une hypothèse bilatérale. C'est celle qui est utilisée par défaut si l'utilisateur ne précise rien.
- Deux hypothèses unilatérales possibles, qui doivent être spécifiées explicitement par l'utilisateur.

Les tests unilatéraux peuvent concerner tous les tests pour lesquels les hypothèses sont de la forme suivante :

- H_0 : la valeur d'un paramètre de la population est égale à k (k peut être une valeur fixe, arbitraire, choisie par l'utilisateur, ou la valeur d'un paramètre d'une autre population).
- H_1 : la valeur d'un paramètre de la population **n'est pas égale à k** .

En réalité, si nous remplaçons l'hypothèse H_1 par :

- H_1 : la valeur d'un paramètre de la population **est supérieure à k** .

ou par :

- H_1 : la valeur d'un paramètre de la population **est inférieure à k** .

nous réalisons un test unilatéral.

Dans **RStudio**, la syntaxe permettant de spécifier l'hypothèse alternative que nous souhaitons utiliser est toujours la même. Il faut préciser, au moment de faire le test l'argument suivant :

- `alternative = "two.sided"` : pour faire un test bilatéral. Si on ne le fait pas explicitement, c'est de toutes façons cette valeur qui est utilisée par défaut.
- `alternative = "greater"` : pour choisir l'hypothèse unilatérale " $>$ ".
- `alternative = "less"` : pour choisir l'hypothèse unilatérale " $<$ ".

Attention : le choix d'utiliser "greater" ou "less" dépend donc de l'ordre dans lequel les échantillons sont spécifiés. Cette syntaxe est valable pour tous les tests de Student vus jusqu'ici (un échantillon, deux échantillons appariés, deux échantillons indépendants) et pour leurs alternatives non paramétriques (test de Wilcoxon des rangs signés, test de Wilcoxon de la somme des rangs, test du t de Welch).

! Attention

L'utilisation de tests unilatéraux doit être réservée exclusivement aux situations pour lesquelles le choix de l'hypothèse unilatérale est possible à justifier par un mécanisme quelconque (biologique, physiologique, comportemental, écologique, génétique, évolutif, biochimique, etc.). Observer que l'un des échantillons a une moyenne plus grande ou plus faible qu'un autre lors de la phase des statistiques descriptives des données **n'est pas du tout une raison suffisante**. Il faut pouvoir justifier le choix de l'hypothèse alternative par une explication valable. D'ailleurs, si on veut être rigoureux, il faudrait toujours formuler les hypothèses que l'on souhaite tester **avant** de mettre en place le protocole expérimental et **avant** d'acquérir les données.

Pourquoi s'embêter avec les tests unilatéraux puisqu'il est si rare qu'on ait le droit de les faire ? Tout simplement parce que toutes choses étant égales par ailleurs, un test unilatéral est toujours plus puissant (parfois, beaucoup plus puissant) qu'un test bilatéral. Or, la puissance est quelque chose qu'on cherche à maximiser (voir sec-puiss). Lorsqu'il est pertinent de réaliser un test unilatéral, on doit donc toujours le faire.

Reprenons l'un des exemples examinés précédemment pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne.

3.10.2 Un exemple pas à pas

Reprenons l'exemple des lézards cornus. L'étude a été réalisée parce que les chercheurs supposaient que la longueur des cornes des lézards était susceptible de leur fournir une protection face à la prédation. Autrement dit, les chercheurs supposaient que des cornes *plus longues* devaient fournir une meilleure protection vis-à-vis de la prédation. Ainsi, les lézards morts devaient avoir des cornes moins longues en moyenne que les lézards vivants, simplement parce que porter des cornes courtes expose plus fortement les individus à la prédation. Nous avons donc une bonne raison “écologique/évolutive” de considérer un test unilatéral (la susceptibilité face à la prédation qui a entraîné une pression de sélection sur la longueur des cornes des lézards), avant même de collecter les données.

Lorsque nous avons examiné cette question, nous avons fait le test du t de Student sur échantillons indépendants de la façon suivante :

```
t.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard, var.equal = TRUE)
```

Two Sample t-test

```
data: Horn_len by Survival
t = -4.3494, df = 182, p-value = 2.27e-05
alternative hypothesis: true difference in means between group killed and group living is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.335402 -1.253602
sample estimates:
mean in group killed mean in group living
      21.98667         24.28117
```

Comme l'indiquent les résultats fournis, l'hypothèse alternative utilisée pour faire le test est : “La vraie différence de moyenne n'est pas égale à 0”. Autrement dit, nous avons fait un test bilatéral avec les hypothèses suivantes :

- H_0 : la moyenne des 2 populations est égale, leur différence vaut 0 ($\mu_{killed} - \mu_{living} = 0$).

- H_1 : la moyenne des 2 populations est différente, leur différence ne vaut pas 0 ($\mu_{killed} - \mu_{living} \neq 0$).

Ce test est donc rigoureusement équivalent à celui-ci :

```
t.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard, var.equal = TRUE,
       alternative = "two.sided")
```

Two Sample t-test

```
data: Horn_len by Survival
t = -4.3494, df = 182, p-value = 2.27e-05
alternative hypothesis: true difference in means between group killed and group living is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.335402 -1.253602
sample estimates:
mean in group killed mean in group living
      21.98667          24.28117
```

Ici, nous souhaitons en fait réaliser un **test unilatéral** avec les hypothèses suivantes :

- H_0 : la moyenne de longueur des cornes de la population des lézards morts est égale à celle des lézards vivants. Leur différence vaut 0 ($\mu_{killed} - \mu_{living} = 0$).
- H_1 : la moyenne de longueur des cornes de la population des lézards morts est **inférieure** à celle des lézards vivants. Leur différence est inférieure à 0 ($\mu_{killed} - \mu_{living} < 0$).

```
t.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard, var.equal = TRUE,
       alternative = "less")
```

Two Sample t-test

```
data: Horn_len by Survival
t = -4.3494, df = 182, p-value = 1.135e-05
alternative hypothesis: true difference in means between group killed and group living is less than 0
95 percent confidence interval:
      -Inf -1.422321
```

```
sample estimates:
mean in group killed mean in group living
      21.98667          24.28117
```

Puisque la p -value de ce test est inférieure à $\alpha = 0.05$, on rejette l'hypothèse nulle de l'égalité des moyennes. On valide donc l'hypothèse alternative : les lézards cornus morts ont en moyenne des cornes plus courtes que les lézards vivants. Cette différence de longueur de cornes est en faveur des lézards vivants et vaut très probablement au moins 1.4 millimètres (c'est l'intervalle de confiance à 95% de la différence de moyennes qui nous le dit).

Dernière chose importante : il ne faut pas se tromper dans le choix de l'hypothèse alternative. En effet, nous aurions pu tenter de tester exactement la même chose en formulant les hypothèses suivantes :

- H_0 : la moyenne de longueur des cornes de la population des lézards **vivants** est égale à celle des lézards **morts**. Leur différence vaut 0 ($\mu_{living} - \mu_{killed} = 0$).
- H_1 : la moyenne de longueur des cornes de la population des lézards **vivants** est **supérieure** à celle des lézards **morts**. Leur différence est **supérieure** à 0 ($\mu_{living} - \mu_{killed} > 0$).

Ce test est normalement exactement le même que précédemment. Toutefois, si on essaie de le réaliser, on rencontre un problème :

```
t.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard, var.equal = TRUE,
       alternative = "greater")
```

Two Sample t-test

```
data: Horn_len by Survival
t = -4.3494, df = 182, p-value = 1
alternative hypothesis: true difference in means between group killed and group living is greater
95 percent confidence interval:
 -3.166684      Inf
sample estimates:
mean in group killed mean in group living
      21.98667          24.28117
```

Ici, la p -value est très supérieure à α puisqu'elle vaut 1. Une p -value de 1 devrait toujours attirer votre attention. La conclusion devrait donc être que l'on ne peut pas rejeter H_0 : les lézards morts et vivants ont en moyenne des cornes de même longueur. Nous savons pourtant que c'est faux.

Le problème est ici lié à l'ordre des catégories "vivant" ou "mort" dans le facteur **Survival** du tableau **Lizard**. Les dernières lignes des tests que nous venons de faire indiquent la moyenne de chaque groupe, mais le groupe "killed" apparaît toujours avant le groupe "living". C'est l'ordre des niveaux dans le facteur **Survival** qui doit dicter la syntaxe appropriée :

```
Lizard$Survival
```

```
[1] living living living living living living living living living living
[11] living living living living living living living living living living
[21] living living living living living living living living living living
[31] living living living living living living living living living living
[41] living living living living living living living living living living
[51] living living living living living living living living living living
[61] living living living living living living living living living living
[71] living living living living living living living living living living
[81] living living living living living living living living living living
[91] living living living living living living living living living living
[101] living living living living living living living living living living
[111] living living living living living living living living living living
[121] living living living living living living living living living living
[131] living living living living living living living living living living
[141] living living living living living living living living living living
[151] living living living living killed killed killed killed killed killed
[161] killed killed killed killed killed killed killed killed killed killed
[171] killed killed killed killed killed killed killed killed killed killed
[181] killed killed killed killed
Levels: killed living
```

Par défaut, dans **RStudio**, les niveaux d'un facteur sont classés par ordre alphabétique sauf si on spécifie manuellement un ordre différent. Ici, le niveau "killed" est donc le premier niveau du facteur, et "living" le second. Attention, on parle bien ici des niveaux, ou modalités, et non des données elles-mêmes. Ici, le premier lézard mesuré appartient à la catégorie

`living`. Ça n'est pas ça qui est important : c'est bien l'ordre des niveaux qui compte, et on peut le voir tout en bas, après `Levels:` Lorsque l'on réalise un test de Student avec ces données (ou un test de Wilcoxon d'ailleurs), la différence de moyenne qui est examinée par le test est donc "moyenne des `killed` - moyenne des `living`". Lorsque nous avons tapé ceci :

```
t.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard, var.equal = TRUE,
       alternative = "greater")
```

nous avons donc en réalité posé les hypothèses suivantes :


- H_0 : la moyenne de longueur des cornes de la population des lézards **morts** est égale à celle des lézards **vivants**. Leur différence vaut 0 ($\mu_{killed} - \mu_{living} = 0$).
- H_1 : la moyenne de longueur des cornes de la population des lézards **morts** est **supérieure** à celle des lézards **vivants**. Leur différence est **supérieure** à 0 ($\mu_{killed} - \mu_{living} > 0$).

Ce test est donc erroné, ce qui explique qu'il nous renvoie un résultat faux et une p -value de 1. Ici, puisque l'ordre des catégories est "killed" d'abord et "living" ensuite, la seule façon correcte de faire un test unilatéral qui a du sens est donc celle que nous avons réalisée en premier :

```
t.test(Horn_len ~ Survival, data = Lizard, var.equal = TRUE,
       alternative = "less")
```

Faites donc toujours attention à l'ordre des catégories de vos facteurs pour ne pas vous tromper. Une façon simple de vérifier cet ordre est d'observer vos graphiques (par exemple, les boîtes à moustaches). L'ordre dans lequel les catégories apparaissent sur l'axe des `x` reflète l'ordre des catégories du facteur porté par cet axe :

```
Lizard |>
  ggplot(aes(x = Survival, y = Horn_len)) +
  geom_boxplot()
```



3.10.3 Exercice d'application

Reprenez chaque exemple et exercice traité depuis le premier chapitre et identifiez les situations où un test unilatéral aurait du sens. Si vous en trouvez, faites ce test et assurez-vous que les hypothèses choisies sont bien celles qui sont utilisées lors du test.

Références

- Fox, John, Sanford Weisberg, et Brad Price. 2026. *car: Companion to Applied Regression*. https://github.com/bprice2652/car_repo.
- Fuller, Andrea, Peter R. Kamerman, Shane K. Maloney, Graham Mitchell, et Duncan Mitchell. 2003. « Variability in brain and arterial blood temperatures in free-ranging ostriches in their natural habitat ». *Journal of Experimental Biology* 206 (7): 1171-81. <https://doi.org/10.1242/jeb.00230>.
- Hasselquist, Dennis, James A. Marsh, Paul W. Sherman, et John C. Wingfield. 1999. « Is avian humoral immunocompetence suppressed by testosterone? » *Behavioral Ecology and Sociobiology* 45 (3): 167-75. <https://doi.org/10.1007/s002650050550>.
- Horst, Allison, Alison Hill, et Kristen Gorman. 2022. *palmer-penguins: Palmer Archipelago (Antarctica) Penguin Data*. <https://allisonhorst.github.io/palmerpenguins/>.
- Waring, Elin, Michael Quinn, Amelia McNamara, Eduardo Arino de la Rubia, Hao Zhu, et Shannon Ellis. 2026. *skimr: Compact and Flexible Summaries of Data*. <https://docs.ropensci.org/skimr/>.
- Wickham, Hadley. 2023. *tidyverse: Easily Install and Load the Tidyverse*. <https://tidyverse.tidyverse.org>.
- Wickham, Hadley, et Jennifer Bryan. 2025. *readxl: Read Excel Files*. <https://readxl.tidyverse.org>.
- Wickham, Hadley, Winston Chang, Lionel Henry, Thomas Lin Pedersen, Kohske Takahashi, Claus Wilke, Kara Woo, Hiroaki Yutani, Dewey Dunnington, et Teun van den Brand. 2026. *ggplot2: Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics*. <https://ggplot2.tidyverse.org>.
- Wickham, Hadley, Romain François, Lionel Henry, Kirill Müller, et Davis Vaughan. 2026. *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. <https://dplyr.tidyverse.org>.
- Wickham, Hadley, Jim Hester, et Jennifer Bryan. 2026. *readr: Read Rectangular Text Data*. <https://readr.tidyverse.org>.

Young, Kevin V., Edmund D. Brodie, et Edmund D. Brodie.
2004. « How the Horned Lizard Got Its Horns ». *Science*
304 (5667): 65-65. <https://doi.org/10.1126/science.1094790>.