| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11. PRODUITS SANGUINS ET SUBSTITUTS DU PLASMA** | | | | | | | | | |
| **11.1 PRODUITS SANGUINS LABILES** | | | | | | | | | |
| 268 | Concentré de globules rouges | Poche | 250mL | | | X | X | X | X |
| 269 | Concentré de plaquettes | Poche | Unité | | | X | X | X | X |
| 270 | Plasma frais congelé | Poche | 200 mL | | | X | X | X | X |
| 271 | Sang total | Poche | 450 mL | | | X | X | X | X |
| **11.2 PRODUITS SANGUINS STABLES** | | | | | | | | | |
| 272 | Albumine | Flacon | 4 % ; 250 mL | | | | | X | X |
| 273 | Albumine | Flacon | 20 % ; 50 mL | | | | | X | X |
| 274 | Immunoglobulines polyvalentes | Flacon | 5 g/100 mL (IV) | | | | | X | X |
| 275 | Immunoglobulines Anti D | Seringue pré-remplie | 2 mL | | X | X | X | X | X |
| **12. MÉDICAMENTS UTILISES EN CARDIO-ANGEIOLOGIE** | | | | | | | | | |
| **12.1 ANTI-ANGOREUX** | | | | | | | | | |
| 276 | Aténolol | Comprimé | 50 mg ; 100 mg | | | (X) | X | X | X |
| 277 | Vérapamil | Comprimé | 40 mg ; 120 mg | | | (X) | X | X | X |
| 278 | Trinitrate de glycéryle | Forme sublinguale | 500 µg | | | X | X | X | X |
| 279 | Dinitrate d'isosorbide | Forme sublinguale | 5 mg | | | X | X | X | X |
| 280 | Molsidomine | Comprimé | 2 mg | | | (X) | X | X | X |
| (X) au niveau 3, la prescription est réservée uniquement aux médecins | | | | | | | | | |
| **12.2 ANTI-ARYTHMIQUES** | | | | | | | | | |
| 281 | Amiodarone | Comprimé | 200 mg | | | (X) | X | X | X |
| 282 | Amiodarone | Solution injectable | 50 mg/mL ; 3 mL | | | | | X | X |
| 283 | Bisoprolol | Comprimé | 5 mg | | | (X) | X | X | X |
| 284 | Digoxine | Comprimé | 125 µg ; 250 µg | | | (X) | X | X | X |
| 285 | Digoxine | Gouttes buvables | 50 µg/mL | | | | | X | X |
| 286 | Digoxine | Solution injectable | 250 µg/mL ; 2 mL | | | | | X | X |
| 287 | Lidocaïne | Solution injectable | 20 mg/mL ; 5 mL | | | | | X | X |
| 288 | Propranolol | Solution injectable | 5 mg/5 mL | | | | | X | X |
| 289 | Propranolol | Comprimé | 40 mg ; LP 160 mg | | | | | X | X |
| 290 | Atropine | Injectable | 0,5 mg ; 1 mg | | | | X | X | X |
| (X) au niveau 3, la prescription est réservée uniquement aux médecins | | | | | | | | | |
| **12.3 ARRÊT CARDIAQUE** | | | | | | | | | |
| 291 | Epinéphrine | Solution injectable | 0,25 mg/mL ; 0,5 mg/mL ; 1 mg/mL | | | | X | X | X |
| **12.4 ANTI-HYPERTENSEURS** | | | | | | | | | |
| 292 | Amlodipine | Comprimé | 5 mg ; 10 mg | | (X) | X | X | X | X |
| 293 | Bisoprolol | Comprimé | 5 mg | | | X | X | X | X |
| 294 | Clonidine* | Injectable | 0,15 mg | | | X | X | X | X |
| 295 | Enalapril | Comprimé | 5 mg ; 20 mg | | (X) | X | X | X | X |
| 296 | Hydrochlorothiazide | Comprimé | 25 mg | | (X) | X | X | X | X |
| 297 | Losartan | Comprimé | 50 mg ; 100 mg | | | X | X | X | X |

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 298 | Méthyldopa** | Comprimé | 250 mg | | | X | X | X | X |
| 299 | Nicardipine | Injectable | 10 mg/mL ; 10 mL | | | X | X | X | X |
| 300 | Hydralazine | Poudre pour préparation injectable | 20 mg | | | | | X | X |
| 301 | Labétalol | Injectable | 5 mg/mL ; 20mL | | | | | X | X |

* Au-delà de son effet anti-hypertenseur, la clonidine est utilisée comme adjuvant analgésique par un personnel spécialisé (anesthésiste)
** Réservé pour l'hypertension gravidique
(X) Prescription initiale par un médecin (niveau 3 et plus) et renouvellement de l'ordonnance au niveau 2

### 12.5 MEDICAMENTS DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Bisoprolol | Comprimé | 5 mg | | | X | X | X | X |
| 303 | Digoxine | Comprimé | 125 µg ; 250 µg | | | X | X | X | X |
| 304 | Digoxine | Gouttes | 50 µg/mL | | | X | X | X | X |
| 305 | Digoxine | Injectable | 250 µg/mL ; 2 mL | | | | X | X | X |
| 306 | Dobutamine | Injectable | 250 mg/20 mL | | | | X | X | X |
| 307 | Dopamine | Injectable | 200 mg/5 mL | | | | X | X | X |
| 308 | Enalapril | Comprimé | 5 mg ; 20 mg | | | X | X | X | X |
| 309 | Furosémide | Comprimé | 40 mg | | | X | X | X | X |
| 310 | Furosémide | Injectable | 20 mg | | | X | X | X | X |
| 311 | Hydrochlorothiazide | Comprimé | 12,5 mg ; 25 mg | | | X | X | X | X |
| 312 | Spironolactone | Comprimé | 50 mg ; 75 mg | | | X | X | X | X |
| 313 | Losartan | Comprimé | 25 mg ; 50 mg ; 100 mg | | | X | X | X | X |

### 12.6 ANTI-THROMBOTIQUES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Acide acétylsalicylique | Comprimé | 100 mg | | | X | X | X | X |
| 315 | Streptokinase | Poudre pour préparation injectable | 0,25 MUI ; 0,75 MUI ; 1,5 MUI | | | | | X | X |
| 316 | Clopidogrel | Comprimé | 75 mg | | | (X) | X | X | X |
| 317 | Enoxaparine | Injectable | 40 UI ; 60 UI ; 80 UI | | | | X | X | X |
| 318 | Altéplase | Poudre pour préparation injectable | 0,9 UI/kg | | | | | X | X |

(X) Au niveau 3, la prescription est réservée aux médecins

### 12.7 HYPOLIPEMIANTS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Simvastatine | Comprimé | 5 mg ; 10 mg ; 20 mg ; 40 mg | | | X | X | X | X |

## 13. MÉDICAMENTS UTILISÉS EN DERMATOLOGIE (topiques)

### 13.1. ANTIFONGIQUES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Econazole | Crème/spray/lait | 1% | | X | X | X | X | X |
| 321 | Miconazole | Pommade | 2% | | X | X | X | X | X |
| 322 | Terbinafine | Créme ou pommade | 1% | | X | X | X | X | X |
| 323 | Violet de Gentiane | Poudre | 0,5% | X | X | X | X | X | X |

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **13.2. ANTI-INFECTIEUX** | | | | | | | | |
| 324 | Acide fusidique | Crème ou pommade | 2% | | X | X | X | X | X |
| 325 | Eosine aqueuse | Solution externe | 1% et 2% | X | X | X | X | X | X |
| 326 | Permanganate de potassium | Solution | 1/10.000 | X | X | X | X | X | X |
| 327 | Sulfadiazine argentique | Crème | 1% | | X | X | X | X | X |
| | **13.3. ANTI-INFLAMMATOIRES ET ANTI-PRURIGINEUX** | | | | | | | | |
| 328 | Bétaméthasone | Crème ou pommade | 0,1% | | | X | X | X | X |
| 329 | Hydrocortisone | Crème ou pommade | 1% | | X | X | X | X | X |
| 330 | Oxyde de zinc | Crème ou pommade | 10% | | X | X | X | X | X |
| | **13.4 MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LA DIFFÉRENCIATION ET LA PROLIFÉRATION CUTANÉES** | | | | | | | | |
| 331 | Acide benzoique + Acide salicylique | Pommade | 6% + 3% | X | X | X | X | X | X |
| 332 | Acide salicylique | Solution | 5% | | X | X | X | X | X |
| 333 | Fluorouracil | Pommade | 5% | | X | X | X | X | X |
| 334 | Peroxyde de benzoyle | Gel | 5% ; 10% | | X | X | X | X | X |
| | **13.5 SCABICIDES ET PÉDICULICIDES** | | | | | | | | |
| 335 | Benzoate de Benzyle | Lotion | 25% ; 125 mL ; 500 mL | X | X | X | X | X | X |
| 336 | Perméthrine | Crème ou lotion | 1% ; 5% | | X | X | X | X | X |
| 337 | Néopynamine forte + Sumithrine | Solution | 200 mL | | X | X | X | X | X |
| 338 | Crotamiton | Crème ou lotion | 10% | | X | X | X | X | X |
| | **13.6 EMOLIENTS** | | | | | | | | |
| 339 | Urée | Pommade | 10% | | | X | X | X | X |
| 340 | Vaseline + Paraffine | Pommade | | | X | X | X | X | X |
| | **14. PRODUITS DE DIAGNOSTIC** | | | | | | | | |
| | **14.1. EN OPHTALMOLOGIE** | | | | | | | | |
| 341 | Fluorescéine | Collyre | 1% | | | | X | X | X |
| 342 | Pilocarpine | Collyre | 1% ; 2% ; 3% | | | | X | X | X |
| 343 | Tropicamide | Collyre | 0,5% | | | | X | X | X |
| 344 | Néosynéphrine | Collyre | 10% | | | | X | X | X |
| | **14.2. PRODUITS DE CONTRASTE** | | | | | | | | |
| 345 | Iobitridol | Injection intravasculaire | 250 mL ; 300 mL ; 350 mL | | | X | X | X | X |
| 346 | Iomeprol | Injectable | 300 mg/mL ; 50 mL ; 100 mL ; 200 mL | | | | | X | X |
| 347 | Iopamidol | Injectable | 300 mg/mL ; 370 mg/mL ; 50 mL ; 100 mL ; 200 mL | | | | | X | X |
| 348 | Ioxaglate de sodium et de méglumine | Injection intra articulaire et voie urinaire | 200 mg/mL ; 20 mL | | | | X | X | X |

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 349 | Ioxitalamate | Injectable | 20 mL | | | X | X | X | X |
| 350 | Ioxitalamate | Injection intravasculaire | 100 mL ; 150 mL ; 300 mL ; 350 mL | | | | X | X | X |
| 351 | Ioxytalamate de méglumine | Injectable | 350 mg/mL 20 et 50 mL | | | | X | X | X |
| 352 | Sulfate de Baryum | Poudre orale | 96,057 g/100 g | | | X | X | X | X |
| 353 | Sulfate de Baryum | Poudre rectale | 400 mg | | | X | X | X | X |
| 354 | Amidotrizoate | Injectable | 140 mg à 420 mg/mL ; 20mL | | | | X | X | X |
| 355 | Iohexol | Injectable | 140 mg à 350 mg/mL ; 5mL ; 10 mL ; 20 mL | | | | X | X | X |
| 356 | Iotroxate de meglumine | Injectable | 5 à 8 g ; 100mL à 250 mL | | | | X | X | X |
| 357 | Gadolinium | Injectable | 0,1 mmol/mL ; 50mL | | | | | | X |
| 358 | Fluorescéine | Injectable | 10% | | | | | | X |

## 15. ANTISEPTIQUES ET DÉSINFECTANTS

### 15.1 ANTISEPTIQUES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Alcool modifié (éthanol dénaturé) | Solution | 70° | X | X | X | X | X | X |
| 360 | Polyvidone iodée | Toutes présentations en solution | 10% | X | X | X | X | X | X |
| 361 | Polyvidone iodée | Collyre | 5% | | | X | X | X | X |
| 362 | Chlorhexidine | Solution | 5% ; 20% (digluconate) | | X | X | X | X | X |
| 363 | Solution hydroalcoolique | Solution | | X | X | X | X | X | X |

### 15.2 DÉSINFECTANTS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Hypochlorite de sodium* | Solution | 2,6% ; 3,6% (chlore actif) | | X | X | X | X | X |
| 365 | Ammonium quaternaires | Solution | 5L | | X | X | X | X | X |

* Eau de Javel à 9° ou 12°

## 16. DIURÉTIQUES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | Furosémide | Comprimé | 40 mg ; 500 mg* | | (X) | X | X | X | X |
| 367 | Furosémide | Injectable | 20 mg | | | X | X | X | X |
| 368 | Hydrochlorothiazide | Comprimé | 12,5 mg ; 25 mg | | (X) | X | X | X | X |
| 369 | Mannitol | Injectable | 10% ; 20% ; 250 mL ; 500 mL | | | X | X | X | X |
| 370 | Spironolactone | Comprimé | 25 mg ; 50 mg ; 75 mg | | | X | X | X | X |

(X) Prescription initiale par un médecin (niveau 3 et plus) et renouvellement de l'ordonnance au niveau 2

* Prescription réservée aux spécialistes

## 17. MÉDICAMENTS INDIQUÉS EN GASTROENTÉROLOGIE

### 17.1. ANTI-ACIDES ET ANTI-ULCEREUX

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Oméprazole | Comprimé | 10 mg ; 20 mg | | X | X | X | X | X |
| 372 | Oméprazole | Injectable | 40 mg | | X | X | X | X | X |
| 373 | Ranitidine | Injectable | 25 mg/mL ; 2 mL | | X | X | X | X | X |
| 374 | Ranitidine | Comprimé | 75mg ; 150 mg ; 300 mg | | X | X | X | X | X |

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **17.2 ANTI-EMETIQUES** | | | | | | | | |
| 375 | Métoclopramide | Comprimé | 10 mg | | X | X | X | X | X |
| 376 | Métoclopramide | Injectable | 5 mg/mL | | | X | X | X | X |
| 377 | Métopimazine | Gélule ou comprimé | 7,5 mg ; 15 mg | | X | X | X | X | X |
| 378 | Métopimazine | Injectable | 10 mg/1 mL | | X | X | X | X | X |
| 379 | Métopimazine | Suppositoire | 5 mg | | X | X | X | X | X |
| 380 | Ondansétron | Comprimé | 4 mg ; 8 mg éq. base | | | | X | X | X |
| 381 | Ondansétron | Injectable | 2 mg éq. base/mL ; 2 mL | | | | X | X | X |
| | **17.3 ANTISPASMODIQUES** | | | | | | | | |
| 382 | Butylscopolamine ou butylhyoscine | Comprimé | 10 mg | | X | X | X | X | X |
| 383 | Butylscopolamine | Injectable | 20 mg/mL | | X | X | X | X | X |
| 384 | Phloroglucinol | Comprimé | 80 mg | | X | X | X | X | X |
| 385 | Phloroglucinol | Injectable | 10 mg/mL | | X | X | X | X | X |
| | **17.4 LAXATIFS** | | | | | | | | |
| 386 | Lactulose | Solution buvable | 10 g/15 mL | | X | X | X | X | X |
| 387 | Huile de paraffine | Flacon | 250 mL | | X | X | X | X | X |
| 388 | Macrogol 4000 | Sachet buvable | 10 g | | X | X | X | X | X |
| | **17.5 ANTIDIARRHÉIQUES** | | | | | | | | |
| | **17.5.1 Réhydratation orale** | | | | | | | | |
| 389 | Package Sels de Réhydratation Orale (SRO) + sulfate de Zinc (Comprimé) | Poudre à diluer dans 200 mL ; 500 mL ; 1 l d'eau potable + Comprimé 20 mg | Glucose 13,5 g/L ; chlorure de sodium 2,6 g/L ; chlorure de potassium 1,5 g/L ; citrate trisodique dihydraté 2,9 g/L ; osmolarité 245 mOsm/L | X | X | X | X | X | X |
| | **17.5.2 Anti-diarrhéique symptômatique de l'adulte** | | | | | | | | |
| 390 | Lopéramide | Gélule | 2 mg | | X | X | X | X | X |
| | **17.6 ANTI-HÉMORRHOIDAIRES** | | | | | | | | |
| 391 | Extraits à base de flavonoïdes et sels de lidocaïne | Suppositoires et pommade | | | X | X | X | X | X |
| 392 | Extraits de flavonoïdes et anthocyanes | Comprimé | 500mg | | X | X | X | X | X |
| | **17.7 ANTI-REFLUX** | | | | | | | | |
| 393 | Bicarbonate et alginate de sodium | Comprimé ou gel | | | X | X | X | X | X |
| 394 | Hydroxyde d'Aluminium et de Magnésium | Comprimé ou gel | | | X | X | X | X | X |
| | **18. HORMONES, AUTRES MEDICAMENTS INDIQUES EN ENDOCRINOLOGIE ET CONTRACEPTIFS** | | | | | | | | |
| | **18.1 HORMONES SURRENALIENNES ET CORTICOÏDES DE SYNTHESE** | | | | | | | | |
| 395 | Fludrocortisone | Comprimé | 100 µg | | | | X | X | X |
| 396 | Hydrocortisone | Comprimé | 5 mg ; 10 mg ; 20 mg ; 100 mg | | | | X | X | X |
| 397 | Hydrocortisone | Injectable | 100 mg | | | | | X | X |
| 398 | Fludrocortisone | Injectable | 100 µg | | | | | X | X |

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **18.2 CONTRACEPTIFS** | | | | | | | | |
| | **18.2.1 Contraceptifs hormonaux oraux** | | | | | | | | |
| | ***18.2.1.1. Progestatifs seuls*** | | | | | | | | |
| 399 | Lévonorgestrel | Comprimé | 0,03 mg ; 1,5 mg | | X | X | X | X | X |
| 400 | Norgestrel | Comprimé | 0,75 mg | | X | X | X | X | X |
| 401 | Norethistérone (Enanthate) | Comprimé | 10 mg | | X | X | X | X | X |
| 402 | Lynestrénol | Comprimé | 0,5 mg | | X | X | X | X | X |
| | ***18.2.1.2. Oestroprogestatifs*** | | | | | | | | |
| 403 | Lévonorgestrel + Ethinylestradiol + fumarate ferreux | Comprimé | 150 µg/ 30 µg/ 75 mg | X | X | X | X | X | X |
| 404 | Ethinylestradiol + Norethistérone | Comprimé | 35 µg + 1 mg | X | X | X | X | X | X |
| 405 | Lévonorgestrel + Ethinylestradiol | Comprimé | 150 µg/ 30 µg | X | X | X | X | X | X |
| | ***18.2.1.3. Autres*** | | | | | | | | |
| 406 | Acétate d'unipristal | Comprimé | 35 mg | X | X | X | X | X | X |
| | **18.2.2 Contraceptifs hormonaux injectables ou implantables** | | | | | | | | |
| | ***Progestatifs seuls*** | | | | | | | | |
| 407 | Lévonorgestrel | Implant/Set | 2 x 75 mg | | X | X | X | X | X |
| 408 | Médroxyprogestérone acétate | Injectable retard | 150 mg ; 1 mL | X | X | X | X | X | X |
| 409 | Médroxyprogestérone acétate | Injectable | 104 mg/ 0,65 mL | X | X | X | X | X | X |
| 410 | Noréthistérone (énanthate) | Injectable | 200 mg/ 1 mL | X | X | X | X | X | X |
| 411 | Etonogestrel | Implant | 68 mg | | X | X | X | X | X |
| | **18.3. INDUCTEURS D'OVULATION** | | | | | | | | |
| 412 | Clomifène | Comprimé | 50 mg | | | X | X | X | X |
| | **18.4. INSULINE ET AUTRES ANTI-DIABETIQUES** | | | | | | | | |
| 413 | Glibenclamide | Comprimé | 1,25 mg ; 2,5 mg ; 5 mg | | | X | X | X | X |
| 414 | Insuline prémélangée 30% | Injectable | 100 UI/mL | | (X) | X | X | X | X |
| 415 | Insuline rapide | Injectable | 100 UI/mL | | (X) | X | X | X | X |
| 416 | Insuline semi-lente | Injectable | 100 UI/mL | | (X) | X | X | X | X |
| 417 | Metformine | Comprimé | 500 mg ; 850 mg ; 1000mg | | X | X | X | X | X |
| 418 | Gliclazide | Comprimé | 30 mg ; 60 mg | | | X | X | X | X |
| | (X) Prescription initiale par un médecin (niveau 3 et plus) et renouvellement de l'ordonnance au niveau 2 | | | | | | | | |
| | **18.5 HORMONES THYROÏDIENNES ET ANTITHYROÏDIENNES** | | | | | | | | |
| 419 | Carbimazole | Comprimé | 5 mg ; 20 mg | | | | X | X | X |
| 420 | Lévothyroxine | Comprimé | 25 µg ; 50 µg ; 100 µg | | | | X | X | X |
| 421 | Lugol | Solution buvable | 130 mg/mL | | | | X | X | X |
| 422 | Méthimazole | Comprimé | 5mg ; 10 mg | | | | X | X | X |
| | **18.6 HORMONES HYPOPHYSAIRES** | | | | | | | | |
| 423 | Vasopressine | Comprimé | 0,1 mg ; 0,2 mg ; 0,4 mg | | | | | X | X |
| 424 | Vasopressine | Injectable | 4 µg | | | | | X | X |

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19. PRÉPARATIONS POUR L'IMMUNOLOGIE** | | | | | | | | | |
| **19.1. PRODUITS DE DIAGNOSTIC** | | | | | | | | | |
| 425 | Tuberculine (dérivé protéinique purifié PPD) | Injectable | | | | X | X | X | X |
| **19.2 SERUMS ET IMMUNOGLOBULINES** | | | | | | | | | |
| 426 | Antitoxine Tétanique | Injectable | 250 UI ; 500 UI | | X | X | X | X | X |
| 427 | Immunoglobuline Anti D | Injectable | 1000 UI | | X | X | X | X | X |
| 428 | Sérum antirabique | Injectable | 150 UI/mL | | X | X | X | X | X |
| 429 | Sérum Antivénimeux Polyvalent* | Injectable | 10 mL | | X | X | X | X | X |
| ** Serpents ouest africains* | | | | | | | | | |
| **19.3 VACCINS** | | | | | | | | | |
| 430 | Antiamaril | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| 431 | Antiméningococcique A conjugué | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| 432 | Antiméningococcique A+C+W135 | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| 433 | Antiméningococcique A+C+Y+W135 | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| 434 | Anti pneumococcique (conjugué 10/13 V) | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| 435 | Antirabique | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| 436 | Antitétanique | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| 437 | Antityphoïde | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| 438 | Antihépatite B | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| 439 | Anti Haemophilus influenzae type B | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| 440 | Vaccin anti-SARS-COV2 | Injectable | | | X | X | X | X | X |
| **20. MYORELAXANTS (PERIPHERIQUES) ET INHIBITEURS DE LA CHOLINESTERASE** | | | | | | | | | |
| 441 | Atracurium* | Injectable | 10 mg/mL | | | | X | X | X |
| 442 | Néostigmine | Injectable | 0,5 mg/mL | | | | X | X | X |
| 443 | Néostigmine | Comprimé | 15 mg | | | | X | X | X |
| 444 | Pancuronium | Injectable | 2 mg/mL | | | | X | X | X |
| 445 | Suxaméthonium (ou succinylcholine) | Injectable | 50 mg/mL ; 2 mL | | | | X | X | X |
| 446 | Vecuronium | Injectable | 10 mg | | | | X | X | X |
| 447 | Atropine | Injectable | 0,5 mg/mL ; 1 mg/mL | | | | X | X | X |
| * Réservé aux spécialistes | | | | | | | | | |
| **21. PRÉPARATION POUR L'OPHTALMOLOGIE** | | | | | | | | | |
| **21.1. ANTI-INFECTUEUX** | | | | | | | | | |
| 448 | Aciclovir | Pommade ophtalmique | 3% | | X | X | X | X | X |
| 449 | Chloramphénicol | Collyre | 0,4% | | X | X | X | X | X |
| 450 | Gentamicine | Collyre | 0,3% | | X | X | X | X | X |
| 451 | Oxytétracycline | Pommade ophtalmique | 1% | | X | X | X | X | X |
| 452 | Ofloxacine | Collyre | 0,3% | | X | X | X | X | X |

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 453 | Ciprofloxacine | Collyre et pommade | 0,3% | | X | X | X | X | X |
| 454 | Tobramycine | Collyre | 0,4% | | X | X | X | X | X |
| 455 | Hexamidine diiséthionate | Collyre | 0,1% | | X | X | X | X | X |
| 456 | Econazole | Collyre | 0,05% | | X | X | X | X | X |
| 457 | Acide fusidique | Gel ophtalmique | 1% | | X | X | X | X | X |
| | **21.2. ANTIINFLAMMATOIRES (+ ou - ANTIBIOTIQUE)** | | | | | | | | |
| 458 | Indométacine | Collyre | 0,1% | | X | X | X | X | X |
| 459 | Dexaméthasone* | Collyre | 0,1% | | | X | X | X | X |
| 460 | Dexaméthasone + néomycine* | Collyre ou pommade ophtalmique | 0,1% | | | X | X | X | X |
| 461 | Diclofenac | Collyre | 0,1% | | X | X | X | X | X |
| | * prescription réservée aux médecins et aux TSO | | | | | | | | |
| | **21.3. ANESTHESIQUES LOCAUX** | | | | | | | | |
| 462 | Tétracaïne | Collyre | 0,5% | | | X | X | X | X |
| 463 | Oxybuprocaïne | Collyre | 0,4% | | | X | X | X | X |
| | **21.4. MIOTIQUES ET ANTIGLAUCOMATEUX** | | | | | | | | |
| 464 | Acétazolamide | Comprimé | 250 mg | | | | X | X | X |
| 465 | Dorzolamide | Collyre | 2% | | | X | X | X | X |
| 466 | Glycérol | Solution buvable | 150 mL ; 300 mL | | | | X | X | X |
| 467 | Pilocarpine | Collyre | 2% ; 4% | | | | X | X | X |
| 468 | Timolol | Collyre | 0,25% ; 0,5% | | | | X | X | X |
| 469 | Latanoprost | Collyre | 50 µg/mL | | | | X | X | X |
| 470 | Cartéolol | Collyre | 1% ; 2% | | | | X | X | X |
| | **21.5. MYDRIATIQUES** | | | | | | | | |
| 471 | Atropine | Collyre | 0,5 % ; 1% | | | | X | X | X |
| 472 | Phényléphrine | Collyre | 10% | | | | X | X | X |
| 473 | Tropicamide | Collyre | 0,5% | | | | X | X | X |
| | **21.6 ANTIALLERGIQUES** | | | | | | | | |
| 474 | Levocabastine | Collyre | 0,05% | | X | X | X | X | X |
| 475 | N-acetylaspartylglutamique | Collyre | 19,6 mg/ 0,4 mL | | X | X | X | X | X |
| 476 | Cromoglycate de sodium | Collyre | 2% | | X | X | X | X | X |
| | **22. OCYTOCIQUES ET ANTIOCYTOCIQUES** | | | | | | | | |
| | **22.1. OCYTOCIQUES** | | | | | | | | |
| 477 | Ergométrine | Injectable | 200 µg ; 1 mL | | | X | X | X | X |
| 478 | Ergométrine | Comprimé | 0,125 mg | | | X | X | X | X |
| 479 | Misoprostol | Comprimé | 200 µg | | | X | X | X | X |
| 480 | Oxytocine* | Injectable | 10 UI ; 1 mL | | (X) | X | X | X | X |
| | (*) Pour le niveau 2, l'oxytocine est strictement réservée à l'usage après accouchement | | | | | | | | |

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **22.2 TOCOLYTIQUES** | | | | | | | | |
| 481 | Nifédipine | Capsule libération immédiate | 10 mg | | | X | X | X | X |
| 482 | Nicardipine | Injectable | 10 mg/10 mL | | | | X | X | X |
| | **22.3 INHIBITEURS DE LA PROLACTINE** | | | | | | | | |
| 483 | Bromocriptine | Comprimé | 2,5 mg | | | X | X | X | X |
| 484 | Cabergoline | Comprimé | 0,5 mg | | | | | X | X |
| | **23. SOLUTIONS POUR DIALYSE PÉRITONÉALE** | | | | | | | | |
| 485 | Solution pour dialyse péritonéale de composition appropriée | Solution pour voie parentérale | Concentré bicarbonate ; concentré acide | | | | | | X |
| | **24. MÉDICAMENTS DES TROUBLES MENTAUX ET COMPORTEMENTAUX** | | | | | | | | |
| | **24.1 ANTIPSYCHOTIQUES** | | | | | | | | |
| 486 | Chlorpromazine | Comprimé | 25 mg ; 100 mg | | | X | X | X | X |
| 487 | Chlorpromazine | Gouttes buvables | 4% | | | X | X | X | X |
| 488 | Chlorpromazine | Injectable | 25 mg/mL ; 2 mL ; 50mg/2mL | | | X | X | X | X |
| 489 | Fluphénazine décanoate | Suspension injectable retard | 25 mg/mL ; 1 mL | | | X | X | X | X |
| 490 | Halopéridol | Comprimé | 5 mg ; 10 mg | | | X | X | X | X |
| 491 | Halopéridol | Injectable | 5 mg/mL ; 1 mL | | | X | X | X | X |
| 492 | Halopéridol décanoate | Suspension injectable retard | 50 mg/2 mL | | | X | X | X | X |
| 493 | Levomépromazine | Comprimé | 25 mg | | | X | X | X | X |
| 494 | Levomépromazine | Injectable | 25 mg/mL ; 1 mL | | | X | X | X | X |
| 495 | Sulpiride | Comprimé | 200 mg | | | X | X | X | X |
| 496 | Cyamemazine | Comprimé | 25 mg ; 50 mg ; 100 mg | | | | | X | X |
| 497 | Cyamemazine | Injectable | 50 mg | | | | | X | X |
| 498 | Loxapine | Comprimé | 50 mg ; 100 mg | | | | | X | X |
| 499 | Risperidone | Comprimé | 2 mg | | | X | X | X | X |
| | **24.2 MEDICAMENTS DES TROUBLES DE L'HUMEUR** | | | | | | | | |
| | **24.2.1 Antidépresseurs** | | | | | | | | |
| 500 | Amitriptyline | Comprimé | 25 mg | | | X | X | X | X |
| 501 | Amitriptyline | Gouttes buvables | 4% | | | X | X | X | X |
| 502 | Fluoxetine | Comprimé | 20 mg | | | | X | X | X |
| 503 | Miansérine | Comprimé | 30 mg ; 60mg | | | | X | X | X |
| 504 | Venlafaxine | Comprimé | 37,5 ; 75mg | | | | X | X | X |
| | **24.2.2 Médicaments utilisés dans les troubles bipolaires** | | | | | | | | |
| 505 | Carbamazépine | Comprimé | 200 mg ; 400 mg ; LP 200 mg ; LP 400 mg | | | | | X | X |
| 506 | Valproate de sodium | Comprimé | 250 mg ; 500 mg | | | | | X | X |
| 507 | Carbonate de lithium | Comprimé | 300 mg | | | | | X | X |
| 508 | Lamotrigine | Comprimé | 50 mg ; 100 mg | | | | | X | X |

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **24.3 ANXIOLYTIQUES** | | | | | | | | |
| 509 | Alprazolam | Comprimé | 0,25 mg ; 0,50 mg | | | X | X | X | X |
| 510 | Diazépam | Comprimé | 5 mg ; 10 mg | | X | X | X | X | X |
| 511 | Diazépam | Solution injectable | 10 mg/mL ; 1 mL | | X | X | X | X | X |
| 512 | Oxazepam | Comprimé | 10 mg ; 50 mg | | | | X | X | X |
| | **24.4 MÉDICAMENTS DES TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS** | | | | | | | | |
| 513 | Clomipramine | Comprimé | 10 mg ; 25 mg ; 75 mg | | | X | X | X | X |
| 514 | Clomipramine | Injectable | 25 mg | | | X | X | X | X |
| 515 | Sertraline | Comprimé | 50 mg | | | | X | X | X |
| | **24.5 MÉDICAMENTS UTILISES DANS LES SEVRAGES AUX OPIACES ET A L'ALCOOL** | | | | | | | | |
| 516 | Naltrexone | Comprimé | 50 mg | | | | | | X |
| 517 | Naloxone | Injectable | 400µg/mL ; 1 mL | | | | X | X | X |
| 518 | Nicotine | Patch | 5 à 30 mg/ 16h | | | | | | X |
| 519 | Nicotine | Chewing gum | 2 mg ; 4 mg | | | | X | X | X |
| 520 | Methadone | Solution | 5 mg/mL ; 10 mg/mL ; 5mg/5mL ; 10 mg/10mL | | | | | | X |
| 521 | Baclofène | Comprimé | 10; 20 et 40mg | | | | | X | X |
| | **24.6 HYPNOTIQUES** | | | | | | | | |
| 522 | Alimémazine | Comprimé | 5 mg | | | X | X | X | X |
| 523 | Hydroxyzine | Comprimé | 25 mg ; 100 mg | | | X | X | X | X |
| 524 | Zopiclone | Comprimé | 7,5 mg | | | | | X | X |
| | **25. MÉDICAMENTS INDIQUES EN PNEUMOLOGIE** | | | | | | | | |
| | **25.1. ANTI-ASTHMATIQUES ET TRAITEMENT DES BRONCHOPNEUMOPATHIES CHRONIQUES OBSTRUCTIVES** | | | | | | | | |
| 525 | Béclométasone | Aérosol | 50 µg/dose | | | X | X | X | X |
| 526 | Budésonide | Aérosol | 100 µg/dose ; 200 µg/dose | | | X | X | X | X |
| 527 | Ipratropium (bromure) | Aérosol | 20 µg/dose | | | X | X | X | X |
| 528 | Salbutamol | Comprimé | 4 mg ; 5 mg | | | X | X | X | X |
| 529 | Salbutamol | Injectable | 0,5 mg/mL | | | X | X | X | X |
| 530 | Salbutamol | Aérosol | 100 µg/dose | | X | X | X | X | X |
| 531 | Salbutamol | Solution pour nébuliseur | 5 µg/mL ; 2,5 mL et 5 mL | | | X | X | X | X |
| 532 | Epinephrine* | Injectable | 1 mg/mL | | | X | X | X | X |
| | **26. CORRECTION DES TROUBLES HYDRO-ELECTROLYTIQUES ET ACIDO-BASIQUES** | | | | | | | | |
| | **26.1 VOIE ORALE** | | | | | | | | |
| 533 | Package Sels de Réhydratation Orale (SRO) + sulfate de Zinc (Comprimé) | Poudre à diluer dans 200 mL ; 500 mL ; 1 l d'eau potable + Comprimé 20 mg | Glucose 13,5 g/L ; chlorure de sodium 2,6 g/L ; chlorure de potassium 1,5 g/L ; citrate trisodique dihydraté 2,9 g/L ; osmolarité 245 mOsm/L | X | X | X | X | X | X |

* Epinephrine = Adrenaline de synthèse

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 534 | Sevelamer (carbonate) | comprimés | 800 mg | | | | | X | X |
| | **26.2 VOIE PARENTÉRALE** | | | | | | | | |
| 535 | Chlorure de potassium | Injectable | 10% ; 10 mL | | X | X | X | X | X |
| 536 | Lactate de sodium (solution composée)* | Injectable | 5% | | X | X | X | X | X |
| 537 | Sérum bicarbonaté (hydrogénocarbonate de sodium) | Injectable | 1,4% (isotonique) ; 250 mL ; 500 mL | | | | X | X | X |
| 538 | Sérum glucosé (glucose)** | Injectable | 5% (isotonique) ; 10%, 30% (hypertoniques) ; 250 mL ; 500 mL | | X | X | X | X | X |
| 539 | Sérum salé (chlorure de sodium) | Injectable | 0,9% (isotonique); 250 mL ; 500 mL | | X | X | X | X | X |
| 540 | Chlorure de sodium | Injectable | 10% (hypertonique) ; 10 mL | | X | X | X | X | X |
| 541 | Polygéline ou gélatine fluide | Injectable | 500 mL | | | X | X | X | X |
| | * Solution de Ringer lactate | | | | | | | | |
| | ** les serums glucosés 30% sont à utiliser uniquement aux niveaux 4, 5 et 6 | | | | | | | | |
| | **26.3 DIVERS** | | | | | | | | |
| 542 | Eau pour préparation injectable | Injectable | 2 mL ; 5 mL ; 10 mL | | X | X | X | X | X |
| | **27. VITAMINES ET SELS MINÉRAUX** | | | | | | | | |
| 543 | Acide ascorbique (= vitamine C) | Injectable | 100 mg/mL | | X | X | X | X | X |
| 544 | Calcium | Comprimé | 500 mg ; 1000 mg | | X | X | X | X | X |
| 545 | Calcium (gluconate) | Injectable | 100 mg/mL ; 10 mL | | X | X | X | X | X |
| 546 | Complexe B (Vit B1, B2, B3=PP) | Comprimé | Composition variable* | | X | X | X | X | X |
| 547 | Multivitamines (Vit A, B1, B2, B3=PP, C, D3) | Comprimé | Composition variable* | | X | X | X | X | X |
| 548 | Pyridoxine (= vitamine B6) | Comprimé | 25 mg | | | X | X | X | X |
| 549 | Rétinol (= vitamine A) | Capsule | 50 000 UI ; 200 000 UI | | X | X | X | X | X |
| 550 | Thiamine (= vitamine B1) | Injectable | 100 mg/mL ; 1 mL ; 5 mL | | | X | X | X | X |
| 551 | Thiamine (= vitamine B1) | Comprimé | 50 mg | | | X | X | X | X |
| 552 | Sulfate de magnésium | Poudre | 30 g | | | X | X | X | X |
| 553 | Nicotinamide (Vit PP) | Comprimé | 500 mg | | | X | X | X | X |
| | *Doses adaptées aux besoins journaliers | | | | | | | | |
| | **28. AFFECTIONS DE L'OREILLE, DU NEZ ET DE LA GORGE** | | | | | | | | |
| | **28.1. MÉDICAMENTS AGISSANT AU NIVEAU DU NEZ** | | | | | | | | |
| 554 | Xylométazoline | Solution nasale | 0,1% | | X | X | X | X | X |
| 555 | Propionate de sodium | Solution nasale | 15 mL | | X | X | X | X | X |
| | **28.2. MÉDICAMENTS AGISSANT AU NIVEAU DE L'OREILLE** | | | | | | | | |
| 556 | Phénazone + lidocaïne | Gouttes auriculaires | 40 mg/10 mg pour 1000 mg ; 15 mL | | | X | X | X | X |
| 557 | Ciprofloxacine | Gouttes auriculaires | 0,3% | | | X | X | X | X |

| N° | DCI | FORME | DOSAGE | NIVEAU D'UTILISATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **28.3. MÉDICAMENTS AGISSANT AU NIVEAU DE L'ORO-PHARYNX** | | | | | | | | |
| 558 | Chlorhexidine | Solution pour pulvérisation ou topique | 1% | | X | X | X | X | X |
| | **29. MÉDICAMENTS POUR LES AFFECTIONS DES ARTICULATIONS** | | | | | | | | |
| | **29.1 ANTIGOUTTEUX** | | | | | | | | |
| 559 | Allopurinol | Comprimé | 100 mg | | | X | X | X | X |
| 560 | Colchicine | Comprimé | 2 mg | | | X | X | X | X |
| | **29.2 MÉDICAMENTS UTILISES POUR LE TRAITEMENT DE FOND DES AFFECTIONS RHUMATISMALES** | | | | | | | | |
| 561 | Azathioprine | Comprimé | 50 mg | | | | X | X | X |
| 562 | Cyclophosphamide | Comprimé | 50 mg | | | | X | X | X |
| 563 | Hydroxychloroquine | Comprimé | 200 mg | | | | X | X | X |
| 564 | Chloroquine | Comprimé | 100 mg ; 200 mg | | | | X | X | X |
| 565 | Méthotrexate | Comprimé | 2,5 mg | | | | X | X | X |
| 566 | Pénicillamine | Comprimé | 300 mg | | | | X | X | X |
| 567 | Sulfasalazine | Comprimé | 500 mg | | | | X | X | X |
| 568 | Acide acétylsalicylique | Comprimé | 100 mg ; 250 mg ; 500 mg | | | | X | X | X |