

Case I

$$\Gamma'_{ij} = \left\langle \frac{A_{ri}^R + A_{ri+1}^R}{\sqrt{2}}, \frac{B_{cj}^C + B_{cj+1}^C}{\sqrt{2}} \right\rangle \quad (1)$$

$$\Gamma'_{i,j} = \frac{1}{2} (\langle A_{ri}^R, B_{cj}^C \rangle + \langle A_{ri+1}^R, B_{cj}^C \rangle + \langle A_{ri}^R, B_{cj+1}^C \rangle + \langle A_{ri+1}^R, B_{cj+1}^C \rangle)$$

$$\psi(AB) = \psi(\Gamma)$$

$$C_{i,j} = \langle A_{ri}, B_{cj} \rangle$$

$$\psi_{1C}(\Gamma)_{i,j} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle A_{ri}, B_{cj} \rangle + \langle A_{ri+1}, B_{cj} \rangle \quad (2)$$

$$\psi_{1C}(\Gamma)_{i,j+1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle A_{ri}, B_{cj+1} \rangle + \langle A_{ri+1}, B_{cj+1} \rangle \quad (3)$$

$$\psi(\Gamma) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{1C}(\Gamma)_{i,j} + \psi_{1C}(\Gamma)_{i,j+1}) \quad (4)$$

$$\psi(\Gamma) = \frac{1}{2} (\langle A_{ri}, B_{cj} \rangle + \langle A_{ri+1}, B_{cj} \rangle + \langle A_{ri}, B_{cj+1} \rangle + \langle A_{ri+1}, B_{cj+1} \rangle) \quad (5)$$