

# 1 Поверхности второго порядка

## 1.1 Общее уравнение

**Определение.** Поверхностью второго порядка называется множество точек трёхмерного аффинного или точечно-евклидова пространства, координаты которых в некоторой аффинной системе координат удовлетворяют уравнению  $F(x, y, z) = 0$ , где

$$F(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0$$

причём хотя бы одно из чисел  $a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{12}, a_{13}, a_{23}$  отлично от нуля. Выражение  $F(x, y, z)$  – *многочлен второй степени* от переменных  $x, y, z$ . Уравнение  $F(x, y, z) = 0$  называется *общим уравнением* поверхности второго порядка.

**Замечание.** Точно так же определяются поверхности второго порядка в аффинном или точечно-евклидовом пространстве произвольной конечной размерности  $n$ ; они задаются многочленами второй степени от  $n$  переменных.

Теория поверхностей второго порядка аналогична теории кривых второго порядка.

## 1.2 Квадратичная часть и матрицы

С каждым многочленом  $F(x, y, z)$  связано *квадратичное отображение* пространства (с данной системой координат)  $f : A^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , которое каждой точке  $X$  с координатами  $(x, y, z)$  ставит в соответствие число  $F(x, y, z)$ . Говорят, что это отображение представлено многочленом  $F$  в данной системе координат. В другой системе координат многочлен, представляющий ту же функцию, станет другим.

Как и в случае линий второго порядка:

$$F(x, y, z) = (x \ y \ z \ 1) A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = (x \ y \ z) A_1 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 2(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + a_0,$$

где

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_0 \end{pmatrix}$$

– большая матрица,

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

– малая матрица (квадратичной части).

**Определение.**

$$F_1(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz$$

называется *квадратичной частью* многочлена  $F$ .

## 1.3 Закон изменения матриц при переходе к новой аффинной системе координат

Дословно так же, как в случае линий, доказываем, что при переходе к новой системе координат матрицы  $A$  и  $A_1$  многочлена  $F$ , представляющие всё ту же функцию  $f : A^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , меняются по закону  $A'_1 = C^T A_1 C$  и  $A' = D^T A D$ , где  $A'_1$  и  $A'$  – матрицы в новых координатах,  $C$  – матрица перехода от старого базиса к новому (её столбцы – координаты новых

базисных векторов в старом базисе),  $D = \begin{pmatrix} C & x_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , где  $x_0, y_0, z_0$  – координата нового

начала координат в старой системе координат.

В новой системе координат:

$$F'(x', y', z') = (x' \ y' \ z' \ 1) A' \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} + 2 (x' \ y' \ z') A'_1 \begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{pmatrix} + a_0,$$

где буквы со штрихами – координаты, многочлен и матрицы в новой системе координат,

$$\begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{pmatrix} = C^T \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}.$$

## 2 Приведение уравнений поверхностей второго порядка к каноническому виду

### 2.1 Алгоритм приведения уравнения к каноническому виду

Будем считать, что дело происходит в точечно-евклидовом пространстве  $\mathbb{R}^3$  и многочлен  $F$ , представляющий квадратичное отображение  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , задан в прямоугольной системе координат. Это не умаляет общности: если задана не прямоугольная система координат, то мы всегда можем перейти в прямоугольную (по выписанным выше формулам), а если дело происходит в аффинном пространстве, то мы можем временно превратить его в евклидово, определив скалярное произведение в данной системе координат (в которой записана функ-

ция  $F(x, y, z)$ ) по формуле  $\left( \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \right) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$ . Эта формула действительно задаёт некоторое скалярное произведение, и наша система координат прямоугольна относительно него.

Совершенно так же (и из тех же соображений), как в случае линий, мы можем найти каноническую систему координат (прямоугольную!), в которой уравнение поверхности имеет простейший вид:

1. Решаем характеристическое уравнение  $|A - \lambda E| = 0$ , находим корни  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  – характеристические числа (собственные значения).

В этом месте отличие (от случая линии): если нулевых корней  $\leq 1$ , то первые номера даём положительным  $\lambda$  (упорядочиваем по возрастанию), следующие – отрицательным (по убыванию), потом идёт 0 (если есть). Если получилось два нулевых корня, то  $\lambda_1 = \lambda_3 = 0$ ,  $\lambda_2 \neq 0$ .

2. Для каждого  $i = 1, 2, 3$  решаем однородную систему уравнений  $(A - \lambda_i E) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , находим ненулевое решение (оно обязательно существует, так как  $|A - \lambda_i E| = 0$ ). Если есть несколько линейно независимых решений (два или три), выбираем максимально возможное число линейно независимых решений так, чтобы они были взаимно ортогональны; другими словами, выбираем ортогональный базис в пространстве решений (мы знаем, что это возможно, поскольку какой-то базис есть всегда, а ортогонализировать базисы мы уже научились).
3. Нормируем полученные на предыдущем шаге решения (собственные векторы, соответствующие собственным значениям  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ): если  $\bar{u}_i$  – решение, соответствующее числу  $\lambda_i$ , то полагаем  $\bar{e}_i = \frac{\bar{u}_i}{|\bar{u}_i|}$ . Векторы  $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$  будут базисными векторами канонической системы координат. По построению они образуют ортонормированный базис.
4. Избавляемся от линейной части, насколько возможно. Выделяя полные квадраты и меняя начало координат: в новом базисе матрица  $A'_1$  диагональна, и если в выражении  $F'(x', y', z')$  есть, скажем,  $a'_{11}x'^2 + 2a'_1x'$ , то меняем  $x'$  на  $x'' + x'_0$ , где  $x'_0$  – число, первая координата нового начала координат в системе координат с новым базисом) так, чтобы было  $a'_{11}x'^2 + 2a'_1x' = a'_{11}x''^2 + c_1$ , где  $c_1$  – константа.
5. Если удалось избавиться от всех линейных членов, то мы получили канонический вид уравнения, а заодно и каноническую систему координат: её базис – вектора  $\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3$ , найденные на третьем шаге, а начало – точка  $O'$  с координатами  $x'_0, y'_0, z'_0$  (относительно системы координат со старым началом и новым базисом), найденным на четвёртом шаге. Если не удалось избавиться от, например,  $a'_3z'$ , то есть в квадратичной части  $F'(x', y', z')$  нет члена  $a_3z'^2$  (это означает, что  $\lambda_3 = 0$ ), но от других линейных членов избавиться удалось, то сдвигаем начало координат по оси  $O'z'$  так, чтобы избавиться от всех накопившихся при избавлении от других линейных членов констант:  $z'' = z''' - \frac{c_1+c_2+a_0}{a'_3}$ . Ничего себе, оказывается кавычку можно было не экранировать... Надо теперь всё переделывать((( Третьей координатой нового начала координат (в системе координат с новым базисом и старым началом) будет  $-\frac{c_1+c_2+a_0}{a'_3}$ , а первыми двумя координатами будут  $x'_0$  и  $y'_0$ , найденные на шаге 4. Если не удалось избавиться от линейных членов с  $x$  и  $z$  (и тогда  $\lambda_1 = \lambda_3 = 0$ ), то на четвёртом шаге получилось уравнение  $\lambda_2 y''^2 + 2a''_1 x'' + 2a''_3 z'' + c_2 + a_0 = 0$ , где  $c_2$  – константа, которая вылезла при избавлении от  $2a'_2 y'$ . В этом случае ещё раз меняем базис:  $\bar{e}''_1 = \left( \frac{a''_1}{\sqrt{a''_1{}^2 + a''_3{}^2}}, 0, \frac{a''_3}{\sqrt{a''_1{}^2 + a''_3{}^2}} \right)$ ,  $\bar{e}''_2 = \bar{e}'_2$ ,  $\bar{e}''_3 = \left( \frac{a''_3}{\sqrt{a''_1{}^2 + a''_3{}^2}}, 0, -\frac{a''_1}{\sqrt{a''_1{}^2 + a''_3{}^2}} \right)$ . Новый базис по-прежнему ортогональный, и после перехода к нему уравнение примет вид  $\lambda_2 y'''^2 + 2a'''_1 x''' + c = 0$ . Остаётся избавиться от константы сдвигом по оси  $x'''$ .
6. В результате получим почти каноническую систему координат и *простейшее уравнение поверхности*. Его надо будет поделить на число (и, возможно, поменять направление некоторых базисных векторов и(или) поменять местами некоторые базисные векторы), чтобы получилось уравнение одно из семнадцати видов, перечисленных далее. Например, если получилось  $y^2 = -2px$ , для  $p > 0$ , надо поменять местами направления век-

тора  $\bar{e}_1''$  (умножить его на -1), а если получилось  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ , надо поменять местами  $\bar{e}_1''$  и  $\bar{e}_2''$ .

Если есть цель сохранить ориентацию системы координат, то может понадобится ещё один шаг: надо посмотреть, какой определитель у произведения всех матриц перехода (т.е. у матрицы перехода от самого первого к самому последнему базису) и если он  $-1$ , поменять направление (умножить на  $-1$ ) вектор  $\bar{e}_2''$  (линейных членов с  $y$  в каноническом уравнении не бывает, так что это ничего не испортит).

Обоснуем первый шаг.

**Утверждение.** Для любой симметричной матрицы  $A_1$  размера  $3 \times 3$  характеристический многочлен  $|A - \lambda E|$  имеет три корня.

*Доказательство.* Будем трактовать матрицу  $A_1$ , как матрицу квадратичной части многочлена второй степени, представляющего квадратичную функцию  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  на евклидовом пространстве в некотором ортонормированном базисе  $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ . Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Заметим, что  $a_{ij} = \bar{e}_i^T A_1 \bar{e}_j = \bar{e}_j^T A_1 \bar{e}_i$  (потому что  $\bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\bar{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ). Пусть

$$A' = \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ a'_{12} & a'_{22} & a'_{23} \\ a'_{13} & a'_{23} & a'_{33} \end{pmatrix}$$

– матрица квадратичной части многочлена, представляющего ту же функцию  $f$  в другом базисе  $\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3$ . Заметим, что по-прежнему  $a'_{ij} = \bar{e}'_i^T A'_1 \bar{e}'_j = \bar{e}'_j^T A'_1 \bar{e}'_i$ , потому что  $A'_1 = C^T A_1 C$  и  $\bar{e}_i = C \bar{e}'_i$ , где  $C$  – матрица перехода.

Отсюда вытекает, что, во-первых, матрица  $A'_1$  по-прежнему симметрична, а во-вторых, если  $\bar{e}'_i^T A'_1 \bar{e}'_j = 0$ , то  $a'_{ij} = 0$ .

Любой многочлен третьей степени имеет хотя бы один корень. Пусть  $\lambda_1$  – корень многочлена  $|A_1 - \lambda E|$ . Тогда у матрицы  $A_1$  существует собственный вектор  $\bar{x}$  с собственным значением  $\lambda_1$ :  $A_1 \bar{x} = \lambda_1 \bar{x}$ . Заметим, что для любого вектора  $\bar{y}$ , ортогонального вектору  $\bar{x}$ , имеем  $\bar{y}^T A_1 \bar{x} = \bar{y}^T \lambda_1 \bar{x} = \lambda_1 (\bar{y}, \bar{x}) = 0$ .

Выберем в пространстве любой ортонормированный базис  $\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3$  с первым вектором  $\bar{e}'_1 = \frac{\bar{x}}{|\bar{x}|}$ . В этом базисе

$$A'_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} \\ 0 & a'_{23} & a'_{33} \end{pmatrix}.$$

Характеристический многочлен  $|A'_1 - \lambda E| = (\lambda_1 - \lambda)((a'_{22} - \lambda)(a'_{33} - \lambda) - a'^2_{23})$  имеет три корня (мы уже проверяли, что дискриминант уравнения  $(a'_{22} - \lambda)(a'_{33} - \lambda) - a'^2_{23} = 0$  неотрицателен для любых  $a'_{22}, a'_{33}, a'_{23}$ , когда рассматривали двумерный случай).

Осталось заметить, что  $|A'_1 - \lambda E| = |A_1 - \lambda E|$ , потому что матрица перехода  $C$  ортогональна (т.е.  $C^T = C^{-1}$ ) и  $A'_1 = C^T A_1 C$ :

$$\begin{aligned} |A'_1 - \lambda E| &= |C^T A_1 C - \lambda E| = |C^{-1} C_1 C - C^{-1}(\lambda E)C| = |C^{-1}(A_1 - \lambda E)C| = \\ &= |C^{-1}| |A_1 - \lambda E| |C| = \frac{1}{|C|} |A_1 - \lambda E| |C| = |A_1 - \lambda E|. \end{aligned}$$

Следовательно, характеристический многочлен  $|A_1 - \lambda E| = 0$  матрицы  $A_1$  имеет те же три корня.  $\square$

Как и в двумерном случае, при переходе к новой прямоугольной системе координат (при условии, что старая система, в которой задано уравнение поверхности, тоже прямоугольная) не меняются:

- Характеристический многочлен  $|\chi_{A_i}(\lambda) = |A_1 - \lambda E|$  (мы это только что показали);
- Определитель  $\delta = |A_1|$  (потому что  $|A'_1| = |C^T A_1 C| = |C^T| |A_1| |C| = |C^{-1}| |A_1| |C| = \frac{1}{|C|} |A_1| |C| = |A_1|$ , а также потому, что это свободный член в характеристическом многочлене);
- след  $S = a_{11} + a_{22} + a_{33}$  матрицы  $A_1$  (потому что это коэффициент при  $\lambda^2$  в характеристическом многочлене);
- $\det A = |A|$  (потому что  $A' = D^T A D$  и  $|D| = 1 \cdot |C| = \pm 1$ ).

Из доказанного выше утверждения вытекает, что описанный алгоритм (6 шагов) действительно работает, и с его помощью можно привести любое *уравнение* поверхности второго порядка к одному из перечисленных на следующих страницах видов, называемых *каноническими уравнениями* поверхностей второго порядка. При этом мы сначала приводим уравнение к *простейшему виду* переходом к новой системе координат, которая называется *канонической*, а затем "причёсываем" простейшее уравнение (делим на подходящее число), чтобы привести его к каноническому виду.

**Замечание.** При "причёсывании"  $\delta, \Delta, S$  (а также  $\chi_{A_i}(\lambda)$ ) могут измениться, но стать нулевыми, если были ненулевыми, они не могут.

Канонических уравнений – 17, а поверхностей – 1.

## 2.2 Канонические уравнения поверхностей второго порядка

1.  $a \geq b \geq c > 0$ ,  $a, b, c$  - полуоси:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \text{эллипсоид};$$

2.  $a \geq b \geq c > 0$ :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1 - \text{мнимый эллипсоид};$$

3.  $a \geq b \geq c > 0$ :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0 - \text{мнимый конус};$$

4.  $a, b, c > 0$ ,  $a \geq b$ :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \text{однополостный гиперboloид};$$

5.  $a, b, c > 0$ ,  $a \geq b$ :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 - \text{двуполостный гиперboloид};$$

6.  $a, b, c > 0, a \geq b$ :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 - \text{конус};$$

7.  $p \geq q > 0$ :

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z - \text{эллиптический параболоид};$$

8.  $p \geq q > 0$ :

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z - \text{гиперболический параболоид};$$

9.  $a \geq b > 0, a, b$  - полуоси:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \text{эллиптический цилиндр};$$

10.  $a \geq b > 0$ :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1 - \text{мнимый эллиптический цилиндр};$$

11.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 - \text{пара мнимых пересекающихся плоскостей};$$

12.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 - \text{гиперболический цилиндр};$$

13.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 - \text{пара пересекающихся плоскостей};$$

14.  $p > 0, p$  - фокальный параметр:

$$y^2 = 2px - \text{параболический цилиндр};$$

15.  $a \neq 0$ :

$$y^2 = a^2 - \text{пара параллельных плоскостей};$$













16.  $a \neq 0$ :

$$y^2 = -a^2 - \text{пара мнимых параллельных плоскостей};$$

17.

$$y^2 = 0 - \text{пара совпадающих плоскостей}.$$

Пока что просто украдено из интернета:

Название поверхности	Каноническое уравнение	Схематическое изображение	Название поверхности	Каноническое уравнение	Схематическое изображение
Эллипсоид (в частности, эллипсоид вращения и сфера)	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$		Эллиптический параболоид	$z = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q}$	
Однополостный гиперболоид	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$		Гиперболический параболоид	$z = \frac{x^2}{2p} - \frac{y^2}{2q}$	
Двухполостный гиперболоид	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$		Эллиптический цилиндр	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	
Конус второго порядка	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$		Гиперболический цилиндр	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	
			Параболический цилиндр	$y^2 = 2px$	
Название поверхности	Каноническое уравнение	Схематическое изображение	Название поверхности	Каноническое уравнение	Схематическое изображение
Пара пересекающихся плоскостей	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$		Мнимый эллипсоид	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1$	
Пара параллельных плоскостей	$\frac{x^2}{a^2} = 1$		Мнимый эллиптический цилиндр	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$	
Пара совпадающих плоскостей	$x^2 = 0$		Пара мнимых параллельных плоскостей	$\frac{x^2}{a^2} = -1$	
Мнимый конус второго порядка с действительной вершиной (0; 0; 0)	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$				
Пара мнимых плоскостей (пересекающихся по действительной прямой)	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$				

**Замечание.** *Эллипсоид* – сплюснутая поверхность, полученная вращением эллипса, нарисованного в плоскости  $Oxy$ , вокруг оси  $Ox$ .

*Однополостный гиперболоид* – сплюснутая поверхность, полученная вращением гиперболы,

нарисованной в плоскости  $Oxz$ , вокруг оси  $Oz$ .

*Двуполостный гиперболоид* – сплюснутая поверхность, полученная вращением гиперболы, нарисованной в плоскости  $Oxy$ , вокруг оси  $Oz$ . *Конус* – сплюснутая поверхность, полученная вращением пары пересекающихся прямых, нарисованных в плоскости  $Oxz$ , вокруг  $Oz$ . Вершина конуса в начале координат, направляющая кривая – эллипс с полуосями  $a$  и  $b$  в плоскости  $z = c$ .

*Эллиптический параболоид* – вращение параболы в плоскости  $Oxz$  вокруг  $Oz$  и сплющивание.

*Гиперболический параболоид* (дословно) – вешаем параболу рогами вниз на параболу рогами вверх и водим туда-сюда, оставляя в вертикальном положении. Сечения горизонтальными плоскостями – гиперболы, поэтому гиперболический.

## 3 Центры поверхностей второго порядка

Все дальнейшие определения и рассуждения аналогичны случаю линий.

### 3.1 Определение

**Определение.** Точка  $O$  аффинного или точечно-евклидова пространства называется *центром симметрии* множества  $M$  (в том же пространстве), если для любой точки  $X \in M$  симметричная ей относительно  $O$  точка  $X'$  (т.е. такая точка, что  $O$  является серединой отрезка  $[XX']$ , т.е.  $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OX'}$ ) тоже принадлежит множеству  $M$ .

**Определение.** Точка  $O$  трёхмерного аффинного пространства, имеющая координаты  $(x_0, y_0, z_0)$  в некоторой системе координат называется *центром* поверхности второго порядка, заданной уравнением  $F(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0$  в той же системе координат, если её координаты удовлетворяют системе уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_1 = 0, \\ a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_2 = 0, \\ a_{31}x_0 + a_{32}y_0 + a_{33}z_0 + a_3 = 0. \end{cases}$$

**Замечание.** Свойство точки пространства быть или не быть центром данной поверхности не зависит от выбора системы координат, в которой заданы координаты этой точки и уравнение поверхности.

### 3.2 Связь с центром симметрии

**Теорема.** Точка  $O$  трёхмерного аффинного (или точечно-евклидова) пространства является центром симметрии непустой поверхности второго порядка тогда и только тогда, когда она является центром этой поверхности.

*Доказательство.*  $\Leftarrow$  Доказывается точно так же, как в двумерном случае (переносом начала координат в точку  $O$ ).  $\Rightarrow$  Аналогично двумерному случаю: переносим начало координат в  $O$  (центр симметрии) и видим, что многочлен  $F(x, y, z)$  превращается в многочлен  $F'(x', y', z') = \dots + 2a'_1x' + 2a'_2y' + 2a'_3z' + a'_0$ , где

$$a'_1 = a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_1,$$

$$a'_2 = a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_2,$$



$$a'_3 = a_{31}x_0 + a_{32}y_0 + a_{33}z_0 + a_3,$$

$$a'_0 = F(x_0, y_0, z_0).$$

Пусть  $(x', y', z')$  – любая точка на поверхности. Поскольку  $O$  (новое начало координат) – центр симметрии поверхности, видим, что  $(-x', -y', -z')$  тоже принадлежит поверхности, т.е.

$$F'(x', y', z') = 0 \Leftrightarrow F'(-x', -y', -z') = 0,$$

откуда

$$F'(x', y', z') - F'(-x', -y', -z') = 4a'_1x' + 4a'_2y' + 4a'_3z' = 0.$$

Значит, либо  $a'_1 = a'_2 = a'_3 = 0$  (и тогда  $O$  – центр), либо вся поверхность лежит на плоскости  $a'_1x' + a'_2y' + a'_3z' = 0$  (это плоскость, если  $a'^2_1 + a'^2_2 + a'^2_3 \neq 0$ ).

(Доказывается рассмотрением пересечений плоскостей с поверхностями, примеры ниже) На плоскости лежит либо мнимый конус (точка), либо пара мнимых пересекающихся плоскостей (прямая), либо пара совпадающих плоскостей; пустое множество не рассматриваем (см. формулировку теоремы).

1. Мнимый конус состоит из одной точки, она же центр симметрии. В канонической системе координат она имеет координаты  $(0, 0, 0)$ . Вычисляя координаты центра в той же системе, снова получаем  $(0, 0, 0)$ .
2. Пара мнимых пересекающихся плоскостей  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ . Центры симметрии составляют прямую  $x = y = 0$ , все они являются центрами.
3. Пара совпадающих плоскостей: все точки поверхности – центры симметрии, и все удовлетворяют уравнениям центра.

□

**Замечание.** У поверхности есть ровно 1 центр тогда и только тогда, когда  $\delta \neq 0$  (см. систему уравнений для центра).

**Определение.** Поверхности с  $\delta = 0$  называются *центральными*, остальные называются *нецентральными*.

**Замечание.** Ни одного центра нет только у параболоидов и параболического цилиндра. Во всех остальных случаях любой центр можно взять за начало канонической системы координат.