

- Una onda inicialmente polarizada según x y viajando según z positivo incide en un polarizador cuyo eje de transmisión forma un ángulo α con el eje x , y luego pasa por un segundo polarizador que forma un ángulo β con el primero. ¿Cuál es la expresión de la onda transmitida en los ejes originales? ¿Y en los ejes del segundo polarizador? ¿Cómo son las respectivas matrices que describen al sistema? ¿Cuál es la intensidad media transmitida por el sistema?
- Se tiene un polarizador imperfecto con una matriz $\begin{bmatrix} t_x & \epsilon \\ \epsilon & \delta \end{bmatrix}$ con $t_x \simeq 1$, $\epsilon \ll 1$ y $\delta \ll 1$.
 - Hallar la matriz del polarizador si forma un ángulo θ con el eje x .
 - Hallar la energía transmitida si se incide con luz linealmente polarizada según x .
 - Ídem. 2b si incide polarizada según y .
- Se tienen N polarizadores sucesivamente rotados en ángulos $\pi/2N$, encontrar la matriz del sistema. Hallar el límite para N tendiendo a ∞ . Calcular la intensidad transmitida.
- Una onda de polarización arbitraria incide sobre un espejo plano y se refleja sobre si misma. ¿Cómo escribe la onda reflejada cambiando al sistema $z = -z$ de modo que nuevamente se propague según z positivo. Note que al invertir z , debe invertir algún otro eje para mantener las orientaciones relativas de los ejes. ¿Cómo es ahora la matriz de un polarizador en este nuevo sistema? ¿Y una lámina de onda?
- Mostrar que el versor para una onda polarizada circularmente solo cambia en una fase ante una rotación de coordenadas. ¿Cuánto cambia la fase? Explique.
- Encontrar la matriz de un polarizador seguido de una lámina de cuarto de onda orientada con su eje a un ángulo α respecto del eje del polarizador. ¿Cual es el estado de polarización de la onda transmitida? ¿Depende del estado de polarización de la incidente? Explique. Calcule la intensidad transmitida en función de α .
- Al sistema anterior se le agrega un espejo que refleja la onda sobre si misma. ¿Para qué ángulo α la transmisión del sistema a la vuelta es nula y para cuál es máxima?
- Se realizan los siguientes experimentos: entre dos polarizadores rotados un ángulo α se colocan alternativamente un medio con actividad óptica que rota la polarización un ángulo β y un rotador de Faraday que también rota ese mismo ángulo. Calcule para cada caso la transmisión del sistema y para que valor de β es máxima. Para ese valor de β se refleja la luz nuevamente sobre el sistema. Calcule ahora la intensidad devuelta para cada caso. ¿En algún caso se puede hacer nula?
- Se tiene un haz de luz y se quiere conocer su estado de polarización (el tipo de polarización y la orientación respecto de los ejes del laboratorio) realizando experimentos. Se cuenta con el siguiente material: un detector que mide intensidad de luz, un polarizador lineal con el eje de transmisión paralelo a la mesa óptica (la mesa sobre la que se trabaja), una lámina de media onda, y una lámina de cuarto de onda. Las dos últimas están montadas en soportes que permiten girarlas, y se conoce la ubicación de los ejes ordinarios. Describa un procedimiento experimental que contemple todos los casos que puedan presentarse.