


LIGADURAS

Los problemas marcados con (*) tienen alguna dificultad adicional, no dude en consultar.

1. Máquina de Atwood simple

Obtenga a partir de la ecuación de Euler-Lagrange la aceleración que presentan las pesas de masas m_1 y m_2 que cuelgan de una cuerda de longitud ℓ que pasa por sobre una polea de radio R_p y masa m_p .


- Resuelva el caso en que se considera m_p irrelevante.
- Resuelva ahora considerando m_p , y que la polea presenta una sección cilíndrica. El momento de inercia de tal cilindro de masa m ante rotaciones en torno a su eje de simetría longitudinal es $(m/2)R^2$.



2. Aro y polea

Una pesa de masa m pende de una sección de cuerda de longitud ℓ_{pesa} que sobresale a la derecha de una polea de radio R_{polea} y masa m_{polea} . La cuerda tiene un longitud total ℓ , su masa es despreciable y gira solidaria con la una polea.

El otro extremo se ata con un nudo de masa M_{nudo} a un aro de masa m_{aro} , enrollándose parcialmente en torno a éste. El centro de la polea está a una altura h por sobre el del aro de radio R_{aro} que como puede rotar libremente presenta un momento de inercia $m_{\text{aro}}R_{\text{aro}}^2$. Denomine el ángulo desde el centro hasta el nudo medido desde la horizontal con θ . Recuerde que el sentido positivo para un ángulo es el antihorario.




- Escriba la posición de las partículas con masa con origen el centro del aro.
- Describa la función de ligadura y utilícela para expresar las posiciones en función de θ .
- Obtenga la ecuación de Euler-Lagrange para la dinámica.

$$\text{Resultado: } M_{\text{nudo}}R_{\text{aro}}^2\ddot{\theta}_{\text{aro}} + M_{\text{nudo}}R_{\text{aro}}g \cos(\theta_{\text{aro}}) + R_{\text{aro}}^2m_{\text{aro}}\ddot{\theta}_{\text{aro}} + \frac{R_{\text{polea}}^2m_{\text{polea}}\ddot{\theta}_{\text{aro}}}{2} = 0$$

3. Péndulo de pesas engarzadas y acopladas

Dos pesas de masa m_1 y m_2 están unidas por una barra rígida inextensible de longitud ℓ y masa despreciable frente a las anteriores. La de m_1 está engarzada en un eje horizontal y la de m_2 en uno vertical.




- Escriba las posiciones de ambas partículas en función de una única coordenada haciendo uso de la ligadura que impone la barra rígida. Hágalo para: 1) y , la coordenada para la pesa de m_2 , 2) θ
- Obtenga las aceleraciones y responda: ¿cuál coordenada generalizada preferiría?

$$\text{Resultado: } \ddot{y} = \frac{-\ell^2 m_1 y \dot{y}^2 + g m_2 (\ell^2 - y^2)^2}{\ell^4 m_2 + \ell^2 m_1 y^2 - 2\ell^2 m_2 y^2 - m_1 y^4 + m_2 y^4} \quad \ddot{\theta} = \frac{(\ell m_1 \cos(\theta) \dot{\theta}^2 - \ell m_2 \cos(\theta) \dot{\theta}^2 - g m_2) \sin(\theta)}{\ell(m_1 \cos^2(\theta) + m_2 \sin^2(\theta))}$$

- (*) ¿Cuál es el período de movimiento de pequeñas oscilaciones para el caso $m_1 = m_2 = m$?

4. Máquina de Atwood compuesta [Marion (english) ex. 7.8]



$$\ddot{y}_1 = \frac{4gm_1m_2 + 4gm_1m_3 + 2gm_1m_p - 16gm_2m_3 - 6gm_2m_p - 6gm_3m_p - 2gm_p^2}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$