

APRANAX FORT PROSPEKTÜSÜ

Etken Madde: Naproksen sodyum | Doz: 550 mg

• TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VE ETKİN MADDE

Apranax Fort, etken maddesi Naproksen sodyum olan bir nonsteroid antienflamatuar ilaçtır (NSAİ). Naproksen sodyum, vücutta iltihap ve ağrı oluşumuna neden olan kimyasalların üretimini azaltarak ağrı, iltihap ve ateş gibi semptomları hafifletir.

• KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir Apranax Fort tablet, 550 mg Naproksen sodyum içerir. Yardımcı maddeler olarak mikrokristal selüloz, pregelatinize mısır nişastası, sodyum lauril sülfat, kroscarmeloz sodyum, magnezyum stearat ve talk bulunur.

• TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Apranax Fort, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit gibi inflamatuvar romatizmal hastalıkların tedavisinde,
- Akut ağrı sendromlarının (örneğin, kasık ağrısı, diş ağrısı, baş ağrısı) ve ateşin tedavisinde,
- Adet ağrısı (dismenore) tedavisinde,
- Soft doku travmaları (örneğin, burkulma, incinme) ve sporcularda görülen ağrıların tedavisinde.

• KONTRAENDİKASYONLAR

Apranax Fort aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Naproksen veya diğer NSAİ'lere karşı bilinen alerjik duyarlılık,
- Aktif veya geçmişte peptik ülser veya gastrointestinal kanama,
- İddetli böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klirensi < 30 mL/dak),
- İddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu,
- Hamileliğin son üç ayında,
- Çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) aspirin veya diğer NSAİ'lere bağlı olarak Reye sendromu gelişme riski.

• ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER

- Hamilelik ve Emzirme: İlk ve ikinci trimesterde sadece mutlak gereklilik halinde ve en düşük etkili dozda kullanılmamalıdır. Son üç ayda kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
- Çocuklar: 18 yaş altı çocuklarda ve ergenlerde dikkatli kullanılmamalıdır.
- Yaşlılar: Yaşlı hastalarda dozaj ayarlaması gerekebilir. Gastrointestinal yan etkiler için yakın takip gereklidir.
- Böbrek ve Karaciğer Hastaları: Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekebilir. Yakın takip gereklidir.

• DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEŞİMLER

- Aspirin ve Diğer NSAİ'ler: Birlikte kullanımda gastrointestinal yan etkiler riski artar.
- Antikoagülanlar: Kanama riski artırılabilir.
- Lityum: Lityum seviyeleri artırılabilir.
- Methotrexat: Methotrexatın toksisitesini artırılabilir.
- Siklosporin: Böbrek toksisitesini artırılabilir.

- **■STENMEYEN ETK■LER**

- Çok S■k: Ba■ a■r■s■, mide bulant■s■, ishal,
- S■k: Gastrointestinal kanama, ■lser, mide a■r■s■, kab■zlik,
- Seyrek: Anemi, trombositopeni, karaci■er fonksiyon bozuklu■u, b■brek fonksiyon bozuklu■u.

- **DOZAJ VE KULLANIM ■EKL■**

- Yeti■kinler: Günde 2-3 kez 550 mg,
- Çocuklar: 18 ya■ alt■ çocuklarda dozaj ve kullan■m ■ekli hekim taraf■ndan belirlenmelidir.
- Kullan■m S■resi: Tedavi s■resi hekim taraf■ndan belirlenmelidir.

- **SAKLANMA KO■ULLARI**

25°C'nin alt■ndaki oda s■cakl■■nda, kuru ve güne■ ■■■■■■ndan uzakta saklanmal■d■r.

- **■RET■C■ F■RMA B■LG■S■**

■retici Firma: [■retici Firma Ad■]

Adres: [■retici Firma Adresi]

Telefon: [■retici Firma Telefonu]

E-posta: [■retici Firma E-posta Adresi]

Bu prospekt■s, Apranax Fort'un güvenli ve etkili kullan■m■n■ sa■lamak amac■yla haz■rlanm■■t■r. ■laç kullanmadan ■nce hekiminize dan■■■n■z.