

ASPIRİN PROSPEKTÜSÜ

Etken Madde: Asetilsalisilik Asit | Doz: 500 mg

• TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VE ETKİN MADDE

İlaç adı: Aspirin

Etken madde: Asetilsalisilik Asit

• KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir Aspirin tablet 500 mg Asetilsalisilik Asit içerir. Yardımcı maddeler olarak; mikrokristal selüloz, pregelatinize mısır nişastası, talk ve magnezyum stearat bulunur.

• TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Aspirin, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Ağrı kesici olarak; baş ağrısı, diş ağrısı, kas ve eklem ağrıları,
- Ate düşürücü olarak; grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara bağlı ateş,
- Anti-inflamatuar olarak; romatoid artrit, osteoartrit gibi iltihaplı romatizmal hastalıkların tedavisinde.

• KONTRAENDİKASYONLAR

Aspirin aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Asetilsalisilik asit veya diğer salisilatlar ve nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlara karşı bilinen alerjik duyarlılık,
- Aktif gastrointestinal ülser veya kanama,
- Astım, nazal polip veya diğer alerjik durumlar,
- Kanama bozuklukları (hemofili, trombositopeni vb.),
- Gebelik (özellikle son trimesterde),
- Emzirme döneminde.

• ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER

- Hamilelik: Aspirin, özellikle son trimesterde gebelikte kullanılmamalıdır. İlk ve ikinci trimesterde kullanım ancak doktor gözetiminde ve mutlak gereklilik halinde yapılmalıdır.
- Çocuklar: 16 yaş altı çocuklarda Aspirin kullanımdan kaçınılmalıdır, çünkü Reye sendromu riski vardır.
- Yaşlılar: Yaşlı hastalarda dozaj ayarlaması gerekebilir. Dikkatli kullanılmalıdır.
- Böbrek veya karaciğer hastaları: Bu hastalarda dozaj ayarlaması gerekebilir. Dikkatli kullanılmalıdır.

• DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEŞİMLER

Aspirin aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır veya dikkatli kullanılmalıdır:

- Antikoagülanlar (kan sulandırıcılar),
- Diğer nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar,
- Kortikosteroidler,
- Metotreksat,
- Valproik asit,
- Diüretikler.

- **■STENMEYEN ETK■LER**

- Çok s■k: Mide bulant■s■, kusma, gastrit,
- S■k: Ba■ dönmesi, ba■ a■r■s■, yorgunluk,
- Seyrek: Kanama bozukluklar■, alerjik reaksiyonlar, karaci■er fonksiyon bozukluklar■.

- **DOZAJ VE KULLANIM ■EKL■**

- Yeti■kinler: A■r■ kesici ve ate■ dü■ürücü olarak 500 mg-1000 mg (1-2 tablet) her 4-6 saatte bir,
- Çocuklar: 16 ya■ alt■ çocuklarda kullan■lmamal■d■r.
- Kullan■m süresi: Doktorun önerdi■i süreyi a■mamal■d■r.

- **SAKLANMA KO■ULLARI**

Aspirin, oda s■cakl■■■nda (15-25°C), kuru ve direkt güne■ ■■■■■■ndan uzakta saklanmal■d■r.

- **ÜRET■C■ F■RMA B■LG■S■**

Üretici firma: [Firma ad■]

Adres: [Firma adresi]

Telefon: [Firma telefonu]

E-posta: [Firma e-postas■]

Bu prospektüs, son güncellenme tarihinden itibaren geçerli olup, ilaç hakk■nda güncel bilgi için üretici firma ile temas kurulmal■d■r.