

AUGMENTIN PROSPEKTÜSÜ

Etken Madde: Amoksisilin + Klavulanik asit | Doz: 1000 mg

• TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VE ETKİN MADDE

Augmentin, amoksisilin ve klavulanik asit içeren bir antibiyotik ilaçtır. Etken maddeleri:

- Amoksisilin: 875 mg
- Klavulanik asit: 125 mg

• KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir Augmentin tablet, 875 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir. Yardımcı maddeler:

- Mikrokristal selüloz
- Magnezyum stearat
- Hidroksipropil selüloz
- Titanyum dioksit
- Macrogol 4000
- Macrogol 6000

• TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Augmentin, amoksisilin ve klavulanik asit kombinasyonuna duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bu enfeksiyonlar arasında:

- Akut sinüzit
- Akut otitis media
- Akut tonsillit
- Akut bronşit
- Akut pnömoni
- Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları
- İdrar yolu enfeksiyonları

• KONTRAENDİKASYONLAR

Augmentin, aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Penisilin veya sefalosporinlere karşı bilinen hipersensitivite
- Klavulanik asite karşı bilinen hipersensitivite
- Sarı humma veya viral hepatit geçiren hastalar

• ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER

- Hamilelik: Augmentin, hamilelikte yalnızca gerçekten gerekli olduğunda kullanılmalıdır.
- Emzirme: Augmentin, anne sütüne geçer. Emziren annelerin dikkatli kullanması gerekir.
- Çocuklar: Augmentin, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Yaşlılar: Yaşlı hastalarda, böbrek fonksiyonu bozulduğundan dozaj ayarlaması gerekebilir.
- Böbrek veya karaciğer hastaları: Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekebilir.

- DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEMLER

Augmentin, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır:

- Probensid: Amoksisilin atılımını azaltır
- Allopurinol: Amoksisilinle birlikte kullanıldığında, alerjik reaksiyon riski arttırır
- Oral kontraseptifler: Etkinliğini azaltabilir

- İSTENMEYEN ETKİLER

- Çok sık: Şişal, bulantı, kusma
- Sık: Karın ağrısı, ishal, deri döküntüsü
- Seyrek: Alerjik reaksiyonlar, anafilaksi, hematolojik bozukluklar

- DOZAJ VE KULLANIM REKLE

- Yetkinler: 1000 mg (875 mg amoksisilin + 125 mg klavulanik asit) günde 2-3 kez
- Çocuklar: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır
- Kullanım süresi: Tedavi süresi, enfeksiyonun tipine ve şiddetine bağlı olarak değişir.

- SAKLANMA KULLARI

Augmentin, oda sıcaklığında (15-30°C) ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

- ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ

Augmentin, GlaxoSmithKline tarafından üretilir. Adres: ... (Üretici firmanın adresi)