

# BELOC PROSPEKTÜSÜ

Etken Madde: Metoprolol suksinat | Doz: 50 mg

## • TÜRK KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)

### • 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ve ETKİN MADDE

Tıbbi Ürün Adı: Beloc

Etken Madde: Metoprolol suksinat

### • 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir tablet 50 mg metoprolol suksinat içerir. Yardımcı maddeler: mikrokristal selüloz, hidroksipropil metilselüloz, magnezyum stearat, talk, dioksit titanyum, ferrosufat, ferrik oksit sarı, ferrik oksit kırmızı.

### • 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Beloc, metoprolol suksinat etkin maddesi içeren bir beta-blokerdir. Aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Hipertansiyon tedavisinde
- Anjina pektoris tedavisinde
- Miyokard infarktüsünden sonra mortalite ve morbiditeyi azaltmak için
- Aritmi tedavisinde

### • 4. KONTRAENDİKASYONLAR

Aşağıdaki durumlarda Beloc kullanılmamalıdır:

- Bradikardi (dakikada 45 atım altı kalp atımı hızı)
- Kardiyak bloklar (2. veya 3. derece AV bloklar)
- Kardiyogen şok
- Akut kalp yetmezliği
- Bronşiyal astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH) olan hastalarda
- Metoprolol veya metoprololün diğer bileşenlerine karşı bilinen hipersensitivite

### • 5. ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER

- Hamilelik: Beloc, hamilelikte sadece mutlak gereklilik durumunda kullanılmamalıdır.
- Emzirme: Metoprolol, anne sütüne geçer. Emziren annelere, Beloc kullanımasında, emzirmenin durdurulması önerilir.
- Çocuklar: Beloc, 18 yaş altı çocuklarda kullanımı için onaylanmamıştır.
- Yaşlılar: Yaşlı hastalarda dozaj ayarlaması gerekebilir.
- Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda: Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekebilir.

### • 6. DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEŞİMLER

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır:

- Beta-blokerler
- Kalsiyum kanal blokerleri
- Anti-aritmik ilaçlar

- Anestezikler

- Clonidin

- 7. ■STENMEYEN ETK■LER

Çok s■k görülen yan etkiler:

- Ba■ dönmesi

- Yorgunluk

- Uyu■ukluk

- Halsizlik

S■k görülen yan etkiler:

- Bradikardi

- Hipotansiyon

- Solunum güçlü■ü

- Kas güçsüzlü■ü

Seyrek görülen yan etkiler:

- Alerjik reaksiyonlar

- Anemi

- Trombositopeni

- Psikiyatrik bozukluklar

- 8. DOZAJ VE KULLANIM ■EKL■

- Yeti■kinler: Günde bir kez 50-100 mg

- Çocuklar: 18 ya■ alt■ çocuklarda kullan■m için onaylanmam■t■r

- Kullan■m süresi: Tedavi süresince

- 9. SAKLANMA KO■ULLARI

25°C'nin alt■ndaki oda s■cakl■■nda, kuru ve güne■ ■■■■■■ndan uzakta saklanmal■d■r.

- 10. ÜRET■C■ F■RMA B■LG■S■

Üretici Firma: [Üretici firma ad■]

Adres: [Üretici firma adresi]

Telefon: [Üretici firma telefon numaras■]

E-posta: [Üretici firma e-posta adresi]

Bu prospektüs, son güncelleme tarihi itibar■yla geçerli bilgiler içerir. ■laç kullan■m■ öncesi, hekim veya eczac■ ile görü■ülmesi önerilir.