

CIPRO PROSPEKTÜSÜ

Etken Madde: Siprofloksasin | Doz: 500 mg

• TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VE ETKİN MADDE

Cipro, etkin maddesi Siprofloksasin olan bir antibiyotik ilaçtır. Siprofloksasin, florokinolon grubuna ait bir antibakteriyel ajandır.

• KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir Cipro tablet 500 mg Siprofloksasin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler olarak mikrokristal selüloz, pregelatinize mısır nişastas, sodyum lauril sülfat, hidroksipropil metilselüloz, magnezyum stearat, titanyum dioksit, demir oksit sarı ve demir oksit kırmızı bulunur.

• TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Cipro, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

- Akut bakteriyel eksudatif akut sinüzit
- Akut bakteriyel tonsillit ve farenjit
- Akut bakteriyel bronşit
- Akut pielonefrit
- Komplike ve komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları
- Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları
- Kemik ve eklem enfeksiyonları
- İntraabdominal enfeksiyonlar
- Solunum sistemi enfeksiyonları
- Ürogenital enfeksiyonlar

• KONTRAENDİKASYONLAR

Cipro, aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Siprofloksasin veya diğer florokinolonlara karşı bilinen hipersensitivite
- Hamilelik ve emzirme döneminde
- 18 yaş altı çocuklar
- Epilepsi veya diğer nörolojik bozukluklar

• ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER

- Hamilelik: Cipro, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Ancak, potansiyel faydalar risklerden daha fazla ise, doktor tarafından close takip altında kullanılabilir.
- Emzirme: Cipro, anne sütüne geçer. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
- Çocuklar: Cipro, 18 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Yaşlılar: Yaşlı hastalarda, özellikle böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda, dozaj ayarlaması gerekebilir.
- Böbrek veya karaciğer hastaları: Böbrek veya karaciğer fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda, dozaj ayarlaması gerekebilir.

• DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEŞİMLER

Cipro, a      daki ila  larla birlikte kullan  lmamal  d  r:

- Teofilin
- Kafein
- Warfarin
- Fensiklidin
- Siproheptadin
-   trakonazol
- Ritonavir
-   STENMEYEN ETK  LER

Cipro, a      daki istenmeyen etkileri g  sterebilir:

-   ok s  k: Ba   a  r  s  , bulant  , ishal, kar  n a  r  s  
- S  k: Ate  , kas a  r  s  , eklem a  r  s  , uykusuzluk
- Seyrek: Anemi, trombositopeni, l  kopeni, karaci  er fonksiyon bozuklu  u, b  brek fonksiyon bozuklu  u
- DOZAJ VE KULLANIM   EKL  

- Yeti  kinler: Cipro, g  nde iki kez 500 mg olarak oral yoldan uygulan  r.
-   ocuklar: Cipro, 18 ya   alt     ocuklarda kullan  lmamal  d  r.
- Kullan  m s  resi: Tedavi s  resi, enfeksiyon tipine ve   iddetine g  re de  i  ir. Doktor taraf  ndan belirlenen s  reye uyulmal  d  r.

- SAKLANMA KO  ULLARI

Cipro, oda s  cakl    nda (15-30  C), kuru ve      ktan korunakl   bir ortamda saklanmal  d  r.

-   RET  C   F  RMA B  LG  S  

Cipro, [  retici Firma Ad  ] taraf  ndan   retilmi  tir. Adres: [  retici Firma Adresi]. Telefon: [  retici Firma Telefonu].