

GLUCOPHAGE PROSPEKTÜSÜ

Etken Madde: Metformin HCl | Doz: 850 mg

• TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VE ETKİN MADDE

Glucophage, etken maddesi Metformin HCl olan bir oral antidiyabetik ilaçtır. Metformin HCl, tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan bir biguanid türevidir.

• KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her Glucophage tablet 850 mg Metformin HCl içerir. Yardımcı maddeler olarak; mikrokristal selüloz, pregelatinize mısır nişastas, hidroksipropil metilselüloz, magnezyum stearat ve talk bulunur.

• TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Glucophage, tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılır. İnsülin duyarlılığını artırarak ve karaciğerde glikoz üretimini azaltarak kan şekeri düğür. İnsülin tedavisine alternatif olarak veya birlikte kullanılabilir. Ayrıca, polikistik over sendromu (PCOS) tedavisinde de kullanılır.

• KONTRAENDİKASYONLAR

Glucophage aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Diyaliz hastaları
- Böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi < 30 mL/dak)
- Karaciğer yetmezliği olan hastalar
- Şeker koması veya diyabetik asidoz
- Hamilelik ve emzirme döneminde (gerekirse, doktorun kararı ile kullanılabilir)
- 10 yaş altı çocuklar

• ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER

- Hamilelik: Glucophage, hamilelik döneminde sadece diyabetin kontrolü için gerekli olduğunda kullanılmalıdır.
- Emzirme: Emzirme döneminde Glucophage kullanılması önerilmez, ancak diyabetin kontrolü için gerekli ise, emzirme durdurulmalıdır.
- Çocuklar: 10 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.
- Yaşlılar: Yaşlı hastalarda Glucophage kullanırken böbrek fonksiyonu izlenmelidir.
- Böbrek ve karaciğer hastaları: Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda Glucophage kullanırken dikkatli olunmalıdır.

• DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEŞİMLER

Glucophage aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır:

- İnsülin ve diğer oral antidiyabetik ilaçlar (doktorun kararı ile birlikte kullanılabilir)
- Böbrek fonksiyonunu bozan ilaçlar (örneğin, aminoglikozidler, siklosporin)
- Karaciğer fonksiyonunu bozan ilaçlar (örneğin, alkolü içecekler, asetaminofen)

• İSTENMEYEN ETKİLER

- Çok sık: Gastrointestinal yan etkiler (bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı)
- Sık: Baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı

- Seyrek: Deri döküntüleri, allerjik reaksiyonlar, böbrek fonksiyon bozukluğu

- DOZAJ VE KULLANIM

- Yetikinler: Günde 1-3 kez 850 mg

- Çocuklar (10 ya ve üzeri): Günde 1-2 kez 850 mg

- Kullanım süresi: Doktorun kararı ile belirlenir.

- SAKLANMA KOULLARI

Glucophage, oda sıcaklığında (15-30°C) ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

- ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ

Glucophage, Merck KGaA tarafından üretilir. Adres: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Almanya.