

LASIX PROSPEKTÜSÜ

Etken Madde: Furosemid | Doz: 40 mg

• TÜRK KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)

• 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ve ETKİN MADDE

Tıbbi Ürün Adı: Lasix

Etken Madde: Furosemid

• 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir Lasix tablet 40 mg furosemid içerir. Yardımcı maddeler olarak; laktoz monohidrat, mısır nişastası, mikrokristal selüloz, magnezyum stearat ve talk bulunur.

• 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Lasix, furosemid etken maddesi içeren bir diüretik ilaçtır. Aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Ödemin tedavisi (kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, böbrek hastalıkları gibi nedenlerle oluşan ödemin tedavisi)
- Hipertansiyonun tedavisi

• 4. KONTRAENDİKASYONLAR

Lasix aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Anüri (idrar üretiminin durması)
- Hipovolemi (kan hacminin azalması)
- Elektrolit dengesizliği (özellikle hipokalemi, hiponatremi)
- Akut böbrek yetmezliği
- Bilinen furosemid veya sülfonamid türevlerine karşı alerjik duyarlılık

• 5. ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER

- Hamilelik ve Emzirme: Lasix hamilelikte ve emzirme döneminde sadece mutlak gereklilik durumunda ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.
- Çocuklar: Lasix çocuklarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Dozaj, çocukların yaşı ve vücut ağırlıklarına göre ayarlanmalıdır.
- Yaşlılar: Yaşlı hastalarda Lasix dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır, özellikle böbrek fonksiyonu bozulmuşsa.
- Böbrek ve Karaciğer Hastaları: Lasix böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Dozaj, hastanın böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır.

• 6. DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEŞİMLER

Lasix aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşimler gösterebilir:

- Aminoglikozidler: İdrar kaybı riskini artırabilir.
- Digoksin: Hipokalemi riskini artırabilir.
- Heparin: Kanama riskini artırabilir.
- Lityum: Lityum seviyelerini artırabilir.

• 7. İSTENMEYEN ETKİLER

Lasix kullanımı sırasında aşağıdaki istenmeyen etkiler görülebilir:

- Çok Sık: İdrar çıkışı artışı, elektrolit dengesizliği (hipokalemi, hiponatremi)
- Sık: Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal
- Seyrek: Alerjik reaksiyonlar, anemi, lökopeni, trombositopeni

• 8. DOZAJ VE KULLANIM ŞEKLİ

- Yetkinler: Ödemin tedavisi için genellikle günde bir kez 40 mg'lık doz uygulanır. Hipertansiyon tedavisi için genellikle günde bir kez 40 mg'lık doz uygulanır.
- Çocuklar: Dozaj, çocukların yaşı ve vücut ağırlıklarına göre ayarlanmalıdır.
- Kullanım Süresi: Tedavi süresi, hastalığın şiddetine ve hastanın yanıtına göre belirlenir.

• 9. SAKLANMA KOŞULLARI

Lasix, oda sıcaklığında (15-30°C) ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Işıktan korunmalıdır.

• 10. ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ

Üretici Firma: [Üretici firma adı]

Adres: [Üretici firma adresi]

Telefon: [Üretici firma telefonu]

E-posta: [Üretici firma e-posta adresi]

Bu prospektüs, Lasix ilacının güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasına ilişkin bilgi sağlar. İlaç kullanımı öncesi ve sırasında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuz veya eczacınızla görüşün.