

MAJEZİK PROSPEKTÜSÜ

Etken Madde: Flurbiprofen | Doz: 100 mg

• Majezik 100 mg Tablet

• 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ve ETKİN MADDE

Majezik, etken maddesi Flurbiprofen olan, nonsteroid antienflamatuar ilaç grubuna ait bir tıbbi üründür.

• 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir Majezik 100 mg tablet, 100 mg Flurbiprofen içerir. Yardımcı maddeler olarak; mikrokristal selüloz, pregelatinize mısır nişastası, sodyum starch glikolat, magnezyum stearat ve talk bulunur.

• 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Majezik, nonsteroid antienflamatuar ve analjezik özelliklere sahip olup, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Romatoid artrit
- Osteoartrit
- Ankilozan spondilit
- Akut eklem inflamasyonları
- Kas ve eklem ağrıları
- Adale ve tendon inflamasyonları
- Postoperatif ağrıları

• 4. KONTRAENDİKASYONLAR

Majezik aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Flurbiprofen veya diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlara karşı bilinen hypersensitivite
- Aktif peptik ülser veya gastrointestinal kanama
- Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar (kreatinin klirensi <30 mL/dak)
- Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar
- Hamileliğin son üç ayında
- Çocuklarda ve 12 yaş altı hastalarda

• 5. ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER

- Hamilelik ve Emzirme: Hamileliğin ilk ve ikinci trimesterlerinde sadece mutlak gereklilik durumunda ve en düşük etkili dozda kullanılmalıdır. Hamileliğin son üç ayında kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.
- Çocuklar: 12 yaş altı çocuklarda kullanıma karşı dikkatli olunmalıdır.
- Yaşlılar: Yaşlı hastalarda dozaj ayarlaması gerekebilir.
- Böbrek ve Karaciğer Hastaları: Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekebilir.

• 6. DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEŞİMLER

Majezik aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır:

- Antikoagülanlar

- Antiplatelet ajanlar
- Diüretikler
- Beta-blokerler
- ACE inhibitörleri
- Digoksin
- Litium

• 7. İSTENMEYEN ETKİLER

Majezik kullanımı sırasında aşağıdaki istenmeyen etkiler görülebilir:

- Çok Sık: Baş ağrısı, bulantı, kusma, diyare, kabızlık, gastrit
- Sık: Karın ağrısı, dispepsi, ürtiker, kaşıntı, cilt döküntüleri
- Seyrek: Gastrointestinal kanama, peptik ülser, renal fonksiyon bozukluğu, karaciğer enzimlerinde artışı

• 8. DOZAJ VE KULLANIM ŞEKLİ

- Yetkinler: Günde 2-3 kez 100 mg (toplam günde 200-300 mg)
- Çocuklar: 12 yaş altı çocuklarda kullanıma karşı dikkatli olunmalıdır.
- Kullanım Süresi: Tedavi süresi hastanın ihtiyacına ve hastanın yanıtına bağlı olarak belirlenir.

• 9. SAKLANMA KOŞULLARI

Majezik, oda sıcaklığında (15-30°C), kuru ve ışıktan korunaklı bir ortamda saklanmalıdır.

• 10. ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ

Majezik, [Üretici Firma Adı] tarafından üretilmiştir. Adres: [Üretici Firma Adresi]. Telefon: [Üretici Firma Telefonu].