

NUROFEN PROSPEKTÜSÜ

Etken Madde: İbuprofen | Doz: 400 mg

• TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VE ETKİNNİ MADDE

Nurofen, etken maddesi ibuprofen olan bir nonsteroid antienflamatuar ilaçtır (NSAİ). İbuprofen, ağrı, ateş ve iltihaplanmayı azaltmak için kullanılan bir aktif maddedir.

• KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir Nurofen tablet, 400 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler olarak; mikrokristal selüloz, pregelatinize nişasta, kroscarmeloz sodyum, hidroksipropil metilselüloz, magnezyum stearat ve titanyum dioksit bulunur.

• TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Nurofen, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Ağrı: Baş ağrısı, diş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, adet ağrıları gibi çeşitli ağrı durumlarında,
- Ateş: Yüksek ateşin düşürülmesinde,
- İltihaplanma: Eklem iltihapları, kas ve eklem travmaları gibi durumlarda iltihaplanmayı azaltmak için.

• KONTRAENDİKASYONLAR

Nurofen aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- İbuprofen veya diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlara karşı bilinen bir duyarlılık veya alerji,
- Aktif peptik ülser veya gastrointestinal kanama,
- Böbrek fonksiyonu ciddi şekilde bozulmuş hastalar,
- Karaciğer fonksiyonu ciddi şekilde bozulmuş hastalar,
- Hamileliğin son üç ayında,
- Emziren anneler.

• ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER

- Hamilelik ve Emzirme: İlk ve ikinci trimesterde sadece mutlak gereklilik halinde ve en düşük etkili dozda kullanılmamalıdır. Son üç ayda kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
- Çocuklar: 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Yaşlılar: Yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır, özellikle gastrointestinal yan etkiler açısından.
- Böbrek ve Karaciğer Hastaları: Böbrek veya karaciğer fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

• DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEŞİMLER

Nurofen aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır:

- Diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar,
- Antikoagülanlar (kan sulandırıcılar),
- Antihipertansifler (tansiyon düşürücüler),
- Lityum,
- Metotreksat.

• İSTENMEYEN ETKİLER

- Çok Sık: Baı aırsı, ba dönmesi, mide bulantısı,
- Sık: Gastrointestinal yan etkiler (mide aırsı, ishal, kabızlık),
- Seyrek: Cilt döküntüleri, allerjik reaksiyonlar, böbrek fonksiyonunda bozulma.

• DOZAJ VE KULLANIM EKLERİ

- Yetkinler: Günde 3-4 kez 400 mg (1 tablet),
- Çocuklar (12 ya ve üzeri): Günde 3-4 kez 400 mg (1 tablet),
- Kullanım Süresi: Belirtilen maksimum doz ve tedavi süresi aılmamalıdır.

• SAKLANMA KOULLARI

Nurofen, oda sıcaklığında (15-25°C), kuru ve direkt güne ından uzakta saklanmalıdır.

• ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ

Nurofen, [Üretici Firma Adı] tarafından üretilmiştir. Adres: [Firma Adresi]. Telefon: [Firma Telefonu].