

PAROL PROSPEKTÜSÜ

Etken Madde: Parasetamol | Doz: 500 mg

• TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VE ETKİN MADDE

Parol, etken maddesi parasetamol olan bir ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçtır. Parasetamol, analjezik (ağrı kesici) ve antipiretik (ateş düşürücü) özelliklere sahip bir bileşiktir.

• KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir Parol tablet, 500 mg parasetamol içerir. Yardımcı maddeler olarak; mikrokristal selüloz, pregelatinize nişasta, sodyum starch glikolat, talk, magnezyum stearat ve titanyum dioksit bulunur.

• TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Parol, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Ağrı kesici olarak; baş ağrısı, diş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, regl ağrıları gibi durumlarda,
- Ateş düşürücü olarak; grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarda.

• KONTRAENDİKASYONLAR

Parol, aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Parasetamol veya ilacın diğer bileşenlerine karşı bilinen bir alerjisi olan hastalar,
- Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar,
- Kronik alkolik olan hastalar,
- Aktif karaciğer hastalığı veya karaciğer yetmezliği olan hastalar.

• ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Parol, hamilelikte ve emzirme döneminde dikkatli kullanılmalıdır.

Çocuklar: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaş ve üzeri çocuklarda yetikin dozu kullanılabilir.

- Yanıllar: Özel bir uyarı gerekmez, ancak doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
- Böbrek veya karaciğer hastalığı olan hastalar: Dikkatli kullanılmalıdır, dozaj ayarlaması gerekebilir.

• DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEMLER

Parol, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır veya dikkatli kullanılmalıdır:

- Warfarin ve diğer antikoagülanlar,
- Barbitüratlar,
- Antiepileptik ilaçlar,
- Karaciğer fonksiyonunu etkileyen diğer ilaçlar.

• İSTENMEYEN ETKİLER

Çok sık görülen yan etkiler:

- Mide bulantısı,
- Bağ ağrısı,
- Yorgunluk.

Sık görülen yan etkiler:

- Karın ağrısı,
- Şişme,
- Kabızlık.

Seyrek görülen yan etkiler:

- Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, anjiyoödem),
- Kanama bozuklukları,
- Karaciğer fonksiyon bozukluğu.

• DOZAJ VE KULLANIM KURALLARI

- Yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri çocuklar: Günde 3-4 kez 500 mg (1 tablet) olarak kullanılır. Maksimum günlük doz 4 gram (8 tablet) geçmemelidir.
- Çocuklar (12 yaş altı): Kullanılmamalıdır.
- Kullanım süresi: Doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Uzun süreli kullanım için doktorunuzun izni gereklidir.

• SAKLANMA KOŞULLARI

Parol, oda sıcaklığında (15-30°C), kuru ve direkt güneşten uzakta saklanmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

• ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Parol, [Üretici Firma Adı] tarafından üretilmiştir. Adres: [Firma Adresi]. Telefon: [Firma Telefonu].