

—  
to get

$$\begin{aligned}
A^{-1} &= \begin{bmatrix} I & a_{12} & O \\ a_{21} & I & a_{23} \\ O & a_{32} & I \end{bmatrix}^{-1} \\
Q_1 Q_2 &= \begin{bmatrix} I & -a_{12} & a_{12} (I - a_{21} a_{12})^{-1} a_{23} \\ O & I & -(I - a_{21} a_{12})^{-1} a_{23} \\ O & O & I \end{bmatrix} \\
P_1 P_2 &= \begin{bmatrix} I & O & O \\ -a_{21} & I & O \\ a_{32} (I - a_{21} a_{12})^{-1} a_{21} & -a_{32} (I - a_{21} a_{12})^{-1} & I \end{bmatrix} \\
B &= \begin{bmatrix} I & O & O \\ O & I - a_{21} a_{12} & O \\ O & O & I - a_{32} (I - a_{21} a_{12})^{-1} a_{23} \end{bmatrix} \\
A^{-1} &= Q_1 Q_2 B^{-1} P_2 P_1
\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ c_{21} & 1 & 0 \\ c_{31} & c_{32} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 + a_{12} b_2 c_{21} + a_{13} b_3 c_{31} & a_{12} b_2 + a_{13} b_3 c_{32} & a_{13} b_3 \\ b_2 c_{21} + a_{23} b_3 c_{31} & b_2 + a_{23} b_3 c_{32} & a_{23} b_3 \\ b_3 c_{31} & b_3 c_{32} & b_3 \end{bmatrix}$$

$$Q^{(yy)} = b_2 + a_{23} b_3 c_{32} = (I - a_{21} a_{12})^{-1} + (I - a_{21} a_{12})^{-1} a_{23} \left( I - a_{32} (I - a_{21} a_{12})^{-1} a_{23} \right)^{-1} a_{32} (I - a_{21} a_{12})^{-1}$$

verified

$$\left( Q^{(yy)} \right)^{-1} = I - a_{21} a_{12} - a_{23} a_{32}$$

verified

—  
to get

$$\begin{aligned}
A^{-1} &= \begin{bmatrix} I & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & I & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & I \end{bmatrix}^{-1} \\
\begin{bmatrix} I & O & O \\ O & I - a_{21} a_{12} & O \\ O & O & I - a_{31} a_{13} - (a_{32} - a_{31} a_{12}) (I - a_{21} a_{12})^{-1} (a_{23} - a_{21} a_{13}) \end{bmatrix} &= B, \\
Q_1 Q_2 &= \begin{bmatrix} I & -a_{12} & a_{12} (I - a_{21} a_{12})^{-1} (a_{23} - a_{21} a_{13}) - a_{13} \\ O & I & -(I - a_{21} a_{12})^{-1} (a_{23} - a_{21} a_{13}) \\ O & O & I \end{bmatrix} \\
P_2 P_1 &= \begin{bmatrix} I & O & O \\ -a_{21} & I & O \\ (a_{32} - a_{31} a_{12}) (I - a_{21} a_{12})^{-1} a_{21} - a_{31} & -(a_{32} - a_{31} a_{12}) (I - a_{21} a_{12})^{-1} & I \end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ c_{21} & 1 & 0 \\ c_{31} & c_{32} & 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} b_1 + a_{12} b_2 c_{21} + a_{13} b_3 c_{31} & a_{12} b_2 + a_{13} b_3 c_{32} & a_{13} b_3 \\ b_2 c_{21} + a_{23} b_3 c_{31} & b_2 + a_{23} b_3 c_{32} & a_{23} b_3 \\ b_3 c_{31} & b_3 c_{32} & b_3 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$Q^{(yy)} = b_2 + a_{23}b_3c_{32}$$

$$Q^{(yy)} = (I - a_{21}a_{12})^{-1} + (I - a_{21}a_{12})^{-1} (a_{23} - a_{21}a_{13}) \left( I - a_{31}a_{13} - (a_{32} - a_{31}a_{12}) (I - a_{21}a_{12})^{-1} (a_{23} - a_{21}a_{13}) \right) (a_{32} - a_{31}a_{12})$$

$$Q^{(yy)} = \left( I - a_{21}a_{12} - (a_{23} - a_{21}a_{13}) (I - a_{31}a_{13})^{-1} (a_{32} - a_{31}a_{12}) \right)^{-1}$$

$$\left( Q^{(yy)} \right)^{-1} = I - a_{21}a_{12} - (a_{23} - a_{21}a_{13}) (I - a_{31}a_{13})^{-1} (a_{32} - a_{31}a_{12})$$

$$\left( Q^{(yy)} \right)^{-1} = I - a_{23}a_{32} - (a_{21} - a_{23}a_{31}) (I - a_{13}a_{31})^{-1} (a_{12} - a_{13}a_{32})$$

verified.

$$c = \begin{bmatrix} 0 & \vec{s}^{(x|z)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & S^{(xz)} \\ S^{(zx)} & I \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \vec{s}^{(x|z)T} \end{bmatrix}$$

$$c = \vec{s}^{(x|z)} \left( I - S^{(zx)} S^{(xz)} \right)^{-1} \vec{s}^{(x|z)T}$$

$$c = \vec{s}^{(x|z)} \left( I + S^{(zx)} \left( I - S^{(xz)} S^{(zx)} \right)^{-1} S^{(xz)} \right) \vec{s}^{(x|z)T} = \vec{s}^{(x|z)} \vec{s}^{(x|z)T} + \vec{s}^{(x|z)} S^{(zx)} \left( I - S^{(xz)} S^{(zx)} \right)^{-1} S^{(xz)} \vec{s}^{(x|z)T}$$

$$d = c + (d - c) = \vec{s}^{(x|z)} \left( I - S^{(zx)} S^{(xz)} \right)^{-1} \vec{s}^{(x|z)T} + \vec{a}^{(12)} \left( Q^{(yy)} \right)^{-1} \vec{a}^{(12)T}$$

$$F_{y \rightarrow x|z} = \ln \frac{1-c}{1-d} = -\ln \frac{1-d}{1-c} = -\ln \left( 1 - \frac{d-c}{1-c} \right) = -\ln \left( 1 - \frac{\vec{a}^{(12)} \left( Q^{(yy)} \right)^{-1} \vec{a}^{(12)T}}{1 - \vec{s}^{(x|z)} \left( I - S^{(zx)} S^{(xz)} \right)^{-1} \vec{s}^{(x|z)T}} \right)$$

Use  $\vec{a}^{(12)} \left( Q^{(yy)} \right)^{-1} \vec{a}^{(12)T}$  to calculate approximate GC could get  $O(m^3 p^2)$  time cost.

frequency domain: relation of pairwise GC and GC

$$A(w) = \begin{bmatrix} A_{xx}(w) & A_{xy}(w) & A_{xz}(w) \\ A_{yx}(w) & A_{yy}(w) & A_{yz}(w) \\ A_{zx}(w) & A_{zy}(w) & A_{zz}(w) \end{bmatrix}$$

$$S(w) = \begin{bmatrix} S_{xx}(w) & S_{xy}(w) & S_{xz}(w) \\ S_{yx}(w) & S_{yy}(w) & S_{yz}(w) \\ S_{zx}(w) & S_{zy}(w) & S_{zz}(w) \end{bmatrix} = A^{-1}(w) \Sigma A^{-1H}(w)$$

$$Q(w) = S^{-1}(w)$$

$$B(w) = \begin{bmatrix} B_{xx}(w) & B_{xz}(w) \\ B_{yx}(w) & B_{yz}(w) \end{bmatrix}$$

$$S_{[x,y]}(w) = \begin{bmatrix} S_{xx}(w) & S_{xy}(w) \\ S_{yx}(w) & S_{yy}(w) \end{bmatrix} = B^{-1}(w) \Sigma_{[xy]} B^{-1H}(w)$$

$$[f(w)]_+ = \mathcal{F}_{\text{DFT}} \left[ \mathcal{F}_{\text{DFT}}^{-1} [f(w), t] (t) \cdot u(t), w \right]$$

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Then

$$B_{xy} \approx [A_{xy} - A_{xz}Q_{zz}^{-1}Q_{zy}]_+$$

Under assumption

$$\Sigma = \text{diag} \left( \begin{bmatrix} \Sigma_{xx} & \Sigma_{yy} & \Sigma_{zz} \end{bmatrix} \right)$$

We have

$$\begin{aligned} Q_{zz} &= A_{xz}^{*T} \Sigma_{xx}^{-1} A_{xz} + A_{yz}^{*T} \Sigma_{yy}^{-1} A_{yz} + A_{zz}^{*T} \Sigma_{zz}^{-1} A_{zz} \\ Q_{zy} &= A_{xz}^{*T} \Sigma_{xx}^{-1} A_{xy} + A_{yz}^{*T} \Sigma_{yy}^{-1} A_{yy} + A_{zz}^{*T} \Sigma_{zz}^{-1} A_{zy} \end{aligned}$$

Hence

$$A_{xz}/Q_{zz} * Q_{zy} \approx A_{xz} \left( A_{zz}^{-1} \Sigma_{zz} (A_{zz}^{*T})^{-1} \right) (A_{yz}^{*T} \Sigma_{yy}^{-1} A_{yy} + A_{zz}^{*T} \Sigma_{zz}^{-1} A_{zy}) \approx A_{xz} (A_{zy} + A_{yz}^*)$$

$$B_{xy} \approx [A_{xy} - A_{xz} (A_{zy} + A_{yz}^*)]_+$$

...

$$gc = A_{xz} A_{xz}^* (A_{zy} A_{zy}^* + A_{zy} A_{yz} + A_{yz}^* A_{zy}^* + A_{yz}^* A_{yz})$$

.  
.
  
.
  
.
  
.
  
.