

✓ ¡Felicitaciones! ¡Aprobaste!

Calificación recibida 100 % Para Aprobar 100 % o más

Ir al siguiente elemento

1. The determinant of

1 / 1 punto

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -3 & 2 & -3 \\ -3 & 3 & 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

is equal to

- ☒ 48
☐ 42
☐ -42
☐ -48

2. The determinant of

1 / 1 punto

$$\begin{pmatrix} a & e & 0 & 0 \\ b & f & g & 0 \\ c & 0 & h & i \\ d & 0 & 0 & j \end{pmatrix}$$

is equal to

- ☐ $afhj + behj - cegj - degi$
☒ $afhj - behj + cegj - degi$
☐ $agij - beij + cefj - defh$
☐ $agij + beij - cefj - defh$

✓ Correcto

3. Assume A and B are invertible n -by- n matrices. Which of the following identities is false?

1 / 1 punto

- ☐ $\det A^{-1} = 1/\det A$
☐ $\det A^T = \det A$
☒ $\det (A + B) = \det A + \det B$
☐ $\det (AB) = \det A \det B$

✓ Correcto

✓ ¡Felicitaciones! ¡Aprobaste!

Calificación recibida 100 % Para Aprobar 100 % o más

Ir al siguiente elemento

1. Which of the following are the eigenvalues of $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$?

1 / 1 punto

- ☐ $\frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$
☒ $\frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$
☐ $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$
☐ $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$

✓ Correcto

2. Which of the following are the eigenvalues of $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$?

1 / 1 punto

- ☐ $1 \pm 3i$
- ☐ $1 \pm \sqrt{3}$
- ☐ $3\sqrt{3} \pm 1$
- ☒ $3 \pm i$

✓ Correcto

3. Which of the following is an eigenvector of $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$?

1 / 1 punto

- ☐ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
- ☒ $\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$

✓ Correcto

✓ ¡Felicitaciones! ¡Aprobaste!

Calificación recibida 100 % Para Aprobar 100 % o más

[Ir al siguiente elemento](#)

1. Let λ_1 and λ_2 be distinct eigenvalues of a two-by-two matrix A . Which of the following cannot be the associated eigenvectors?

1 / 1 punto

- ☐ $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
- ☐ $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
- ☒ $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$
- ☐ $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

✓ Correcto

2. Which matrix is equal to $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{100}$?

1 / 1 punto

- ☐ $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- ☒ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

✓ Correcto

3. Which matrix is equal to e^I , where I is the two-by-two identity matrix?

1 / 1 punto

- ☒ $\begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & e \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 0 & e \\ e & 0 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

✓ Correcto

✓ ¡Felicitaciones! ¡Aprobaste!

Calificación recibida 100 % Calificación del último envío 100 % Para Aprobar 60 % o más

Ir al siguiente elemento

1. The determinant of $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ is equal to

1 / 1 punto

- ☐ -30
- ☐ -25
- ☐ 25
- ☒ 30

✓ Correcto

2. The determinant of $\begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & e & f & g \\ 0 & 0 & h & 0 \end{pmatrix}$ is equal to

1 / 1 punto

- ☐ $acgh$
- ☒ $-acgh$
- ☐ $-acfh$
- ☐ $acfh$

✓ Correcto

3. Assume A and B are invertible n -by- n matrices. Which of the following identities is false?

1 / 1 punto

- ☐ $\det A^T = \det A$
- ☐ $\det A^{-1} = 1/\det A$
- ☒ $\det 2A = 2 \det A$
- ☐ $\det (AB) = \det (BA)$

✓ Correcto

4. Which of the following are the eigenvalues of $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$?

1 / 1 punto

- ☐ -1, -3
- ☐ -1, 3
- ☐ 1, -3
- ☒ 1, 3

✓ Correcto

5. Which of the following are the eigenvalues of $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$?

1 / 1 punto

- ☐ $1 \pm 2i$
☐ $1 \pm \sqrt{2}i$
☒ $2 \pm i$
☐ $\sqrt{2} \pm i$

✓ Correcto

6. Which of the following is NOT an eigenvector of $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$?

1 / 1 punto

- ☒ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
☐ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$
☐ $\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$
☐ $\begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$

✓ Correcto

7. Let λ_1, λ_2 and λ_3 be distinct real eigenvalues of a three-by-three matrix A . Which of the following cannot be the associated eigenvectors?

1 / 1 punto

- ☐ $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
☐ $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
☒ $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$
☐ $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$

✓ Correcto

8. Let A be an n -by- n matrix with distinct real eigenvalues, let S be the matrix whose columns are the eigenvectors of A , and let Λ be the diagonal matrix with eigenvalues down the diagonal. Which of the following identities is false?

1 / 1 punto

- ☒ $A = S^{-1}\Lambda S$
☐ $A = S\Lambda S^{-1}$
☐ $\Lambda = S^{-1}AS$
☐ $AS = SA$

✓ Correcto

9. Identify the diagonalization of $\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

1 / 1 punto

- ☐ $\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$
- ☒ $\begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

✓ Correcto

10. The matrix $\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}^{10}$ is equal to

1 / 1 punto

- ☐ $\begin{pmatrix} 5^9 & 0 \\ 0 & 5^9 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} -3 \cdot 5^9 & 4 \cdot 5^9 \\ 4 \cdot 5^9 & 3 \cdot 5^9 \end{pmatrix}$
- ☒ $\begin{pmatrix} 5^{10} & 0 \\ 0 & 5^{10} \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} -3 \cdot 5^{10} & 4 \cdot 5^{10} \\ 4 \cdot 5^{10} & 3 \cdot 5^{10} \end{pmatrix}$

✓ Correcto