Source	(95% CI)
Primary = Other	
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.63 [−1.47; 0.21]
Hwang, Lung, n = 21	−0.20 [−1.34; 0.94]
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.06 [−0.90; 0.78]
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.21 [−0.08; 0.50]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.21 [−0.57; 0.99]
Fumet.2, Lung, n = 43	0.60 [−0.09; 1.29]
Total	0.15 [−0.08; 0.38]
Heterogeneity: $\chi^2_5 = 5.73$ ($P = .33$), $I^2 = 13\%$ [0%; 78%]	
Primary = Melanoma	
Hugo, n = 27	−0.39 [−1.33; 0.55]
Riaz, n = 51	−0.31 [−0.90; 0.28]
Liu, n = 121	−0.09 [−0.48; 0.30]
Van_Allen, n = 42	−0.02 [−0.61; 0.57]
Nathanson, n = 24	0.47 [−0.47; 1.41]
Total	−0.10 [−0.36; 0.16]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 2.34$ ($P = .67$), $I^2 = 0\%$ [0%; 79%]	
Primary = Kidney	
Braun, n = 178	−0.13 [−0.46; 0.20]
Mariathasan, n = 67	0.30 [−0.13; 0.73]
Miao.1, n = 33	0.31 [−0.45; 1.07]
Total	0.10 [−0.24; 0.43]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 2.85$ ($P = .24$), $I^2 = 30\%$ [0%; 93%]	
Total	0.05 [−0.10; 0.20]
Heterogeneity: $\chi^2_{13} = 12.97$ ($P = .45$), $I^2 = 0\%$ [0%; 55%]	
Test for overall effect: $z = 0.61$ ($P = .54$)	
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 2.11$ ($P = .35$)	

−1   0 0.5 1 1.5
D.Index estimate